Mais - Herbizidlösungen mit guter Bodenwirkung gegen Hirsen

Produkt/Lösung	Aufwandmenge/ha	Wirkstoff(e) g/l bzw. g/kg	Einsatzterm in	Unkräuter										Ungräser								Hirsedauerwirkung	Unkrautdauerwirkung	HRAC
				Klettenlabkraut	Gänsefußarten	Nachtschatten	Amarant	Ehrenpreis	Storchschnabel	Vogelknöterich	Windenknöterich	Ausfallraps	Kamille	Jährige Rispe	Ackerfuchsschwanz	Flughafer	Hühnerhirse	Fingerhirse	Borstenhirse	Weidelgräser	Quecke			
TBA-frei, Sulfonylharnstoff-haltig																								
Arigo Spectrum Plus-Pack	**250 g + 0,25 l + 2,5 l**	**Nicosulfuron 120; Rimsulfuron 30; Mesotrione 360 + Dimethenamid-P 212,5; Pendimethalin 250**	**BBCH 12-16**	●	●	●	●	●	◕	◕	◕	●	●	●	●	●	●	◕	●	◕	◕	◕	◕	**B; B; O + K; K**
IP Mais Duo 2.0 (Spectrum + IP Elumis)	1,0 l + 1,25 l	Dimethenamid-P 720 + Mesotrione 75; Nicosulfuron 30	BBCH 12-16	◕	●	◕	●	◕	◕	◕	◕	●	●	●	●	●	●	◕	●	◕	◕	◕	◕	K + F; B
TBA-haltig, Sulfonylharnstoff-haltig																								
Arigo + FHS + Gardo Gold	**250-300 g + 0,25-0,3 l + 2,5 l**	**Nicosulfuron 120; Rimsulfuron 30; Mesotrione 360 + S-Metolachlor 313; Terbuthylazin[1)]** 188	**BBCH 12-18**	●	●	●	●	●	◕	◕	◕	●	●	●	●	●	●	◕	●	◕	◕	◕	◕	**B; B; O + K; C**
Elumis Gold Pack (Gardo Gold + Elumis)	2,5 l + 1,25 l	Nicosulfuron 30; Mesotrione 75 + Terbuthylazin[1)] 188; S-Metolachlor 313	BBCH 12-18	●	●	◕	◕	●	◕	◕	◕	●	●	●	●	◕	●	◕	●	◕	◕	◕	◕	B; F + C; K

Quelle: BayWa Pflanzenbauempfehlungen Frühjahr 2021 - Version Bayern

[1)] **Terbuthylazin**: In allen Wasserschutzgebieten in Baden-Württemberg ist in den Schutzzonen I-III die Ausbringung von Terbuthylazin-haltigen Mitteln verboten. Auch außerhalb von Wasserschutzgebieten wird zum Schutz des Grundwassers die Anwendung von Terbuthylazin-haltigen Mitteln in Baden Württemberg nicht empfohlen.

Mais - Herbizidlösungen, überwiegend blattaktiv gegen Unkräuter und Ungräser

Produkt/Lösung	Aufwandmenge /ha	Wirkstoff(e) g/l bzw. g/kg	Einsatz-termin BBCH	Unkräuter										Ungräser								Hirsedauerleistung	Bodenwirkung Unkräuter	HRAC
				Klettenlabkraut	Gänsefußarten	Nachtschatten	Amarant	Ehrenpreis	Storchschnabel	Vogelknöterich	Windenknöterich	Ausfallraps	Kamille	Jährige Rispe	Ackerfuchsschwanz	Flughafer	Hühnerhirse	Fingerhirse	Borstenhirse	Weidelgräser	Quecke			
TBA-frei																								
Arigo + FHS + Peak + IP Pendi 400 SC	**300 g + 0,3 l + 12 g + 2,0 l**	**Nicosulfuron 120; Rimsulfuron 30; Mesotrione 360 + Prosulfuron 750 + Pendimethalin 400**	**BBCH 12-13**	●	●	●	●	●	◑	◕	◕	●	●	●	●	●	●	◕	●	◕	◕	◔	◑	**B; B; F + B; K**
Elumis P Pack (Elumis + Peak)	1,25 l + 20 g	Nicosulfuron 30; Mesotrione 75 + Prosulfuron 750	BBCH 12-17	●	●	◕	◕	◕	◔	◕	●	●	●	●	●	●	●	◕	●	◕	◕	◔	◔	B; F + B
TBA-haltig mit Teil-Bodenwirkung gegen Unkräuter																								
Arigo + FHS + Zeagran ultimate[1)]	**300 g + 0,3 l + 1,25 l**	**Nicosulfuron 120; Rimsulfuron 30; Mesotrione 360 + Terbuthylazin[2)] 250; Bromoxynil 100**	**BBCH 12-16**	●	●	●	●	●	◑	◕	●	●	●	●	●	●	●	◕	●	◕	◕	◔	◕	**B; B; F + C;C**
Gardo Gold + Nicogan + Peak	2,0 l + 1,0 l + 16 g	Terbuthylazin[2)] 188; S-Metolachlor 313 + Nicosulfuron 40 + Prosulfuron 750	BBCH 12-17	◕	◕	◑	◕	◕	◑	◕	◕	●	●	●	●	●	●	◕	●	◕	◕	◔	◑	C; K + B; B

[1)] Aufbrauch spätestens 17.09.2021
Quelle: BayWa Pflanzenbauempfehlungen Frühjahr 2021 - Version Bayern

[2)] **Terbuthylazin**: In allen Wasserschutzgebieten in Baden-Württemberg ist in den Schutzzonen I-III die Ausbringung von Terbuthylazin-haltigen Mitteln verboten. Auch außerhalb von Wasserschutzgebieten wird zum Schutz des Grundwassers die Anwendung von Terbuthylazin-haltigen Mitteln in Baden Württemberg nicht empfohlen.