

Getreideherbizide Herbst 2021 - Bausteine

Produkt/Lösung	Aufwandmenge l/ha	Wirkstoff(e) g/l bzw. g/kg	Zulassung in						Einsatztermin	Ungräser					Unkräuter										HRAC	Bemerkungen				
			Wintergerste	Winterweizen	Wintertriticale	Winterroggen	Dinkel	Winterdurum		Ackerfuchsschwanz	Windhalm	Jährige Rispe	Weidelgräser	Trespe	Klettenlabkraut	Kamille	Taubnessel	Knötericharten	Ehrenpreis	Ausfallraps	Stiefmütterchen	Klatschmohn	Kornblume	Storchschnabel			Erdrauch	Hundskerbel		
Axial 50	0,9 l	Pinoxaden 50; Cloquintocet-Mexyl 13	■	■	■	■	■	■	BBCH 13-29	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A	Tankmischungen zu Bodenherbiziden gegen aufgelaufenen Ackerfuchsschwanz und Weidelgras.
Traxos	1,2 l	Clodinafop-propargyl 25; Pinoxaden 25; Cloquintocet-Mexyl 6,25		■	■	■			BBCH 11-29	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A; A	Kein Einsatz in Wintergerste! Gegen massiven Besatz mit Ackerfuchsschwanz. Resistenzmanagement: bei Windhalm und Ackerfuchsschwanz, immer in Spritzfolge mit bodenaktiven Wirkstoffen!	

Quelle: BayWa Pflanzenbauempfehlungen Frühjahr 2021 - Version Bayern

Getreideherbizide Frühjahr 2020 - In Sommergetreide gegen Unkräuter und Ungräser

Produkt/Lösung	Aufwandmenge l/ha	Wirkstoff(e) g/l bzw. g/kg	Zulassung		Einsatztermin	Ungräser					Unkräuter															HRAC
			Sommergerste	Sommerweizen		Ackerfuchsschwanz	Windhalm	Jährige Rispe	Weidelgräser	Flughafener Hirse	Gänsefußarten/Me	Klettenlabkraut	Kamille	Ackerhohlzahn	Taubnessel	Knötericharten	Ehrenpreis	Ausfallraps	Stiefmütterchen	Klatschmohn	Ampfer	Kornblume	Storchschnabel	Erdrauch	Hundskerbel	

Gegen Ungräser und dikotyle Unkräuter in Sommerweizen und Sommergerste

Axial 50	1,2 l	Pinoxaden 50; Cloquintocet-Mexyl 13	■	■	BBCH 13-39	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A
Axial 50 + Biathlon 4D + Dash EC	1,2 l + 70 g + 1,0 l	Pinoxaden 50; Cloquintocet-Mexyl 13 + Tritosulfuron 714; Florasulam 54	■	■	BBCH 13-39	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A + B; B
Axial 50 + Zypar	1,2 l + 1,0 l	Pinoxaden 50; Cloquintocet-Mexyl 13 + Florasulam 5; Halauxifen-methyl 6; Cloquintocet-Mexyl 6	■	■	BBCH 13-39	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	A + B; O

¹⁾ in Wintertriticale nur im Nachauflauf (NA)

²⁾ in Winterroggen nur im Voraufbau (VA)

³⁾ Traxos Tankmischungen zu Bodenherbiziden zur Verbesserung u. Absicherung der Wirkung gegen aufgelaufenen Ackerfuchsschwanz und Weidelgras mit :

Herold SC 0,5 l/ha;

Malibu 3,0 l/ha;

Addition 2,5 l/ha;

InnoProtect Pendi 400 SC 2,5 l/ha.

Einsatztermin bei Tankmischungen: 3-Blatt-Stadium (Zulassungszeitraum der Mischpartner beachten!)