

Kartoffelherbizide

Produkt/Lösung	Aufwandmenge/ha	Wirkstoff(e) g/l bzw. g/kg	Einsatztermin	Unkräuter										Ungräser				HRAC
				Klettenlabkraut	Windenknöterich	Ampferbl. Knöterich	Amarant	Stiefmütterchen	Gänsefußarten	Kamille	Ackerhohlzahn	Franzosenkraut	Nachtschatten	Jährige Rispe	Hirse-Arten	Flughäfer	Quecke	

Vorauflauf-Anwendungen mit breiter Wirkung Metribuzin-haltig

Bandur + Artist	2,0 l + 2,0 kg	Aclonifen 600 + Metribuzin 175; Flufenacet 240	Vorauflauf	☐	☐	☐	☐	☐	☐ ¹⁾	☐	☐	☐	☐ ¹⁾	☐	☐	☐	☐	☐	F + C; K
Boxer + Sencor liquid Pack	4,0 l + 0,5 l	Prosulfocarb 800 + Metribuzin 600	Vorauflauf bis kvD*	☐	☐	☐	☐	☐	☐ ¹⁾	☐	☐	☐	☐ ¹⁾	☐	☐	☐	☐	☐	N + C
Boxer + Bandur + Mistral	2,5 l + 2,0 l + 0,3 kg	Prosulfocarb 800 + Aclonifen 600 + Metribuzin 700	Vorauflauf	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	N; F; C

Vorauflauf-Anwendungen mit breiter Wirkung Metribuzin-frei

Bandur + Centium 36 CS	3,0 l + 0,2 l	Aclonifen 600 + Clomazone 360	Vorauflauf	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	F + F
Boxer + Proman	3,0 l + 2,0 l	Prosulfocarb 800 + Metobromuron 500	Vorauflauf bis kvD*	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	N + C

¹⁾ Minderwirkung gegen herbizidresistente Biotypen ist möglich

* kvD = kurz vor dem Durchstoßen

Quelle: BayWa Pflanzenbauempfehlungen Frühjahr 2021 - Version Bayern

Herbizide in Leguminosen/Sonnenblumen

Produkt/Lösung	Aufwand-menge/ha	Wirkstoff(e) g/l bzw. g/kg	Anwendung in Kultur					Unkräuter										Ungräser				HRAC
			Ackerbohne	Futtererbsen	Lupine	Sojabohne	Sonnenblume	Klettenlabkraut	Kamille	Ackerhohlzahn	Ausfallraps	Amarant	Gänsefuß-Arten	Stiefmütterchen	Knöterich-Arten	Franzosenkraut	Nachtschatten	Ackerfuchschwanz	Jährige Rispe	Hirse-Arten	Quecke	

Vorauflaufanwendungen

Bandur	3,5 - 4,0 l	Aclonifen 600	▪	▪			▪	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	F
Boxer + Stomp Aqua	3,0 l + 2,0 l	Prosulfocarb 800 + Pendimethalin 455	▪	▪	▪		▪	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	N + K
Novitron Dam Tec	2,4 kg	Aclonifen 500 + Clomazone 30	▪	▪				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	F; F
Gardo Gold	3,0 - 4,0 l	S-Metolachlor 312,5; Terbutylazin 187,5			▪			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	K; C

Quelle: BayWa Pflanzenbauempfehlungen Frühjahr 2021 - Version Bayern