## Kartoffelherbizide

				Unkräuter										Ung	ſ		
Produkt/Lösung	Aufwandmenge/ha	Wirkstoff(e) g/l bzw. g/kg	Einsatz-termin	Klettenlabkraut	Windenknöterich	Ampferbl. Knöterich		fmütterche	Gänsefußarten	Kamille Ackerhohlzahn	) ZO	事	Jährige Rispe	Hirse-Arten	Flughafer	Quecke	HRAC

Nachbehandlungen bzw. Ungräser

Cato + FHS + Citation	20 - 30 g + 0,12 - 0,18 l + 200 - 300 g	Rimsulfuron 250 + Metribuzin 700	Nachauflauf	•	•	•			1)	•	•	•	<b>(</b> 1)			9	•	B+C
Agil-S	0,5 - 1,0	Propaquizafop 100	Nachauflauf	$\circ$	$\bigcirc$	0	•	•	•	•	А							
Gramfix/Targa Super	1,25   - 2,0	Quizalofop-P 46,3	Nachauflauf	0	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	0	•		•	•	А

Spritzfolgen

Cato + FHS	1. Termin: 30 g + 0,18 l 2. Termin: 20 g + 0,12 l	Rimsulfuron 250	Nachauflauf	•		•	•	•	0	•	•	•	0	•	•	•	•	В
Citation	1.Termin 0,33 kg 2. Termin 0,2 kg	Metribuzin 700	Nachauflauf					4	<b>1</b> 1)			4	<b>(1</b> 0	4				
Mistral	max. 0,5 kg einmal		Nachauflauf															

<sup>1)</sup> Minderwirkung gegen herbizidresistente Biotypen ist möglich

Metribuzin-Verträglichkeit der Sorten beachten, v.a. im Nahcauflauf

Quelle: BayWa Pflanzenbauempfehlungen Frühjahr 2021 - Version Bayern