

Herbizide in Leguminosen/Sonnenblumen

Produkt/Lösung	Aufwand- menge/ha	Wirkstoff(e) g/l bzw. g/kg	Einsatz- termin	Zulassung		Unkräuter											Ungräser			Quecke	HRAC
				Sojabohne	Sonnenblume	Klettenlabkraut	Kamille	Ackerhohlzahn	Ausfallraps	Amarant	Gänsefuß-Arten	Stiefmütterchen	Knöterich-Arten	Franzosenkraut	Nachtschatten	Ackerfuchsschwanz	Jährige Rispe	Hirse-Arten			

Nachbehandlungen

Clearfield Clentiga + Dash	1,0 l + 1,0 l	Quinmerac 250 + Imazamox 12,5	Nachauflauf	▪	▪ ¹⁾	●	◐	◑	●	●	◐	◑	◐	◑	●	○	◐	◑	○	O; B
Harmony SX + Öl	2 x 7,5 g + 1,0 l	Thifensulfuron 481	Nachauflauf	▪		◐	◑	◑	◑	●	◐	○	◐	◑	○	○	○	○	○	B

Spritzfolge im Abstand von 7-14 Tagen im Nachauflauf

1. Termin: Clearfield Clentiga + Dash	1,0 l + 1,0 l	Quinmerac 250 + Imazamox 12,5/	Nachauflauf	▪		●	◐	◑	◑	●	◐	◑	◐	◑	●	○	◐	◑		K;K + B
2. Termin: Harmony SX + Öl	7,5 g + 1,0 l	Thifensulfuron 481																		

Quelle: BayWa Pflanzenbauempfehlungen Frühjahr 2021 - Version Bayern

¹⁾ nur in Imazamox-toleranten Sorten