

Mais - Herbizidlösungen, überwiegend blattaktiv gegen Unkräuter und Ungräser

| Produkt/Lösung | Aufwandmenge /ha | Wirkstoff(e) g/l bzw. g/kg | Einsatz-termin | Unkräuter | | | | | | | | | | | | Ungräser | | | | | | | Hirsedauerleistung | Bodenwirkung Unkräuter | HRAC |
|----------------|------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------|------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|---------|---------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|--|--------------------|------------------------|------|
| | | | | Kleppenlabkraut | Gänsefußarten | Nachtschatten | Amarant | Ehrenpreis | Storchschnabel | Vogelknöterich | Windenknöterich | Ausfallraps | Kamille | Jährige Rispe | Ackerfuchsschwanz | Flughäfer | Hühnerhirse | Fingerhirse | Borstenhirse | Weidelgräser | Quecke | | | | |

TBA-frei

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|
| Elumis P Pack (Elumis + Peak) | 1,25 l + 20 g | Nicosulfuron 30; Mesotrione 75 + Prosulfuron 750 | BBCH 12 - 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B; F + B |
| Arigo + FHS + Peak + IP Pendi 400 SC | 300 g + 0,3 l + 12 g + 2,0 l | Nicosulfuron 120; Rimsulfuron 30; Mesotrione 360 + Prosulfuron 750 + Pendimethalin 400 | BBCH 12 - 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B; B; F + B; K |
| MaisTer power | 1,5 l | Foramsulfuron 30; Iodosulfuron 1; Thiencarbazone 10 | BBCH 12 - 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B, B; B |
| Nagano ¹⁾ + Nicogan | 1,0 l + 1,0 l | Mesotrione 100; Bromoxynil 100 + Nicosulfuron 40 | BBCH 12 - 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | F; C + B |
| Task + FHS + Callisto | 300 g + 0,25 l + 1,0 l | Rimsulfuron 33; Dicamba 609 + Mesotrione 100 | BBCH 12 - 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B; O + F |
| Nicogan | 1,0 l | Nicosulfuron 40 | BBCH 12 - 18 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | B |

Quelle: BayWa Pflanzenbauempfehlungen Frühjahr 2021 - Version Bayern