Mais - Herbizidlösungen

Produkt/Lösung	Aufwand-menge/ha	Wirkstoff(e) g/l bzw. g/kg	Einsatz-termin	Unkräuter										Ungräser										HRAC
				Klettenlabkraut	Gänsefußarten	Nachtschatten	Amarant	Ehrenpreis	Storchschnabel	Vogelknöterich	Windenknöterich	Ausfallraps	Kamille	Jährige Rispe	Ackerfuchsschwanz	Flughafer	Hühnerhirse	Fingerhirse	Borstenhirse	Weidelgräser	Quecke	Hirsedauerwirkung	Unkrautdauerwirkung	
TBA-haltig, Sulfonylharnstoff-frei, mit guter Bodenwirkung gegen Hirsen																								
Gardo Gold + Callisto (Zintan Gold Pack)	**3,0 l** + 0,75 l	**Terbuthylazin[2] 188; S-Metolachlor 313** + Mesotrione 100	**BBCH 12 - 18**	●	●	●	●	●	◕	◕	◕	◕	◕	●	◔	◔	●	◕	◑	○	○	◕	◕	**F + C; K**
Laudis Aspect Pack (Laudis + Aspect)	2,0 l + 1,5 l	Tembotrione 44 + Terbuthylazin[2] 333; Flufenacet 200	BBCH 12 - 15	●	●	●	●	●	◕	◕	◕	●	●	●	◕	◔	●	●	●	○	○	◑	◕	F + C; K
TBA-haltig, Sulfonylharnstoff-haltig, mit guter Bodenwirkung gegen Hirsen																								
Gardo Gold + Arigo + FHS	**2,5 l** + 250-300 g + 0,25-0,3 l	**S-Metolachlor 313; Terbuthylazin 188 +** Nicosulfuron 120; Rimsulfuron 30; Mesotrione 360	**BBCH 12 - 18**	●	●	●	●	●	◕	◕	◕	●	●	●	●	●	●	◕	●	◕	◕	◕	◕	**C; K + B; B; O**
Gardo Gold + Elumis (Elumis Gold Pack)	**2,5 l** + 1,25 l	**Terbuthylazin2) 188; S-Metolachlor 313 +** Nicosulfuron 30; Mesotrione 75	**BBCH 12 - 18**	●	●	◕	◕	●	◕	◕	◕	●	●	●	●	◕	●	◕	●	◕	◕	◕	◕	**C; K + B; F**
Gardo Gold + Task + FHS	**2,5 l** + 300 g + 0,25 l	**S-Metolachlor 313; Terbuthylazin2) 188 +** Rimsulfuron 33; Dicamba 609	**BBCH 10 - 14**	●	●	◑	●	◕	◕	◕	◕	●	●	●	●	●	●	◕	●	◕	◕	◕	◕	**C; K + B; O**
TBA-haltig, überwiegend blattaktiv gegen Unkräuter und Ungräser, mit Teil-Bodenwirkung gegen Unkräuter																								
Gardo Gold + Nicogan + Peak	**2,0 l** + 1,0 l + 16 g	**Terbuthylazin[2] 188; S-Metolachlor 313 +** Nicosulfruon 40 + Prosulfuron 750	**BBCH 12 - 17**	◕	◕	◑	◕	◕	◑	◕	◕	●	●	●	●	●	●	◕	●	◕	◕	◔	◑	**C; K + B; B**
Arigo + FHS + Zeagran ultimate[1]	300 g + 0,3 l + 1,25 l	Nicosulfuron 120; Rimsulfuron 30; Mesotrione 360 + Terbuthylazin[2] 250; Bromoxynil 100	BBCH 12 - 16	●	●	●	●	●	◑	◕	●	●	●	●	●	●	●	◕	●	◕	◕	◔	◕	B; B; F C;C
Nicogan + Zeagran ultimate[1]	1,0 l + 1,5 - 2,0 l	Nicosulfuron 40 + Terbuthylazin[2] 250; Bromoxynil 100	BBCH 12 - 16	●	●	◕	●	●	◑	◕	◕	●	●	●	●	●	●	◕	●	◕	◕	○	◑	B C; C

[1] Aufbrauch spätestens 17.09.2021.

Quelle: BayWa Pflanzenbauempfehlungen Frühjahr 2021 - Version Bayern

[2] **Terbuthylazin:** In allen Wasserschutzgebieten in Baden-Württemberg ist in den Schutzzonen I-III die Ausbringung von Terbuthylazin-haltigen Mitteln verboten. Auch außerhalb von Wasserschutzgebieten wird zum Schutz des Grundwassers die Anwendung von Terbuthylazin-haltigen Mitteln in Baden Württemberg nicht empfohlen.

Herbizide in Leguminosen/Sonnenblumen

Produkt/Lösung	Aufwand-menge/ha	Wirkstoff(e) g/l bzw. g/kg	Einsatz-termin	Anwendung in Kultur					Unkräuter										Ungräser				HRAC
				Ackerbohne	Futtererbsen	Lupine	Sojabohne	Sonnenblume	Klettenlabkraut	Kamille	Ackerhohlzahn	Ausfallraps	Amarant	Gänsefuß-Arten	Stiefmütterchen	Knöterich-Arten	Franzosenkraut	Nachtschatten	Ackerfuchsschwanz	Jährige Rispe	Hirse-Arten	Quecke	
Vorauflaufanwendungen																							
Gardo Gold	**3,0 - 4,0 l**	S-Metolachlor 312,5; Terbuthylazin 187,5	**Vorauflauf**			▪			◕	◑	◕	◕	◕	◕	◕	◑	◑	◑	◔	●	●	○	**K; C**
Boxer + Stomp Aqua	3,0 l + 2,0 l	Prosulfocarb 800 + Pendimethalin 455	Vorauflauf	▪	▪	▪		▪	◕	◑	◑	◔	◕	◕	◕	◑	◑	◕	◑	●	◔	○	N + K
Novitron Dam Tec	2,4 kg	Aclonifen 500 + Clomazone 30	Vorauflauf	▪	▪				●	◕	◑	◑	◕	●	◕	◕	◕	◔	◕	●	◕	○	F + F
Spectrum Plus	4,0 l	Dimethenamid-P 212,5; Pendimethalin 250	Vorauflauf NA* (nur Erbse)	▪	▪	▪	max. 2,5 l	▪	◑	◕	◕	◑	●	◕	◕	◑	●	◕	◑	●	◕	○	K; K

Quelle: BayWa Pflanzenbauempfehlungen Frühjahr 2021 - Version Bayern

*NA = Nachauflauf