

# Fresco®

## Meisterhaft in der Unkrautbekämpfung

- Breites Wirkungsspektrum
- Flexibel im Einsatz
- Blattaktiv mit langer Bodenwirkung



# Das Herbizid in Gemüsekulturen

Fresco® besitzt ein breites Wirkungsspektrum gegenüber Ungräsern und Unkräutern. Eine optimale Wirkung wird im Voraufbau der Unkräuter erreicht. Da der Wirkstoff Metobromuron über einige Wochen in der oberen Bodenschicht wirksam bleibt, werden auch später keimende Unkräuter miterfasst.

## Wirkungsspektrum

Die Wirkung von Fresco® wird erst nach Ausbildung der Keimlinge oder dem Austrieb der ersten Blätter der Unkräuter sichtbar.

Unkräuter	Unkräuter	Ungräser
Samtpappel	Kamille-Arten	Acker-Fuchsschwanz
Hundspetersilie	Einjähriges Bingelkraut	Blutrote Fingerhirse
Zurückgebogener Amaranth	Acker-Vergissmeinnicht	Hühnerhirse
Beifuß-Ambrosie	Vogelknöterich	Deutsches Weidelgras
Acker-Gauchheil	Windenknöterich	Einjährige Rispe
Acker-Hundkamille	Ampfer-Knöterich	Gewöhnliches Rispengras
Gewöhnliche Melde	Floh-Knöterich	Kletten-Borstenhirse
Dreiteiliger Zweizahn	Portulak	Grüne Borstenhirse
Gewöhnliches Hirtentäschel	Acker-Rettich	
Weißer Gänsefuß	Gewöhnliches Greiskraut	
Bastard-Gänsefuß	Acker-Senf	
Gemeiner Stechapfel	Schwarzer Nachtschatten	
Gewöhnlicher Erdrauch	Acker-Ziest	
Franzosenkraut	Vogelmiere	
Kletten-Labkraut	Kleine Brennnessel	
Stundenblume	Persischer Ehrenpreis	
Taubnessel-Arten	Acker-Stiefmütterchen	
	Gewöhnliche Spitzklette	

Die Einstufung der Wirkung basiert auf einer Aufwandmenge von 1,5 l/ha Fresco®.

- sehr gute Bekämpfung
- gute Bekämpfung
- moderate Bekämpfung
- unzureichende Bekämpfung

## Anwendungsempfehlung

### Spargel

nach der Ernte,  
Juli bis August




### Möhre, Pastinak, Busch-/Stangenbohne, Tabak

**Möhre, Pastinak** (nur zu Saatguterzeugung): Vor dem Auflaufen, März bis Mai

**Busch-/Stangenbohne:** Vor dem Auflaufen, April bis Juni, BBCH 00-08 der Kultur

**Tabak:** Vor dem Pflanzen, März bis Mai



# Fresco®

## Meisterhaft in der Unkrautbekämpfung

### WIRKSTOFF

400 g/l Metobromuron (C2)

### FORMULIERUNG

Suspensionskonzentrat (SC)

### SCHADORGANISMUS

Franzosenkraut-Arten, Vogel-Sternmiere, Einjähriges Rispengras

### AUFWANDMENGE

Möhre, Pastinak: 1,25-2 l/ha  
(je nach Bodenart)  
Busch-/Stangenbohne: 2-2,5 l/ha  
(je nach Bodenart)  
Spargel, Tabak: 3,75 l/ha

### MAX. ANZAHL ANWENDUNGEN

Alle Kulturen: 1 x pro Kultur/Jahr

### ANWENDUNGSZEITPUNKT

Im Voraufbau, je nach Kultur  
Zeitpunkt unterschiedlich

### WARTEZEIT

F

### PACKUNGSGRÖßE

5 l



® - registrierte Warenzeichen des Herstellers. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Stand: März 2020.



Belchim Crop Protection Deutschland GmbH

Wollenweberstrasse 22 | D-31303 Burgdorf | T. 05136-92038-0 | F. 05136-92038-60  
www.belchim-agro.de | info-de@belchim.com