

WIRTAS

Einzigste Dinkelsorte für den Frühlingsanbau

- Die Alternative für den Frühlingsanbau

Sorteneigenschaften*

Ährenschieben	5
Reife	5
Wuchshöhe	6

Agronomische Eigenschaften*

Neigung zu Lagerung	5
Anfälligkeit für Mehltau	3
Anfälligkeit für Braunrost	6
Anfälligkeit für Gelbrost	5

Ertragsparameter

Bestockung und Ährenausbildung fördern.

Kulturführung:

Aussaat (Empfehlung in kg/ha):

110			140			350			180		
1-10	11-20	21-28	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31			
Feb			Mär			Apr					

Saatgut von Wirtas wird entspelzt angeboten. Entspelztes Saatgut keimt schneller und gleichmäßiger und lässt eine genauere Dosierung der Saatstärke zu. Die ideale Saatzeit richtet sich nach Vegetationsbeginn und Bodenverhältnissen. Früher Anbau vorteilhaft - später Anbau führt zu verzögerter Reife.

N-Düngung (in kg pro ha):

BBCH 13-25	30-50 kg
BBCH 31-32	30-50 kg

Pflanzenschutz:

Im konventionellen Anbau ist ein Fungizideinsatz nur bei sehr starkem Krankheitsdruck (Braunrost, Mehltau) sinnvoll. Gute Gelbrosttoleranz.

Wachstumsregler:

Ein Wachstumsreglereinsatz ist nur in gut entwickelten Beständen sinnvoll.

* ... Quelle: eigene Einstufung, 1 = geringe Ausprägung bzw. früh, 9 = starke Ausprägung bzw. spät

SOMMERDINKEL

Die dargestellten Daten und Grafiken geben die Erkenntnisse aus Wertprüfungsberichten und Eigenversuchen wieder. Für die Reproduzierbarkeit dieser Ergebnisse übernehmen wir keine Gewähr. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
© RWA Raiffeisen Ware Austria AG, Raiffeisenstraße 1, 2100 Korneuburg
Tel.: 02262 75550 – 0, e-mail: office@diesaat.at, www.diesaat.at
Erstellungsdatum: Jänner 2022

