

SOMMERRAPS 2026

Eine interessante Option!



STARKE SORTEN FÜR DEN SOMMER:



Kohlhernieresistente Sommerraps-Hybridsorte mit hohem Kornertrag und Ölgehalt.

MENTHAL

MENTHAL ist die einzige kommerzielle kohlhernieresistente Sommerrapsorte in Europa. Zusätzlich zu dieser einzigartigen Eigenschaft verbindet MENTHAL einen exzellenten Kornertrag mit einem mittleren bis hohen Ölgehalt. Infolgedessen zeigt MENTHAL ebenfalls einen mittleren bis hohen Ölertrag. Die Hybride wird durch ihre gute Standfestigkeit charakterisiert und gehört zur Gruppe der später blühenden und später reifenden Sorten.



Leistungsträger mit sehr hohem Korn- und Ölertrag.

LAKRITZ

LAKRITZ schöpft seine Kraft aus einem kräftigen Wurzelsystem. Schon die robuste, zügige Jugendentwicklung schafft ein standfestes Fundament für sehr hohe Kornerträge. Der mittlere Blühbeginn lässt genügend Zeit für eine gute vegetative Entwicklung. Die Blüte selbst ist kurz und kräftig, so dass Abreife und Drusch mittel bis früh erfolgen können. National und international zeigt sich LAKRITZ bereits mehrjährig enorm ertragsstabil und auch anpassungsfähig an trockenere Verhältnisse. Hohe Ölgehalte sorgen bei der Vermarktung für das typisch vollmundige LAKRITZ-Aroma.

ANBAU-STECKBRIEF

AUSSAAT

Möglichst früh, angelehnt an die Aussaatzeit von Hafer. Saatbett geht vor Saatzeit, bis Mitte April möglich! Die Keimung erfolgt bereits bei Bodentemperaturen von 2 bis 3 °C, leichte Fröste bis -4 °C werden toleriert.

AUSSAATSTÄRKE

60 bis 80 keimf. Körner/m²

UNKRAUTBEKÄMPFUNG

Eine chemische Unkrautbekämpfung kann im frühen Nachauflauf mit zugelassenen Produkten erfolgen.

DÜNGUNG (Ertragsziel 30 dt/ha)

Je nach Versorgungsstufe und Vorfrucht:

160 kg/ha Kali, 70 kg/ha Phosphor und 80 bis 120 kg/ha N, Aufteilung zur Aussaat und Streckungsbeginn möglich. Zu Beginn des Streckungswachstums verbessern 30 bis 40 kg N/ha den Schoten- und Kornansatz.

Eine ausreichende Bor- und Schwefeldüngung (30 kg/ha S) ist erforderlich. Vorgaben der Düngeverordnung beachten.

SCHADERREGER

Rapsglanzkäfer Bekämpfungsrichtwert beachten (besonders auf frühen Befall achten), später Kohlschotenmücke und Rüsslerarten über Gelbschalen kontrollieren. Bei feuchter Witterung während der Blüte sollte eine Sclerotinia-Bekämpfung in der Vollblüte erfolgen.

ABREIFE

Wachstumsreglermaßnahme vor der Blüte erhöht die Standfestigkeit. Abreife: Mitte bis Ende August. Der gute Vorfruchteffekt sollte durch Wintergetreide genutzt werden.