

Toxinbinder

Mykotoxine sind Stoffwechselprodukte von Fusarienpilzen, die auf Getreide wachsen. Fusarien können sich während der Reifeperiode v. a. bei feuchtwarmer Witterung rasch ausbreiten und Mykotoxine erzeugen. Diese Toxine finden sich im Erntegut wieder und stellen ein Risiko für Nutztiere dar.



Bonimal VET DeTox

- Bindung und Inaktivierung von Myko- und Endotoxinen
- EU-registrierter Mykotoxinbinder auf Basis von Bentoniten
- Spezifische Hefe (Enzyme) und Hefezellwände zur Inaktivierung
- Umwandlung der Mykotoxine durch spezifische Enzyme in ungiftige Abbauprodukte
- Unterstützung der Stoffwechselorgane und des Immunsystems durch Phytogene und Seealgenmehl
- Konservierende Zusatzstoffe verhindern eine erneute Bildung von Mykotoxinen

Einsatzempfehlung

- Ferkel: 2,5 kg/t Futter
- Sauen: 2,0 kg/t Futter
- Mastschweine: 2,0 kg/t Futter

Gebinde: 25 kg Sack

Elektrolyte

Bonimal VET Elektrolyt

- Kurzfristige Verbesserung des Elektrolythaushalts der Tiere
- Stabilisiert die Darmflora mittels des enthaltenen Probiotikums
- Leicht verwertbare Rohkomponenten
- Energieausgleich durch Traubenzucker
- Schnelle Revitalisierung nach Krankheiten

Einsatzempfehlung

- Ferkel bis 36 kg: 50 g/l Wasser
- Sauen und Mastschweine: 50-100 g/l Wasser

Vor und nach dem Absetzen der Ferkel und bei Verdauungsstörungen **Bonimal VET Elektrolyt-Lösung** für 24-48 Stunden zur freien Aufnahme über die Tränke zur Verfügung stellen und gleichzeitig die Futtermenge reduzieren. Bei der Einstellung von Babyferkeln für 24 Stunden **Bonimal VET Elektrolyt-Lösung** als Tränke verabreichen.

Gebinde: 25 kg Sack

FEED

Spezial- futter- mittel Schwein



Innovative Ergänzungen für hofeigene Mischungen



Bonimal

Nutztierhaltung mit Methode

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner der BayWa.



bonimal.de

Hier finden
Sie weitere
Informationen.

Eine Marke der


BayWa

BayWa AG
Arabellastr. 4
81925 München
kontakt@bonimal.de

Stand: März 2026

Organische Säuren zur Absicherung von hofeigenen Mischungen

Die Beimischung von organischen und anorganischen Säuren senkt die Säurebindungskapazität der Rationen und damit den pH-Wert im Magen. Säuren aktivieren Verdauungsenzyme und hemmen Mikroorganismen. Der Einsatz organischer Säuren bzw. deren Kombinationen sowie die Dosierungen müssen in Abhängigkeit vom jeweiligen Ziel und Wirkort eingesetzt werden.



Bonimal VET OptiAcid

- Kombination: Ameisen-, Milch-, Fumar-, Orthophosphor- und Zitronensäure
- Für eine schnelle pH-Wert-Absenkung im Magen
- Steigerung der Futteraufnahme und Optimierung der Futterverwertung

Einsatzempfehlung

- Ferkel: 7,0 kg/t Futter
- Sauen und Mastschweine: 5,0 kg/t Futter

Gebinde: 25 kg Sack

Bonimal VET LiquidAcid

- Kombination: Ameisen-, Milch-, Propion-, Essig- und Zitronensäure, Kupfersulfat
- Schnelle pH-Wert-Absenkung im Magen
- Steigerung der Futteraufnahme und Optimierung der Futterverwertung
- Eignet sich insbesondere auch zum Einsatz im Tränkewasser, auch zur gleichzeitigen Optimierung der Tränkewasserhygiene

Einsatzempfehlung

Futter:

- Ferkel: 8,0 kg/t Futter
- Sauen und Mastschweine: 6,0 kg/t Futter

Tränkewasser:

1,0 kg/1.000 l Tränkewasser

Eine laufende Kontrolle des pH-Wertes des Tränkewassers ist bei allen Konzentrationen zu empfehlen. Der pH-Wert des Tränkewassers sollte einen Wert von 4,2 nicht unterschreiten.

Gebinde: 25 kg Kanister, 225 kg Fass, 1.000 kg IBC

Bonimal VET ProfiAcid

- Mittelkettige Fettsäuren und Monoglyceride
- Effektive Reduzierung des Keimdrucks grampositiver (Streptokokken, Staphylokokken, Clostridien) und gramnegativer Keime (Salmonellen, E. coli, Chlamydien, Pseudomonaden, Campylobacter)
- Einsatz in Kombination mit **Bonimal VET OptiAcid** verstärkt die Wirkung beider Produkte

Einsatzempfehlung

Grunddosierung von **Bonimal VET OptiAcid** mit 5,0 kg/t Futter + nachfolgend angegebene Dosierung **Bonimal VET ProfiAcid**:

- Absetzferkel: 2,5 kg/t Futter
- Aufzuchtferkel: 2,0 kg/t Futter
- Sauen: 1,5–2,0 kg/t Futter
- Mastschweine: 1,5–2,0 kg/t Futter

Gebinde: 25 kg Sack

Bonimal VET ProfiAcid Liquid

- Breites Wirkungsspektrum durch Kombination verschiedener Monoglyceride von kurz- und mittelkettigen Fettsäuren und Monoglyceriden von Buttersäure
- Effektive Reduzierung des Keimdrucks grampositiver (Streptokokken, Staphylokokken, Clostridien) und gramnegativer Keime (Salmonellen, E. coli, Chlamydien, Pseudomonaden, Campylobacter)
- Monoglyceride von Buttersäure fördern die Darmstabilität durch eine optimale Nährstoffzufuhr für die Darmzotten
- Verbesserung der Futterverwertung bei gleichzeitiger Senkung der Futterkosten

Einsatzempfehlung

- 0,75 – 1,25 l/1.000 l Tränkewasser
- 1,5 – 2,5 kg/1.000 kg Flüssigfutter
- 3,5 – 7,0 kg/to Trockenfutter

Gebinde: 1.100 kg IBC



TIPP

- Temperatur von min. 28–30 °C nach dem Absetzen der Ferkel
- Überbelegung bei Schweinen vermeiden
- Wasser: Keimbelastung minimieren – Einsatz von geeigneten Reinigungsmitteln wie **Bonimal CARE Hydrocare**
- Max. 8 Tiere pro Tränkenippel, Durchflussraten der Nippel optimieren
- Fütterungstechnik: Funktionstüchtigkeit laufend überprüfen