

Le renfort des programmes anti-dicotylédones !

- Toutes céréales
- Souplesse d'utilisation
- Efficacité contre les vivaces



Turban®

FICHE TECHNIQUE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre technicien habituel ou à consulter le site www.ascenza.fr



ASCENZA®
— FARMING YOUR FUTURE —



Turban®

Composition : 750 g/kg de Tribénuron – HRAC : B – Granulés dispersables (WG)

Le tribénuron-méthyle est un herbicide appartenant à la famille chimique des sulfonyleurées. Rapidement absorbé par les feuilles et les racines, il migre par systémie jusqu'aux zones de croissance. La croissance des adventices s'arrête rapidement, leur destruction complète arrive dans les 7 à 21 jours.

USAGES AUTORISÉS

| CULTURES | DOSE MAX D'EMPLOI | NOMBRE D'APPLICATION | STADE D'APPLICATION - DAR | ZNT AQUA |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| Blé tendre, blé dur, orge, seigle, épeautre et triticale - hiver et printemps | Automne : 0,02 kg/ha | Automne : Uniquement sur sols acides 1 application/an | Jusqu'à BBCH 39 DAR type F | 5 m |
| | Printemps : 0,03 kg/ha | Printemps : 1 application/an sur sols acides, 1 application tous les 2 ans sur sols alcalins | | |

| LIMITATION DE LA POUSSE ET DE LA FRUCTIFICATION | DOSE MAX | NOMBRE D'APPLICATION | STADE D'APPLICATION | ZNT AQUA |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------|----------|
| Moutarde blanche, Phacélie, Trèfle blanc, Vesce commune | 0,01 kg/ha | 1 / an | NA | 5 m |
| Navette fourragère, Trèfle d'Alexandrie, Trèfle incarnat, Trèfle violet | 0,015 kg/ha | | NA | |
| Trèfle de perse | 0,01 kg/ha | | Délai de réintroduction du bétail : 10 j | |
| Jachère spontanée | 0,02 kg/ha | | NA | |

Délai de rentrée : 48 h

RECOMMANDATIONS D'EMPLOI

- ✓ Pour optimiser le traitement, privilégier une utilisation avant le stade 3-4 feuilles des adventices.
- ✓ Traitement possible à partir de 5°.
- ✓ Pour une bonne pénétration du produit, respecter un délai sans pluie de 4 heures.
- ✓ Traiter sur une culture en bon état végétatif, bien implantée.
- ✓ Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du tribénuron sur sols alcalins (pH supérieur à 7) au printemps plus d'une fois tous les deux ans à une dose supérieure ou égale à 22,5 g/ha de tribénuron. Ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du tribénuron sur sols alcalins (pH supérieur à 7) en automne à une dose supérieure à 15 g/ha.

SPECTRE

Efficacité sur plantule (0,02 kg/ha)

| | |
|-----------------------------|--|
| Alchemille | |
| Anthémis | |
| Anthriscue | |
| Bifora | |
| Bleuet | |
| Capselle bourse à pasteur | |
| Céraiste aggloméré | |
| Coquelicot | |
| Fumeterre | |
| Gaillet | |
| Géranium | |
| Laiteron rude | |
| Lamier | |
| Matricaire | |
| Mouron des champs | |
| Moutarde | |
| Myosotis | |
| Pensée | |
| Ravenelle | |
| Renoncule | |
| Renouée des oiseaux | |
| Renouée liseron | |
| Scandix | |
| Séneçon | |
| Stellaire | |
| Véronique de Perse | |
| Véronique feuille de lierre | |

Efficacité sur vivaces à 0,03 kg/ha

| | |
|---------|--|
| Chardon | |
| Ortie | |
| Rumex | |

- Très sensible : > 95 % d'efficacité
- Sensible à très sensible : > 85 % d'efficacité
- Moyennement sensible : 70 à 84 % d'efficacité
- Peu sensible : < 70% d'efficacité

TURBAN® : AMM n°2170035 – Granulés dispersables dans l'eau (WG) – 750 g/kg de tribénuron méthyl - © Marque déposée et détenteur d'homologation : ASCENZA. Distribué par ASCENZA - 2-12 rue du chemin des Femmes – Immeuble Odyssee – 91300 MASSY - T. 01 69 53 98 89 - www.ascenza.fr. Distributeur de produits phytosanitaires à des utilisateurs professionnels. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine, animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez le site <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, restrictions d'emploi et contre-indications se référer à l'étiquette du produit ou www.phytodata.com. Annule et remplace toute version précédente. Juin 2020

ASCENZA®

FT_TURBAN_06_2020

H317 Peut provoquer une allergie cutanée - H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

ATTENTION



PRODUITS À USAGE EXCLUSIF DES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.