



Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



PRÉCOCITÉ FLORAISON



Qualité de la graine

RICHESSSE EN HUILE



TAILLE DE LA GRAINE



Agronomie

CLASSE DE HAUTEUR




Maladies et Ravageurs


SENSIBILITÉ PHOMOPSIS



SENSIBILITÉ AU VERTICILLIUM



COMPORTEMENT À L'OROBANCHE CUMANA



SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA CAPITULE



SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA COLLET

-

RÉSISTANCE MILDIU



→ RÉSISTANTE AUX RACES

100, 304, 307, 314, 334, 703, 704, 710, 714

→ SENSIBLE AUX RACES

-

→ RACES NON TESTÉES

-

Autres caractéristiques

Année	Teneur en huile (%)	Humidité à la récolte (%)	Poids de Mille Graines (g)	Teneur en acide oléique (%)	Variabilité acide oléique (%)	Date-stade début floraison	Hauteur (cm)
2023	48,2	6,9	57,8	88,3	1,7	03/07/2023	101,4
	3 essais	4 essais	3 essais	5 essais	5 essais	4 essais	4 essais
2022	44,3	8,1	51,7	88,7	0,9	03/07/2022	144,9
	14 essais	14 essais	14 essais	13 essais	13 essais	12 essais	11 essais
2021	47	8,8	50,7	86,5	1,5	14/07/2021	170,7
	11 essais	12 essais	9 essais	12 essais	12 essais	8 essais	8 essais
2020	44,9	6	53,2	88,5	1	03/07/2020	143,7
	7 essais	7 essais	7 essais	7 essais	7 essais	5 essais	6 essais