



itcan SL270®

Inhibiteur de germination des pommes de terre **en formulation liquide**, à utiliser en végétation

➔ **itcan SL270® permet, avec un traitement en végétation, de maîtriser la germination durant le stockage.**



Jusqu'à **4 mois d'efficacité** (selon la variété et les conditions de stockage)

Alternative technique et économique au CIPC

Remplace la première thermo-nébulisation

Sans risque de brûlure de la peau des tubercules

Contrôle la germination interne

➔ **itcan SL270® permet de contrôler les repousses de pomme de terre dans les cultures suivantes.**



Plus de **80 % d'efficacité** contre les repousses

Moins de concurrence avec la culture

Moins de réservoirs de maladies dans le sol

Moins de supports pour les ravageurs

➔ **itcan SL270® limite les repousses physiologiques.**



Assurance contre les
à-coups climatiques

Diminution de la vitrosité

Observations 2010 sur 15 parcelles	Données moyennes	
	Parcelles non traitées	Parcelle traitée
Rendement net (t/ha)	45,1	54,9
Vitrosité (%)	24	9
Matière sèche (%)	18,2	19,1

➔ **itcan SL270® permet l'obtention de tubercules de formes plus régulières.**

Meilleure valorisation possible de la récolte

Stades d'application sur pomme de terre :

Si production pour la **transformation** :

Traitement à 11 l/ha si 80 % des tubercules > 35-40 mm

Si production pour le **marché du frais** :

Traitement à 11 l/ha si 80 % des tubercules > 25-30 mm

Application possible jusqu'à 15 jours avant le défanage



Kreglinger

Grote Markt 7
B. 2000 Anvers (Belgique)
Tel : 0032 (0)32 222 020
www.kreglinger.com

Pour la détermination du stade d'intervention, seuls les tubercules de plus de 15 mm sont pris en compte.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.



itcan SL270®

Nouvelle référence à base d'hydrazide maléïque

➡ **itcan SL270® permet de préserver la qualité au cours du stockage**



Traitement quand 10 % à 30 % de tombaison soit environ 10 à 15 jours avant la récolte.

➡ **itcan SL270® aide à conserver les carottes au champ en limitant les racinelles secondaires**



Traitement début jaunissement du feuillage (5 à 20%)
Traitement à effectuer avant les premières gelées

➡ **itcan SL270® est indispensable à la conduite de la culture du tabac**



Très grande efficacité dans la **lutte contre l'orobanche**
Action inhibitrice persistante de la reprise des bourgeons
Traitement 5 à 7 jours après l'inhibition de contact

Précautions d'emploi

- **Ne pas utiliser Itcan SL 270 en production de plants / semences.**
- Les plantes doivent être encore vertes, **actives**, sans stress (maladies, attaque d'insectes, stress dû à la sécheresse / déficit hydrique) afin d'assurer les **conditions optimales d'absorption et de translocation du produit.**
- **Température inférieure à 25 °C** au moment de l'application et éviter les températures supérieures à 30°C dans les heures qui suivent l'application. **Il est conseillé d'appliquer Itcan SL 270 tôt le matin.**
- **Hygrométrie > 50 %**
- Volume de bouillie **minimum : 200 l/ha**, si possible 1 l. d'Itcan SL 270 pour 30 l. d'eau. **Pas de mélange.**
- **Pas d'irrigation** (ou de pluie) **dans les 24 h.** suivant l'application.
- Dans le cadre des bonnes pratiques agricoles, rincer 3 fois les emballages et verser l'eau de rinçage dans le pulvérisateur.

Itcan SL 270 existe en conditionnements de 15 l, 200 l, 600 l. et 1000 l.

Culture	Dose	Usage autorisé	D.A.R.	Z.N.T.
Pomme de Terre	11 l/ha	Inhibition des germes	21 j.	5 m.
Carotte		Contrôle du redémarrage foliaire et des racines secondaires		
Ail, Echalote, Oignon	9 l/ha	Inhibition des germes	4 j.	
Tabac	8,33 l/ha	Ebourgeonnement	-	
		Lutte contre l’Orobanche		



Kreglinger

Grote Markt 7
B. 2000 Anvers (Belgique)
Tel : 0032 (0)32 222 020
www.kreglinger.com

Itcan SL 270® - SL, Concentré Soluble - 270 g/l d'hydrazide maléïque - AMM n°2120199 - H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - EUH 401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement - Sp1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage - Spe3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 m. par rapport aux points d'eau - Délai de Réentrée : 6 h. - Marque déposée : Kreglinger Europe N.V. - Détenteur de l'AMM : Kreglinger Europe N.V. - Lire attentivement l'étiquette avant toute utilisation et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi. - Novembre 2017, annule et remplace toute version précédente.

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**