

PAKKAUSSELOSTE

AURIZON korvatipat, suspensio

Valmiste sisältää kolmea vaikuttavaa ainetta. Marboflokasiini on bakteereja tappava aine, joka tehoaa moniin eri bakteereihin. Klotrimatsoli tehoaa erilaisiin sienten ja hiivojen aiheuttamiin tulehduksiin. Deksametasoniasetaatti on kortikosteroidi, joka lievittää tulehdusta ja kutinaa korvassa.

Koostumus

1 ml valmistetta sisältää vaikuttavina aineina marboflokasiinia 3,0 mg, klotrimatsolia 10,0 mg ja deksametasoniasetaattia 1,0 mg (vastaten deksametasonia 0,9 mg). Apuaineena on propyyliigallaattia (E310) 1,0 mg/ml.

Käyttöaiheet

Erilaisten bakteerien, sienien ja hiivojen aiheuttamat ulkokorvan tulehdukset koirilla.

Annostus ja antotapa

Ravista pulloa hyvin ennen käyttöä. Pakkaus sisältää erillisen tiputuskärjen, joka kiinnitetään pullon suuhun ennen lääkkeen annostelua.

Eläinlääkärisi voi määrätä valmistetta käytettäväksi myös muulla annoksella, kuin mitä tässä on suositeltu. Noudata aina eläinlääkärisi antamia ohjeita. Tiputa korvaan 10 tippaa kerran päivässä 7-14 päivän ajan (1 ml = n. 40 tippaa). Hiero varovaisesti korvan tyveä lääkkeen annon jälkeen, jotta lääke leviää myös korvankäytävän alimpiin osiin. Viikon hoidon jälkeen eläinlääkäriin tulee arvioida toisen viikon jatkohoidon tarve.

Vasta-aiheet

Valmistetta ei tule käyttää koirille, joiden tärykalvo on puhjennut tai jos koiran tiedetään olevan yliherkkä jollekin valmisteen aineosalle. Valmistetta ei tule käyttää tiineille tai imettäville nartuille.

Haittavaikutukset

Koska valmiste sisältää kortikosteroidia (deksametasoniasetaatti), kortikosteroideille tyypillisiä haittavaikutuksia voi ilmetä. Näitä ovat lähinnä erilaiset veriarvojen muutokset. Jos ulkoisesti käytettäviä kortikosteroidivalmisteita annostellaan tiheään ja käytetään pitkään, niiden tiedetään aiheuttavan paikallisia ja systeemisiä haittavaikutuksia kuten lisämunuaisten toiminnan heikentymistä, ihon ohenemista ja haavojen paranemisen hidastumista. Joissain harvoissa tapauksissa valmisteen käytön yhteydessä on havaittu kuuroutta, joka on yleensä ollut ohimenevää. Kuuroutta on esiintynyt pääasiassa iäkkäillä koirilla.

Erityiset varotoimet

Jotta resistenttejä bakteerikantoja ei pääsisi syntymään, fluorokinoloniantibiootteja, joihin marboflokasiinikin kuuluu, tulisi käyttää vain silloin, kun muut antibiootit eivät ole tehonneet tai niiden tiedetään tehoavan huonosti. Eläinlääkäriin tulee varmistaa tärykalvon eheys ennen valmisteen käytön aloittamista.

Käyttö tiineyden ja laktation aikana

Valmistetta ei tule käyttää tiineille tai imettäville nartuille.

Varoitukset lääkkeen antajalle

Pese kädet huolellisesti lääkkeen annon jälkeen. Vältä valmisteen joutumista silmiin. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee runsaalla vedellä. Jos tiedät olevasi yliherkkä jollekin valmisteen aineosalle, vältä valmisteen käsittelyä.

Säilytys ja kesto aika

Ei lasten ulottuville. Säilytä alle 30 °C. Älä käytä pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Avattu pullo säilyy 2 kuukautta avaamisen jälkeen säilytettynä alle 30 °C:ssa. Käyttämätön valmiste tulee toimittaa apteekkiin hävitettäväksi.

Myyntiluvan haltija

Vetoquinol S.A, B.P. 189, Magny-Vernois, F-70204 LURE Cedex, Ranska

Markkinoija

Vetcare Oy, PL 99, 24101 Salo

Pakkausselosteen päiväys

29.5.2006