

Canikur® -tabletit

Erikoisruokavalio, täydennysrehu



Äkillisten ruuan imeytymishäiriöiden vähentäminen koirilla.

Canikur purutabletteja käytetään äkillisen ripulin ja siitä toipumisen aikana

Koirat pitävät Canikur-tablettien mausta ja useimmat syövät ne vapaaehtoisesti, tabletin voi tarvittaessa jakaa tai murskata. Pienille koirille annosteltaessa tabletin pienentäminen voi olla tarpeellista. Jos koira ei syö tablettia sellaisenaan, muserra se palasiksi kupissa lusikan avulla ja lisää joukkoon 5 ml lämmintä vettä (läpipainopakkauksen tablettikolo on tilavuudeltaan 5 ml). Sekoita murskattu tabletti ja vesi tahnaksi ja anna se suoraan koiran suuhun. Jos haluat antaa tahnan ruiskulla, lisää yhtä tablettia kohti 10 ml vettä.

Myös stressiripulin ennaltaehkäisyyn

Stressin tiedetään häiritsevän ruuansulatuskanavan toimintaa ja aiheuttavan ruuansulatushäiriöitä, esimerkiksi ripulia. Tilanetta voidaan helpottaa antamalla Canikuria, kun koiran tiedetään joutuvan stressiä aiheuttaviin tilanteisiin, esimerkiksi kilpailuihin, matkalle, näyttelyyn tai muuhun epätavalliseen tilanteeseen. **Canikuria annetaan 1 tabletti 10 elopainokiloa kohti näyttely-, kilpailu- tai matkapäivän aamuna.** Annostelua jatketaan joka aamu, kunnes stressitilanne on ohitse. Koiraa tulee ruokkia koko ajan normaalisti. On tärkeää huolehtia, että koiralla on aina vettä saatavilla vapaasti.

Anna koiralle taulukon mukainen määrä purutabletteja 4 kertaa n. 8 tunnin välein. Koiralla tulee koko hoidon ajan olla juomavettä vapaasti saatavilla.

Annostelu

Koiran paino (kg)	≤ 5	6-15	16-25	26-40	41-60	>60
Tabletteja/annos	1	2	3	4	5	6
Kokonaismäärä tabletteja hoitoa kohden	4	8	12	16	20	24

Koostumus: Glukoosi, riisitärkkelys, sitruspulppa, propaani-1,2-dioli, natriumkloridi, hydrolysoitu lupiinivalkuainen, natriumbikarbonaatti, natriumsitraatti, kaliumkloridi, dinatriumfosfaatti, auringonkukkaöljy. **Ravintoaineet:** Glukoosi 35,5%, raakavalukuainen 1,4%, raakakuitu 3,0%, raakasävyä 4,0%, tuhka 17,5%, suolahappoon liukenematon tuhka 6,5%, natrium 2,3%, kalium 0,8%. **Lisäaineet:** Sepioliitti 5%, lesitiini (1c322) 5%, kaoliini.

ETUSIJALLA ELÄINTEN HYVINVOINTI

Painettu 100% kiertäytyspaperille.

Canikur® Pro -pasta

Erikoisruokavalio, täydennysrehu



Pakkauskoot
15 ml, 30 ml ja
60 ml

Koiran ja kissan fysiologisen ruuansulatuksen vakauttaminen

Ruuansulatushäiriöiden ehkäisemiseksi, niiden aikana ja niiden jälkeen tarkoitettu erikoisruokavalio, täydennysrehu. Sisältää terveessä suolessa luonnollisesti esiintyvän probioottisen bakteerikannan. Sisältää myös Bio-Mos® -C (prebioottia), joka tukee hyödyllisten bakteerien kasvua suolistossa ja bentoniittia, joka on luonnollinen sitova aine.

Käännä ruiskun männässä oleva rengas oikean annoksen kohdalle ja annostelee Canikur Pro tahna ruokakuppiin tai suoraan eläimen suuhun. Sulje ruisku korkilla käytön jälkeen, jotta tahna ei kuivu. Anna Canikur Pro tahnaa eläimelle vähintään

3 päivän ajan. Valmistetta voidaan käyttää niin pitkään, kun se on tarpeellista tai eläinlääkäriin ohjeen mukaan ruuansulatushäiriöiden ehkäisemiseksi, niiden aikana ja niiden jälkeen. Noudata ohjeannosta.

Huom! Säilytä avattuna käyt. ennen (EXP) päivään asti.

Annostelu

Kissoille	1-2 ml	kahdesti päivässä
Koirille ≤ 10 kg	2 ml	kahdesti päivässä
11-25 kg	4 ml	kahdesti päivässä
26-40 kg	6 ml	kahdesti päivässä

Koostumus

Soijajäljy, inaktivoitu hiiva, lupiinin valkuaisjauhe, glukoosi, natriumkloridi, dinatrium-fosfaatti, auringonkukkaöljy. Lisäaineet: *Enterococcus faecium* (DSM 10663/NCIMB 10415) (suoliston mikrobiston tasapainottaja): 2×10^{12} pmy/kg, bentoniitti 1m558i (sitova aine): 17%. Bentoniitti voi sitoa makrolideja, joten vältä samanaikaista makrolidien käyttöä suun kautta.



Boehringer
Ingelheim

vetcare.fi
vetcare@vetcare.fi
f vetcarefinland
@lemmikkisihyvaksi



ETUSIJALLA ELÄINTEN HYVINVOINTI