

Samenvatting richtlijn: syfilis

Categorie	Informatie - Actie
Kliniek	> Primaire syfilis: primaire laesie (ulcus of sjanker); > Secundaire syfilis: gegeneraliseerd. Maculopapuleuze eruptie, maar elk orgaansysteem kan aangetast zijn; > Latente syfilis: de asymptomatische latentieperiode tussen secundaire en tertiaire syfilis; > Tertiaire syfilis: omvat o.a. cardiovasculaire, neuro- en orgaansyfilis; > Neurosyfilis kan in elk stadium optreden; > Congenitale syfilis er bestaat een vroeg en een late vorm.
Diagnose	Er zijn 2 verschillende types serologische testen: de treponemale (TPPA of TPHA) en niet-treponemale test (RPR of VDRL). De interpretatie is afhankelijk van het klinische stadium. Treponemale testen blijven levenslang positief en hebben geen correlaat met ziekteactiviteit. Niet-treponemale testen worden gebruikt voor de opvolging van behandeling en diagnose van herinfectie.
Incubatieperiode	> Primaire syfilis: gemiddeld 3 weken (10 tot 90 dagen); > Secundaire syfilis: 6 weken tot 6 maanden; > Tertiaire syfilis: 2 tot 30 jaar na besmetting.
Besmettelijke periode	> Bij aanwezigheid primaire laesies en condylomata; > Bij secundaire syfilis zijn huidletsels weinig besmettelijk; > Bij syfilis latens tarda en tertiaire syfilis is transplacentaire transmissie mogelijk (niet besmettelijk via seksueel contact).
Reservoir	Humaan.
Besmettingsweg	> Seksuele overdracht met direct contact met actieve laesies; > Overdracht via bloed zeer zeldzaam; > Overdracht van moeder op kind is mogelijk in elk stadium.
Risicogroepen	Personen met wisselende, onbeschermd seksuele contacten.
Maatregelen bij een geval	
1. Bronopsporing	Zie contactonderzoek.
2. Contactonderzoek en partnerwaarschuwing	Criteria en tijdslijn voor partnerverwittiging: > Primaire syfilis: seksuele contacten afgelopen 3 maanden; > Secundaire syfilis: seksuele contacten afgelopen 6 maanden; > Latente syfilis: seksuele contacten afgelopen 12 maanden; > Tertiaire syfilis: vaste partner; > Laat latente syfilis: kinderen van vrouwelijke patiënten. Brief Partnerverwittiging voor SOA (juli 2016) (131 kB)
3. (Chemo)profylaxe	Blind behandelen indien laatste seksueel contact < 3 maanden. Benzathinepenicilline 2,4 M IE, IM op 2 verschillende plaatsen, één dosis.
4. Wering	Niet noodzakelijk.
Meldingsplichtig	Nee