

Nieuwsflash – April 2024

Respiratoire infecties - Epidemiologische evolutie

Op basis van de gunstige evolutie van de respiratoire indicatoren werd het niveau van de "Respi-radar" op 21 maart 2024 teruggebracht naar "groen" – dit is het basisniveau. De epidemie van seizoensgriep duurde elf weken (van week 50, 2023 tot en met week 8, 2024) en eindigde op 25 februari. Vergeleken met voorgaande jaren werd de griepidemie gekenmerkt door een gemiddelde intensiteit en een relatief lange duur (gemiddelde duur zes tot twaalf weken). De circulatie van SARS-CoV-2 en RSV is momenteel laag.

Invasieve Groep A streptokokken infecties (iGAS) - Epidemiologische evolutie en opkomst emm type 3.93

Na een jaar met hoge iGAS incidenties (zie [iGAS rapport](#)), zien we begin 2024 opnieuw een stijging van het aantal iGAS-infecties. Via verplichte meldingen werden in België 20 gevallen in januari en 35 gevallen in februari gemeld, voor Vlaanderen is dit respectievelijk 7 en 10. Het [NRC](#) meldde 154 gevallen (invasieve stalen) tijdens deze maanden. Deze stijging ligt in lijn met de typische seizoensgebonden variatie van iGAS-infecties en lijkt relatief beperkt in vergelijking met de intense circulatie van iGAS in 2023, al blijven de cijfers hoger dan pre-COVID.

In de typering van het NRC valt sinds december 2023 de snelle opkomst van het emm type 3.93 op, een trend die ook in Nederland wordt gezien. Daar waar tijdens de '22-'23 piek genotype M1 het meest voorkwam, is M3 nu het meest frequente genotype en verantwoordelijk voor 28% van de gevallen (t.o.v. 4% in 2023). M3 volgt de typische leeftijdsverdeling van iGAS met meer gevallen in de hogere leeftijdscategorieën, in contrast tot type M1 dat een relatief hoog aantal kinderen <5j trof. De ziektebeelden die we het meest zien bij M3 zijn septicemie (55.6%) en pneumonie (9.6%). Het is nog niet bekend of dit type geassocieerd is met een ernstiger ziekteverloop.

Seksueel overdraagbare infecties (soi) - Epidemiologische situatie in België

Net als in andere Europese landen zien we ook in België een verdere toename van het aantal seksueel overdraagbare infecties (soi's). Chlamydia blijft de meest voorkomende soi in België, en in het bijzonder bij vrouwen; bij mannen was het in 2023 voor het eerst gonorrroe op basis van de tot nu toe beschikbare gegevens. Sinds 2019 is er een duidelijke stijging in het aantal geschatte diagnoses van gonorrroe bij zowel vrouwen als mannen. Dit suggereert een toename in heteroseksuele transmissie naast transmissie bij mannen die seks hebben met mannen. Voor chlamydia en syfilis werd er een kleinere toename waargenomen. Voor meer informatie zie, [Tussentijds epidemiologisch bulletin over seksueel overdraagbare infecties](#).

Tuberculose - Wereld TB Dag en cijfers voor België

[Wereld Tuberculose Dag](#), gehouden op 24 maart, herinnert eraan dat tuberculose de op één na dodelijkste infectieziekte ter wereld is. Volgens het laatste [WHO-rapport](#) kregen in 2022 10,6 miljoen mensen tuberculose, waarvan 1,3 miljoen overleden. Het Belgisch TB rapport van 2022 rapporteert 852 nieuwe gevallen van TB, een daling van 23 gevallen ten opzichte van 2021. De incidentie daalt dus licht, van 7,6/100.000 in 2021 naar 7,4/100.000 in 2022. Deze cijfers liggen nog steeds ver onder de cijfers van voor de pandemie (968 gevallen; incidentie van 8,5/100.000 in 2019). Dit verschil in incidentie vergeleken met pre-COVID19 is vooral uitgesproken in het Brussels Gewest. De [melding van TB](#) is essentieel voor de tracering van contacten, de therapeutische begeleiding van patiënten en om epidemiologische trends op te volgen. Een overzicht van de gegevens van 2022 vindt u [hier](#).

Parvovirus B19 - Epidemiologische situatie: heropleving van gevallen

Begin maart waarschuwde de Vlaamse Vereniging voor Verloskunde en Gynaecologie voor een [verheffing van Parvovirus B19](#) bij zwangere vrouwen. De vereniging vraagt om waakzaam te zijn voor zwangere vrouwen die mogelijk besmet zijn met dit virus, zodat ze vroegtijdig herkend en adequaat opgevolgd worden. In de afgelopen weken heeft het Nationaal Referentiecentrum voor Congenitale Infecties een toename waargenomen in aanvragen voor serologische bevestiging en PCR, evenals een aantal positieve gevallen (via vruchtwater). Denemarken meldde ook een sterke stijging van besmettingen met parvovirus B19 bij zwangere vrouwen in het eerste kwartaal van 2024. Verheffingen van parvovirus B19-infecties komen elke 3-4 jaar voor, vooral in de winter en het voorjaar. Het is daarom waarschijnlijk dat we op dit moment een van deze pieken meemaken.

Psittacosis - Toename waargenomen in Europa

In februari 2024 meldde Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Nederland en Zweden een toename van het aantal psittacosis gevallen sinds november-december 2023. Er zijn ook vijf sterfgevallen gemeld. In de meeste gevallen is blootstelling aan wilde en/of gedomesticeerde vogels gemeld. Psittacose is een infectie van de luchtwegen veroorzaakt door *Chlamydophila psittaci*, een bacterie die vaak vogels infecteert. Menselijke infecties ontstaan meestal door contact met besmette vogels. De vijf landen met een verheffing voeren epidemiologisch onderzoek uit om mogelijke blootstellingen en clusters te identificeren. Daarnaast worden monsters van wilde vogels geanalyseerd om de prevalentie van *C. psittaci* bij wilde vogels in te schatten. In België is er momenteel geen toename van het aantal gevallen.

Departement Zorg – Actualisatie richtlijnen meldingsplichtige infectieziekten

Het weringsadvies bij een mazelen geval werd versoepeld naar de wering van niet gevaccineerde kinderen in een kinderdagverblijf of klas met < 95% vaccinatiegraad voor MBR1, zie [richtlijn mazelen](#), p 19. Het advies van de [VWVJ](#) werd hiermee gealigneerd.