

Diagnostiek urineweginfecties

bij personen **met** een urinaire katheter

Diagnostiek UWI = klinische symptomen + positieve urinecultuur



Vlaanderen
is zorgzaam en
gezond samenleven

≥ 1 TYPISCH URINAIR OF SYSTEMISCH SYMPTOOM

Infectie-suggestieve symptomen

- Recent ontstane suprapubische pijn of gevoeligheid en/of flankpijn
- Koorts ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) of hypothermie ($< 35^{\circ}\text{C}$)
- Koude rillingen
- Purulente afscheiding langs de katheter

Atypische, minder suggestieve symptomen

- Duidelijk delier
- (Toegenomen) agitatie
- Algemene malaise of verzwakking
- Macroscopische hematurie

Steeds uitsluiten van urineretentie of andere infectiefocus als oorzaak van de symptomen.

**AFNAME MIDSTREAM URINESTAAL NA
VERWIJDEREN KATHETER EN NA INTIEM TOILET
OF**

**AFNAME URINESTAAL VIA AFNAMEPUNT URINE-
COLLECTOR NA KATHETERWISSEL**

Uitzonderlijk: afname urinestaal via aftapkraan (nieuwe, propere) urinecollector NA katheterwissel.

Bewaar het urinestaal in de koelkast gedurende max. 24u, tot ophaling labo.

OPSTART ANTIBIOTICATHERAPIE

Indien mogelijk, wacht op cultuurresultaten.

ANDERE SYMPTOMEN

- Verandering in kleur of concentratie
- Verandering in geur (slecht ruikende urine)
- Troebele urine

EVALUEER HYDRATATietoestand

Stimuleer de vochtintake.

OVERWEEG OOK ANDERE OORZAKEN

**URINE DIPSTICK IS NOOIT ZINVOL BIJ
MENSEN MET EEN URINAIRE KATHETER**

