


WAT IS EEN CONTACTONDERZOEK?

Personen uit de onmiddellijke omgeving van een besmettelijke patiënt worden onderzocht om na te gaan of ze besmet of ziek zijn.

Dat gebeurt **via een tuberculinehuidtest, een IGRA (bloedtest) en/of een longfoto.**

Personen in de omgeving van een zieke worden ook onderzocht om de ziektebron op te sporen.



MEER WETEN?

Raadpleeg je arts.

Surf naar **www.departementzorg.be** of contacteer het Departement Zorg in je provincie:

- Antwerpen: 02 553 08 92
- Limburg: 02 553 08 93
- Oost-Vlaanderen: 02 553 08 94
- Vlaams-Brabant: 02 553 08 93
- West-Vlaanderen: 02 553 08 94

Surf naar **www.vrgt.be** of neem contact op met de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) in je provincie:

- Antwerpen
Berchem: 03 287 80 10 - Turnhout: 014 41 13 62
- Brussel: 02 411 94 76
- Limburg: 011 22 10 33 (Hasselt)
- Oost-Vlaanderen: 09 225 22 58 (Gent)
- Vlaams-Brabant: 016 79 09 92 (Leuven)
- West-Vlaanderen
Oostende: 059 79 02 58 - Kortrijk: 059 79 02 57



Departement Zorg
infectieziektebestrijding@vlaanderen.be
www.departementzorg.be



Vlaanderen
is zorgzaam en
gezond samenleven

v.u. Karine Moykens, Secretaris-generaal, Departement Zorg, Simon Bolivarlaan 17, 1000 Brussel | september 2024



TUBERCULINEHUIDTEST
voor het opsporen van tuberculose

**DEPARTEMENT
ZORG**

departementzorg.be


Een tuberculinehuidtest (Mantoux-test of intradermotest) toont aan of je besmet bent met de tuberculosebacterie. Die bacterie veroorzaakt tuberculose.

De meest voorkomende vorm van de ziekte is longtuberculose. Soms worden ook de nieren, beenderen, hersenen, klieren of andere organen aangetast.

HOE WORDT DE TEST UITGEVOERD?

Er wordt een kleine hoeveelheid vloeistof (tuberculine) in de huid van de voorarm ingespoten. Enkele dagen na de test wordt het resultaat gecontroleerd.

De tuberculinehuidtest is niet gevaarlijk en mag ook uitgevoerd worden bij jonge kinderen of zwangere vrouwen.



HET RESULTAAT IS NEGATIEF

Als er bij de controle van de test **geen duidelijke reactie** voelbaar is op de arm, dan ben je hoogstwaarschijnlijk niet besmet met de tuberculosebacterie.

Soms is het nodig om na twee maanden een controletest uit te voeren.

HET RESULTAAT IS TWIJFELACHTIG

Als er bij de controle een **lichte en kleine zwelling** voelbaar is op de arm, is het niet duidelijk of je al dan niet besmet bent.

Bij een twijfelachtig resultaat volgt altijd een nieuwe test (meestal na twee maanden).

HET RESULTAAT IS POSITIEF

Als er bij de controle een **duidelijke zwelling en verharding** van de huid voelbaar is, ben je besmet.

Bij een positieve tuberculinehuidtest wordt een **longfoto** genomen om na te gaan of je tuberculose hebt ontwikkeld. Is de longfoto normaal, dan ben je besmet maar niet ziek en ook niet besmettelijk voor anderen.

Bij een positieve test is medicatie aanbevolen om te voorkomen dat je ziek wordt. Bespreek dit met je arts.

Als er op de longfoto letsels van tuberculose zichtbaar zijn, moet je starten met een behandeling. Je moet dan gedurende minstens zes maanden stipt meerdere geneesmiddelen innemen.

Positieve tuberculinehuidtest

