

Samenvatting richtlijn: Vlektyfus

Categorie	Informatie - Actie
Kliniek	> Epidemische vlektyfus: Start acuut met ernstige hoofdpijn, rillingen, koorts (tot 40°C) en spierpijn. 5 dagen na het begin van de symptomen ontstaan roze vlekken bij de oksels en het bovenste deel van de romp (niet op gezicht, handpalmen en voetzolen). > Endemische vlektyfus: koorts, ernstige hoofdpijn, rillingen, spierpijn en misselijkheid. Huiduitslag verschijnt in ongeveer 50% van de gevallen. Uitslag op de romp, maar ook op de extremiteiten (handpalmen en voetzolen) voorkomen.
Diagnose	> De klinische diagnose wordt bevestigd door serologisch onderzoek. Antistoffen verschijnen in het algemeen niet eerder dan 2 weken na het optreden van symptomen en seroconversie kan ook trager zijn (6-8 weken). > Direct aantonen van <i>Rickettsiae</i> in bloed met behulp van directe immunofluorescentie of PCR is mogelijk in referentielaboratoria. Nationaal referentiecentrum: Instituut voor Tropische Geneeskunde Kronenburgstraat 43/3 2000 Antwerpen T 03 247 64 45 https://www.sciensano.be/nl/nrc-nrl/nationaal-referentiecentrum-nrc-voor-rickettsia-en-anaplasma-ehrlichia
Incubatieperiode	> Epidemische vlektyfus: meestal één week. > Endemische vlektyfus: tussen één en twee weken
Besmettelijke periode	> Patiënten met epidemische vlektyfus kunnen onbesmette luizen infecteren, en dus verdere verspreiding veroorzaken, tijdens koorts en waarschijnlijk tot drie dagen nadat de koorts is verdwenen. > Patiënten met endemische vlektyfus zijn niet besmettelijk voor mensen.
Reservoir	> <i>R. prowazekii</i>: de mens. Kleding en lichaamscontact zorgen voor verspreiding van geïnfecteerde luizen naar andere mensen. > <i>R. typhi</i>: de rat. Geïnfecteerde rattenvlooiën zorgen voor verspreiding naar ratten en af en toe naar mensen.
Besmettingsweg	> Epidemische vlektyfus: via wondjes die met geïnfecteerde feces van de vector in aanraking komen. > Endemische vlektyfus: idem en ook direct via vlooiënbeten. > Laboratoriumbesmetting: via aerosol.
Risicogroepen	> Dak- en thuislozen: risico infestatie met kleepluizen ('crowding', slechte hygiëne en weinig wisseling van kleding). > Reizigers naar warme gebieden waar ratten voorkomen lopen risico op endemische vlektyfus.
Maatregelen bij een geval	
1. Bronopsporing	> Epidemische vlektyfus: traceren van de eerste gevallen bij een epidemie. > Endemische vlektyfus: niet van toepassing.
2. Contactopsporing	> Epidemische vlektyfus: traceren en ontluizen van contacten van patiënten. > Endemische vlektyfus: niet van toepassing.
3. (Chemo)profylaxe	Geen.
4. Wering	Niet van toepassing.

Meldingsplichtig	Ja, Een meldingsplichtige infectieziekte aangeven
------------------	---