



DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Nu sunteți sigur(ă) dacă luați medicamentul potrivit, aveți simptome în urma administrării medicamentului sau aveți întrebări cu privire la tratament?

Dacă da, adresați-vă medicului dvs. de familie sau medicului sau asistentei responsabile cu controlul bolilor infecțioase de la Departamentul **de asistență medicală** din provincia dvs.:

- Antwerp: 02 553 08 92
- Limburg: 02 553 08 93
- Flandra de Est: 02 553 08 94
- Brabantul Flamand: 02 553 08 93
- Flandra de Vest: 02 553 08 94

De asemenea, puteți contacta asistenta medicală de la **Asociația flamandă pentru îngrijirea sănătății respiratorii și controlul tuberculozei (VRGT)** din provincia dvs.:

- Antwerp
Berchem: 03 287 80 10 - Turnhout: 014 41 13 62
- Bruxelles: 02 411 94 76
- Limburg: 011 22 10 33 (Hasselt)
- Flandra de Est: 09 225 22 58 (Ghent)
- Brabantul Flamand: 016 79 09 92 (Leuven)
- Flandra de Vest
Ostend: 059 79 02 58 - Kortrijk: 059 79 02 57



Departamentul de asistență medicală
infectieziektebestrijding@vlaanderen.be
www.departementzorg.be

Medicamentele pot provoca uneori **efecte secundare**. Pot apărea următoarele efecte secundare:

- probleme hepatice cu sau fără icter
- Oboseală
- dureri de cap, amețeli
- probleme de concentrare
- mâncărime cu sau fără erupție cutanată
- afecțiuni gastrointestinale

Discutați orice efecte secundare cu medicul (de familie) care a prescris medicamentul. Medicamentul Rifampicin face ca fluidele corporale să devină tot mai portocalii. Nu trebuie să vă faceți griji, decolorarea portocalie este o reacție normală și este inofensivă.

Acordați întotdeauna atenție unor simptome precum:

- tuse prelungită
- pierdere în greutate
- transpirații nocturne
- apetit redus
- senzație generală de rău
- deteriorarea stării generale
- durere în piept.

Dacă simptomele persistă, adresați-vă medicului dvs.



Vlaanderen
is zorgzaam en
gezond samenleven

Publicat de Karine Moykens, Secretar General, Departamentul de asistență medicală, Boulevard Simon Bolivar 17, 1000 Bruxelles | Mai 2025



INFECTAT(Ă) CU TUBERCULOZĂ

dar nu bolnav(ă)

**DEPARTEMENT
ZORG**

departementzorg.be

INFECTAT(Ă), DAR NU BOLNAV(Ă)

Test cutanat pozitiv

Ați efectuat recent un test cutanat cu tuberculină pentru a vedea dacă sunteți infectat(ă) cu bacteria care poate cauza tuberculoza.

Testul cutanat a fost pozitiv. Acest lucru înseamnă că sunteți infectat(ă). Testul poate fi pozitiv și dacă ați fost vaccinat(ă) împotriva tuberculozei în trecut.



Unele țări încă vaccinează împotriva tuberculozei. Acest lucru nu oferă protecție completă pe viață. Este dificil de interpretat un test cutanat pozitiv la tuberculină și trebuie să discutați acest lucru cu medicul dvs. de familie.

Radiografie pulmonară negativă.

În plus, ați făcut și o radiografie pulmonară pentru a evalua dacă plămânii vă sunt afectați. Într-adevăr, tuberculoza este în primul rând o boală pulmonară.

În momentul de față nu se observă anomalii în radiografie. Acest lucru înseamnă că nu sunteți bolnav(ă) acum. Nu sunteți contagios nici pentru mediul dvs. apropiat.

CE MEDICAMENTE TREBUIE SĂ IAU?



Există o mare diferență între a fi infectat cu bacteria tuberculozei și a fi cu adevărat bolnav.

90% din infecții nu duc niciodată la îmbolnăvire. Organismul reacționează la o infecție prin producerea de anticorpi. Acesta este modul în care organismul se protejează. Astfel, se poate preveni adesea apariția bolii. Uneori, însă, acești anticorpi nu sunt suficienți pentru a împiedica dezvoltarea tuberculozei.

Dacă testul este pozitiv, este recomandabil să luați medicamente pentru a preveni îmbolnăvirea. Discutați aceste aspecte cu medicul dvs. de familie.

În majoritatea cazurilor, acestea vor fi izoniazida (denumirea comercială Nicotibine ®) și/sau rifampicina (denumirea comercială Rifadine ®). Aceste medicamente sunt disponibile gratuit pe bază de rețetă.

POT LUA ALTE MEDICAMENTE ÎN TIMPUL TRATAMENTULUI?

Spuneți întotdeauna medicului dvs. de familie ce alte medicamente luați. De asemenea, dacă utilizați anticoncepționale (cum ar fi pilula). Medicamentul reduce eficacitatea pilulei. Astfel, puteți rămâne însărcinată.

LA CE TREBUIE SĂ FIU ATENT ATUNCI CÂND IAU MEDICAMENTE?

Este important să luați medicamentul în fiecare zi pe durata prescrisă (care este adesea pe termen lung). Altfel, tratamentul nu va fi eficient, iar bacteria poate deveni imună la medicament.

- Cel mai bine este să luați medicamentul pe stomacul gol, la o oră stabilită, o dată pe zi.
- Medicamentul se prezintă sub formă de tablete, pulbere sau băutură.
- Pentru copiii mici, medicamentul poate fi luat cu aproximativ 30 de minute înainte de micul dejun cu o lingură de grenadină.
- În timpul tratamentului, este bine să nu consumați alcool, deoarece acesta poate avea un efect negativ asupra ficatului.
- Unii oameni sunt hipersensibili la soare atunci când iau medicamentul. Prin urmare, se recomandă să nu stați la soare pentru perioade lungi de timp.
- Nu schimbați singur(ă) medicația fără să vă consultați medicul de familie.

