



और अधिक जानने की इच्छा है?

क्या आप इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि आप सही दवा ले रहे हैं या नहीं, क्या दवा लेने से आपको कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं, या क्या उपचार के बारे में आपके मन में कोई प्रश्न है? यदि ऐसा है, तो अपने प्रांत के देखभाल विभाग में अपने GP या संक्रामक रोग नियंत्रण डॉक्टर या नर्स से संपर्क करें:

- Antwerp: 02 553 08 92
- Limburg: 02 553 08 93
- East Flanders: 02 553 08 94
- Flemish Brabant: 02 553 08 93
- West Flanders: 02 553 08 94

आप अपने प्रांत में Flemish Association (फ्लेमिश एसोसिएशन) फॉर रेस्पिरिटरी हेल्थ केयर एंड ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल (VRGT) की नर्स से भी संपर्क कर सकते हैं:

- AntwerpBerchem: 03 287 80 10 - Turnhout: 014 41 13 62
- Brussels: 02 411 94 76
- Limburg: 011 22 10 33 (Hasselt)
- East Flanders: 09 225 22 58 (Ghent)
- Flemish Brabant: 016 79 09 92 (Leuven)
- West FlandersOstend: 059 79 02 58 - Kortrijk: 059 79 02 57

द्वारा प्रकाशित: Karine Moykens, महापंचवि, देखभाल विभाग, बुलेवारड साइमन बोलविर् 17, 1000 ब्रुसेल्स | मे 2025



Vlaanderen
is zorgzaam en
gezond samenleven

दवाइयों से कभी-कभी **दुष्प्रभाव** हो सकते हैं। नमिनलखिति दुष्प्रभाव संभव हैं:

- पीलिया के साथ या उसके बनिा यकृत की समस्याएं
- थकान
- सरिदरद, चक्कर आना
- एकाग्रता की समस्या
- दाने के साथ या बनिा खुजली
- जठरांत्र संबंधी शक्तियतें

दवा लखिने वाले (पारिवारिक) चकित्सक से किसी भी दुष्प्रभाव के बारे में चर्चा करें। रफाम्पसिनि दवा शरीर के तरल पदार्थों को तेजी से नारंगी रंग में बदल देती है। इसमें चिता की कोई बात नहीं है, नारंगी रंग का हो जाना एक सामान्य प्रतिक्रिया है और हानिरहित है।

नमिनलखिति लक्षणों के परतहिमेशा सतरक रहें:

- लंबे समय तक खांसी रहना
- वजन घटाना
- रात का पसीना
- भूख कम लगना
- सामान्य रूप से अस्वस्थ महसूस करना
- सामान्य स्थिति का बगिड़ना
- छाती में दर्द।

यदिलक्षण बने रहें तो अपने डॉक्टर से मलें।



देखभाल विभाग

infectieziektebestrijding@vlaanderen.be
www.departementzorg.be

क्षय रोग से संक्रमति
संक्रमति लेकनि बीमार नहीं

**DEPARTEMENT
ZORG**

departementzorg.be

संक्रमति लेकनि बीमार नहीं

सकारात्मक त्वचा परीक्षण

आपने हाल ही में ट्यूबरकुलिन त्वचा परीक्षण कराया था, ताकि पता चल सके कि आप तपेदिकी उत्पन्न करने वाले जीवाणु से संक्रमित तो नहीं हैं।

त्वचा परीक्षण सकारात्मक था। इसका मतलब है कि आप संक्रमित हैं। यदि आपको पहले कभी तपेदिकी के वरिद्ध टीका लगाया गया हो तो भी परीक्षण सकारात्मक आ सकता है।



कुछ देश अभी भी तपेदिकी के वरिद्ध टीकाकरण करते हैं। इससे जीवन भर पूर्ण सुरक्षा नहीं मिलती। फिर सकारात्मक ट्यूबरकुलिन त्वचा परीक्षण की व्याख्या करना कठिन है, और आपको अपने GP से इस बारे में चर्चा करनी चाहिए।

नकारात्मक फेफड़े का एक्स-रे

इसके अलावा, आपके फेफड़ों का एक्स-रे भी लिया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि आपके फेफड़े प्रभावित हैं या नहीं। दरअसल, तपेदिकी मुख्यतः एक फुफ्फुसीय रोग है।

फलिहाल एक्स-रे में कोई असामान्यता नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि आप अभी बीमार नहीं हैं। आप अपने तात्कालिक वातावरण के लिए भी संक्रामक नहीं हैं।

मुझे कौन सी दवा लेनी होगी?



तपेदिकी के जीवाणु से संक्रमित होने और वास्तव में बीमार होने के बीच बहुत बड़ा अंतर है।

90% संक्रमण कभी भी बीमारी का कारण नहीं बनते। शरीर संक्रमण के प्रतिप्रतिक्रिया स्वरूप एंटीबॉडीज़ का उत्पादन करता है। इस प्रकार शरीर अपनी रक्षा करता है। इससे अक्सर वास्तविक बीमारी की शुरुआत को रोका जा सकता है। हालाँकि, ये एंटीबॉडी कभी-कभी आपको तपेदिकी से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं।

यदि आपका परीक्षण सकारात्मक आता है, तो आपको बीमार होने से बचाने के लिए दवा लेने की सलाह दी जाती है। इस वषिय पर अपने सामान्य चिकित्सक से चर्चा करें।

अधिकांश मामलों में, यह आइसोनियाज़िड (ब्रांड नाम Nicotibine ®) और/या रफाम्पसिनि (ब्रांड नाम Rifadine ®) होगा। ये दवाइयाँ डॉक्टर के पर्चे पर नःशुल्क उपलब्ध हैं।

क्या मैं अपने उपचार के दौरान अन्य दवाएँ ले सकता हूँ?

हमेशा अपने GP को बताएं कि आप कौन सी अन्य दवा ले रहे हैं। इसके अलावा यदि आप गर्भनरिधक (जैसे गोली) का उपयोग करते हैं। दवा के कारण गोली कम प्रभावी हो जाती है। इससे आप गर्भवती हो सकती हैं।

दवा लेते समय मुझे कनि बातों का ध्यान रखना चाहिए?

यह महत्वपूर्ण है कि आप नरिधारति अवधतिक (जो अक्सर लंबी अवधि की होती है) प्रतिदिन दवा लें। अन्यथा, उपचार प्रभावी नहीं होगा और बैक्टीरिया दवा के प्रतिप्रतिक्रिया हो जाएगा।

- दवा को दिन में एक बार, नश्चिति समय पर खाली पेट लेना सबसे अच्छा है।
- यह दवा गोलीयों, पाउडर या पेय के रूप में उपलब्ध है।
- छोटे बच्चों के लिए, यह दवा नाश्ते से लगभग 30 मनिट पहले एक चम्मच ग्रेनेडाइन के साथ ली जा सकती है।
- उपचार के दौरान शराब न पीना ही बेहतर है क्योंकि इससे आपके लीवर पर प्रतिक्ल प्रभाव पड़ सकता है।
- कुछ लोग दवा लेते समय सूर्य के प्रति अतसिंवेदनशील होते हैं। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि लंबे समय तक धूप में न बैठें।
- अपने GP से परामर्श किए बिना अपनी दवा स्वयं न बदलें।

