



Vlaanderen

is zorgzaam en
gezond samenleven



هل ترغب في معرفة المزيد؟



استشر طبيبك.

تفضل بزيارة www.departementzorg.be أو تواصل مع الجمعية الفلمنكية لصحة الجهاز التنفسي ومكافحة مرض السل (VRGT) في مقاطعتك:

- أنتويرب: 02 553 08 92
- ليمبورغ: 02 553 08 93
- فلاندر الشرقية: 02 553 08 94
- برابانت فلانماند: 02 553 08 93
- فلاندر الغربية: 02 553 08 94

تفضل بزيارة www.vrgt.be أو تواصل مع الجمعية الفلمنكية لصحة الجهاز التنفسي ومكافحة مرض السل (VRGT) في مقاطعتك:

- أنتويرب بيرخم: 03 287 80 10
- تورنهاوت: 014 41 13 62
- بروكسل: 02 411 94 76
- ليمبورغ: 011 22 10 33 (هاسلت)
- فلاندر الشرقية: 09 225 22 58 (خنت)
- برابانت فلانماند: 016 79 09 92 (لوفين)
- فلاندر الغربية أوستند: 059 79 02 58
- كورترايك: 059 79 02 57

صاحب من: كارين موكس، الأمانة العامة، وحدة العناية، بوليفارد سيغورن 1000 +17 بروكسل | سبتمبر 2024

اختبار الجلد بالتوبركولين

للكشف عن مرض السل

DEPARTEMENT
ZORG

departementzorg.be

VRGT
VLAAMSE VERENIGING VOOR
RESPIRATOIRE GEZONDHEIDZORG
EN TUBERCULOSEBESTRIJDING ZVZ

وحدة العناية

infectieziektebestrijding@vlaanderen.be

www.departementzorg.be

ما هو فحص المُخالطة؟

يُفحص الأشخاص المحيطون بالمريض المُعدي لتأكيد ما إذا كانوا مصابين أو مرضى.

يتم ذلك عن طريق اختبار الجلد بالتوبركولين و/أو اختبار IGRA (اختبار الدم) و/أو الأشعة السينية للرنجة.

كما يُفحص الأشخاص المحيطون بشخص مريض لتحديد مصدر العدوى.



النتيجة سلبية

إذا لم يُلاحظ أي تفاعل واضح على الذراع عند قراءة نتيجة الاختبار، فمن المرجح أنك غير مصاب ببكتيريا السل.

في بعض الحالات، قد يلزم إجراء اختبار متابعة بعد شهرين.

وفي حال كانت نتيجة الاختبار إيجابية، يُنصح بتناول الأدوية لمنع إصابتك بالمرض. تحدث في هذا الأمر مع طبيبك العام.

إذا أظهرت الأشعة السينية على الرئتين وجود آفات ناتجة عن السل، فيجب البدء بالعلاج فوراً. عندها يجب أن تأخذ أنواعاً مختلفة من الأدوية في أوقات منتظمة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

النتيجة غير واضحة

إذا تم الكشف عن تورم صغير في الذراع أثناء الفحص، فلا يمكن الجزم ما إذا كنت مصاباً أم لا.

إذا كانت النتيجة غير واضحة، يتم دائماً إجراء اختبار جديد (عادةً بعد شهرين).

النتيجة إيجابية

إذا تم الشعور بتورم واضح وتصلب في الجلد أثناء الفحص، فهذا يعني أنك مصاب.

إذا كانت نتيجة اختبار الجلد بالتوبركولين إيجابية، فسيتم إجراء أشعة سينية على الرئة لمعرفة ما إذا كنت قد أصبت بالسل. إذا كانت الأشعة السينية للرئة طبيعية، فأنت مصاب بالعدوى ولكنك لست مريضاً وغير معدى للآخرين.

يكشف اختبار الجلد بالتوبركولين (اختبار مانتوكس أو اختبار داخل الجلد) ما إذا كنت مصاباً ببكتيريا السل. تسبب هذه البكتيريا مرض السل.

أكثر أشكال المرض شيوعاً هو السل الرئوي. وأحياناً يُصاب أيضاً الكلى أو العظام أو الدماغ أو الغدد أو الأعضاء الأخرى.

كيف يتم إجراء الاختبار؟

يُحقن مقدار صغير من السائل (التوبركولين) في جلد الساعد. يتم فحص النتيجة بعد أيام قليلة من الاختبار.

اختبار الجلد بالتوبركولين ليس خطيراً ويمكن إجراؤه أيضاً على الأطفال الصغار أو النساء الحوامل.

نتيجة إيجابية لاختبار الجلد بالتوبركولين

