



Vlaanderen
is zorgzaam en
gezond samenleven



معاینه پوستی توبرکلوز
برای تشخیص توبرکلوز

departementzorg.be

**DEPARTEMENT
ZORG**

آیا می خواهید بیشتر بدانید؟



با داکتر تان مشوره کنید.

به www.departementzorg.be مراجعه کنید یا در ولایت تان
با دیپارتمنت مراقبت در تماس شوید:

- Antwerp: 02 553 08 92
- Limburg: 02 553 08 93
- East Flanders: 02 553 08 94
- Flemish Brabant: 02 553 08 93
- West Flanders: 02 553 08 94

از www.vrgt.be دیدن کنید یا با اتحادیه فلمنیس برای مراقبت های
تنفسی و کنترل توبرکلوز (VRGT) در ولایت خود تماس بگیرید:

- Antwerp
- Berchem: 03 287 80 10
- Turnhout: 014 41 13 62
- بروکسل: 02 411 94 76
- Limburg (Hasselt): 011 22 10 33
- East Flanders (Ghent): 09 225 22 58
- Flemish Brabant (Leuven): 016 79 09 92
- West Flanders
- Ostend: 059 79 02 58 - Kortrijk: 059 79 02 57

انتشار کننده: کارین موگنر، سکرتر جنرال، دیپارتمنت مراقبت، 17, 1000 Brussels | September 2024



دیپارتمنت مراقبت

infectieziektebestrijding@vlaanderen.be
www.departementzorg.be

تحقیق تماس چیست؟

افرادی که در محیط نزدیک بیمار مبتلا به بیماری ساری قرار دارند،
معاینه می شوند تا مشخص شود که آیا آنها آلوده به بیماری هستند یا نه.
این کار از طریق آزمایش پوست توبرکلین، آزمایش خون IGRA و/یا
ایکسری از شش انجام می شود.

افرادی که در محیط فرد بیمار قرار دارند نیز معاینه می شوند تا منبع
بیماری شناسایی گردد.



نتیجه منفی است

اگر عکس العمل آشکاری احساس نشود هنگام بررسی معاینه در بازو، پس به احتمال زیاد شما به باکتری توپرکلوز آلوده نیستید.

بعضی اوقات لازم است پس از دو ماه آزمایش کنترل انجام شود.

اگر معاینه شما مثبت باشد، مصرف دوا توصیه می شود تا از بیمار شدن شما جلوگیری شود. در این باره با داکتر عمومی تان صحبت کنید.

اگر جراحات از توپرکلوز روی ایکسری شش دیده شود، باید تداوی را آغاز کنید. شما باید حداقل برای مدت شش ماه دواهای مختلف را در زمان های معین مصرف کنید.

نتیجه نامشخص است

اگر تورم کوچکی هنگام معاینه کنترل در بازو احساس شود، مشخص نیست که آیا شما آلوده هستید یا خیر.

اگر نتیجه نامشخص باشد، همیشه (معمولاً پس از دو ماه) معاینه جدیدی گرفته می شود.

نتیجه مثبت است

اگر تورم و سخت شدن واضح پوست هنگام معاینه کنترل احساس شود، شما آلوده هستید.

اگر معاینه پوستی توپرکلین شما مثبت باشد، عکس ایکسری از شش گرفته می شود تا مشخص شود آیا شما به بیماری توپرکلوز مبتلا شده اید یا خیر. اگر ایکسری شش طبیعی باشد، شما آلوده هستید اما بیمار نیستید و دیگران را نیز مبتلا نمی کنید.

معاینه پوستی توپرکلین (معاینه مانتو یا معاینه داخل جلدی) نشان می دهد که آیا شما به باکتری توپرکلوز آلوده هستید یا خیر. این باکتری سبب آلوده شدن شما به توپرکلوز می شود.


شایع ترین نوع این بیماری، توپرکلوز ششی یا ریوی است. گاهی اوقات کلیه ها، استخوان ها، مغز، غدد یا اندام های دیگر نیز آسیب می بینند.

معاینه چگونه انجام می شود؟

مقدار کمی مایع (توپرکلین) در پوست بازو تزریق می شود. نتیجه چند روز بعد از معاینه بررسی می شود.

معاینه پوستی توپرکلین خطرناک نیست و می توان آن را روی اطفال خردسال یا زنان باردار نیز انجام داد.

معاینه پوستی توپرکلین مثبت



تداوی

دواهای مختلف برای حد اقل شش ماه

تداوی پیشگیرانه

1 یا 2 دوا برای مدت 3 تا 6 ماه

