

NA CZYM POLEGA ANALIZA KONTAKTU?

Osoby z bezpośredniego otoczenia pacjenta z chorobą zakaźną są badane w celu sprawdzenia, czy zostały zakażone lub czy same są chore.

W tym celu wykonuje się **skórną próbę tuberkulinową**, **test IGRA (z krwi)** lub **zdjęcie RTG płuc**.

Badane są również osoby z otoczenia chorego, aby wykryć źródło zakażenia.



CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

Porozmawiaj ze swoim lekarzem.

Odwiedź stronę **www.departementzorg.be** lub skontaktuj się z Departamentem Opieki Zdrowotnej w swojej prowincji:

- Antwerpia: 02 553 08 92
- Limburgia: 02 553 08 93
- Flandria Wschodnia: 02 553 08 94
- Brabancja Flamandzka: 02 553 08 93
- Flandria Zachodnia: 02 553 08 94

Zajrzyj na stronę **www.vrgt.be** lub skontaktuj się z flamandzkim stowarzyszeniem ds. zdrowia układu oddechowego i gruźlicy (VRGT) w swojej prowincji:

- Antwerpia
Berchem: 03 287 80 10 - Turnhout: 014 41 13 62
- Bruksela: 02 411 94 76
- Limburgia: 011 22 10 33 (Hasselt)
- Flandria Wschodnia: 09 225 22 58 (Gandawa)
- Brabancja Flamandzka: 016 79 09 92 (Leuven)
- Flandria Zachodnia
Ostend: 059 79 02 58 - Kortrijk: 059 79 02 57



Departament Opieki Zdrowotnej
infectieziektebestrijding@vlaanderen.be
www.departementzorg.be



Vlaanderen
is zorgzaam en
gezond samenleven



**SKÓRNA PRÓBA
TUBERKULINOWA**
do wykrywania gruźlicy

**DEPARTEMENT
ZORG**

departementzorg.be

Skórna próba tuberkulinowa (próba Mantoux lub próba śródskórna) pokazuje, czy osoba badana jest zarażona bakterią gruźlicy. Bakteria ta wywołuje gruźlicę.

Najczęstszą formą tej choroby jest gruźlica płuc. Czasami choroba atakuje również nerki, kości, mózg, gruczoły lub inne narządy.

JAK WYKONUJE SIĘ TO BADANIE?

W skórę przedramienia podaje się zastrzyk z niewielką ilością płynu (tuberkuliny). Wynik sprawdza się po kilku dniach od wykonania próby.

Skórna próba tuberkulinowa nie jest niebezpieczna i może być wykonywana również u małych dzieci lub kobiet w ciąży.



WYNIK JEST NEGATYWNY.

Jeśli po wykonaniu testu na ramieniu nie wystąpi **wyraźna reakcja**, najprawdopodobniej nie doszło do zakażenia bakterią gruźlicy.

Czasami konieczne jest wykonanie próby kontrolnej po dwóch miesiącach.

WYNIK JEST NIEJEDNOZNACZNY.

Jeśli podczas kontroli na ramieniu wyczuwalny jest **niewielki obrzęk**, nie ma pewności, czy doszło do zakażenia.

Jeśli wynik jest niejednoznaczny, zawsze wykonuje się nową próbę (zwykle po dwóch miesiącach).

WYNIK JEST DODATNI.

Jeśli podczas kontroli na skórze wyczuwalny jest **wyraźny obrzęk i stwardnienie skóry**, oznacza to, że doszło do zakażenia.

Jeśli wynik skórnej próby tuberkulinowej jest dodatni, wykonane zostanie **badanie RTG płuc** w celu sprawdzenia, czy doszło do rozwoju gruźlicy. Jeśli wynik badania RTG płuc jest prawidłowy, oznacza to, że doszło do zarażenia, ale nie chorujesz i nie zarażasz innych.

W przypadku uzyskania dodatniego wyniku zaleca się przyjmowanie leków, aby zapobiec zachorowaniu. Porozmawiaj o tym ze swoim lekarzem rodzinnym.

Jeśli na zdjęciu RTG płuc widoczne są zmiany gruźlicze, konieczne jest rozpoczęcie leczenia. Należy wówczas przyjmować różne leki o ustalonych terminach przez co najmniej sześć miesięcy.

Dodatni wynik skórnej próby tuberkulinowej

