

Nieuwsflash – Oktober 2025

Respiratoire pathogenen - Epidemiologische update over luchtweginfecties

In het laatste [wekelijkse bulletin over acute luchtweginfecties \(week 38\)](#) heeft de Risk Assessment Group (RAG), onder meer op basis van de tool 'Respi-radar', aangegeven dat de epidemiologische situatie op 'groen' blijft staan. De meeste indicatoren stijgen, maar blijven op een laag niveau. De indicatoren die toenemen zijn het aantal consultaties bij huisartsen voor acute luchtweginfecties (ALI), het aantal ziekenhuisopnames voor ernstige acute luchtweginfecties en de verschillende indicatoren voor SARS-CoV-2. Wat influenza en het respiratoir syncytieel virus (RSV) betreft, blijven de indicatoren op basisniveau. Op [internationaal](#) niveau zien we een brede en toenemende verspreiding van SARS-CoV-2 in de EU/EER, maar met een beperkte impact op de ziekenhuisopnames. De verspreiding van RSV en het influenzavirus blijft op een zeer laag niveau.

Shigatoxine producerende *Escherichia coli* (STEC) – update van de uitbraak in WZC in België

In de [vorige flash](#) berichtten we over een uitbraak met STEC-infecties in enkele woonzorgcentra (WZC) in België. Het onderzoek is ondertussen afgerond en er komen geen nieuwe gevallen meer bij. Er werden in totaal 66 gevallen (waaronder 10 overlijdens) gelinkt aan deze uitbraak, in 8 WZC in Vlaanderen, 1 in Wallonië en 1 in Brussel, wat overeenkomt met een attack rate van 5,5%. Uit de epidemiologische analyses (case-control studie in 3 WZC), kwam rauw gehakt naar voor als de meest waarschijnlijke bron. Door afwezigheid van resten van dit product kon dit niet in het laboratorium bevestigd worden. Het FAVV, Departement Zorg, AVIQ en Vivalis hebben op 26/09/25 een gezamenlijk persbericht gepubliceerd waarin wordt opgeroepen om voorzichtig te zijn met bepaalde voedselproducten bij kwetsbare personen (jonge kinderen, ouderen, zwangere vrouwen of immuun gecompromitteerde personen).

Legionellose cluster – Limburg

In augustus en september is een legionella-uitbraak vastgesteld met acht Belgische patiënten op datum van 25/9, met een epidemiologische link naar Maasmechelen (start symptomen tussen 5/8 en 19/9) en één bijkomend geval uit Nederland. De patiënten zijn tussen 41 en 84 jaar oud. Om Legionella-pneumonie tijdig te kunnen opsporen, is verhoogde waakzaamheid ingesteld bij huisartsen en ziekenhuizen. Het belang van afname van humane stalen is benadrukt om een mogelijke match met omgevingsstalen te kunnen maken. Bij de patiënten wordt een gedetailleerde bronbevestiging uitgevoerd. Aan de hand van de gegevens en bijkomende modellering is een gebied afgebakend waarbinnen de bron zich meest waarschijnlijk bevindt. Sinds 10/9 worden omgevingsstalen genomen en maatregelen gevraagd bij installaties met verneveling. Het vinden van de exacte bron bij legionella-uitbraken blijft echter vaak moeilijk. De verhoogde waakzaamheid blijft van kracht tot en met 17/10.

Candidozyma auris – Epidemiologische trends in Europa en België

Het [ECDC rapporteert](#) dat de multiresistente schimmel *Candidozyma auris* zich snel verspreidt in Europese ziekenhuizen. In 2023 werden 1 346 gevallen gemeld in 18 landen, vooral in Spanje, Griekenland, Italië, Roemenië en Duitsland. De schimmel kan lang overleven op oppervlakken en medische apparatuur, wat bestrijding bemoeilijkt. Sinds 2016 zijn in België 21 patiënten geïdentificeerd, waarvan 5 zonder buitenlandse ziekenhuislink. De meeste Belgische isolaten zijn resistent tegen fluconazol, maar grotendeels gevoelig voor amphotericine B en echinocandines. *C. auris* is meldingsplichtig in alle gewesten en isolaten moeten naar het [NRC Mycosen](#) worden doorgestuurd. Alle gezondheidsinstanties benadrukken het belang van vroege detectie, snelle isolatie en strikte infectiecontrole om verdere verspreiding te voorkomen.

Circulerend vaccin-afgeleid poliovirus type 1 (cVDPV1) - Israël 2025

In augustus 2025 meldde [Israël](#) een uitbraak van circulerend verwilderd poliovirus afkomstig van een vaccinstam type 1 (cVDPV1). In december 2024 werd een geval vastgesteld van acute slappe verlamming (AFP) bij een niet-gevaccineerde adolescent, die positief testte voor een poliovirus verwant aan het orale poliovaccins ([Sabin-like poliovirus 1](#)), maar reeds met meerdere mutaties. Omdat de besmettingsroute onduidelijk bleef, werd de afvalwatersurveillance geïntensifieerd. Daarbij werden herhaaldelijk dezelfde type virus én een verder gemuteerde variant (VDPV1) teruggevonden. VDPV1 werd geïsoleerd op verschillende locaties en gedurende meerdere maanden, wat wijst op aanhoudende overdracht in de gemeenschap en dus officieel een uitbraak van cVDPV1. Hoewel de algemene vaccinatiegraad in Israël hoog is, zijn er regio's met lagere vaccinatiegraad rond Jeruzalem en in de ultra-orthodoxe gemeenschap. Daar wordt nu actief gecommuniceerd en gevaccineerd. Deze uitbraak benadrukt opnieuw het risico op herintroductie van polio en het belang van het handhaven van een hoge vaccinatiegraad. Elk geval van acute slappe verlamming [moet gemeld worden](#) aan Departement Zorg en [polio](#) formeel uitgesloten door het testen van twee stoelgangsstalen. Reizigers [naar risicogebieden](#) moeten worden een extra dosis poliovaccin aanbevolen.

Ebola – Epidemie in de DRC

Op 4 september 2025 werd een [ebola-epidemie](#) (Zaire-stam) uitgeroepen in de Democratische Republiek Congo (DRC). Het getroffen gebied Bulape is moeilijk bereikbaar en ligt op minstens één dag rijden van de provinciale hoofdstad Tshikapa (Kasaï). Het eerste gemelde geval betrof een zwangere vrouw die op 20 augustus werd gehospitaliseerd met compatible symptomen en overleed aan meervoudig orgaanfalen. Genoomsequentie toonde aan dat de verantwoordelijke stam niet verwant is aan eerdere epidemieën, wat wijst op een nieuw geval van zoönotische overdracht. Op 21 september waren er 57 gevallen gemeld in Kasaï (47 bevestigde, 10 waarschijnlijke) met 35 overlijdens, overeenkomend met een case fatality rate van 61,4 %. Er zijn gevallen gemeld bij personen van 0 tot 65 jaar, waarbij kinderen van 0 tot 9 jaar (23 %) en vrouwen (61 %) het meest getroffen waren. Er werden 1.180 contacten geïdentificeerd, waarvan er 94 de 21 dagen durende opvolging hebben afgerond. Door de verbinding van Bulape met grote steden zoals Tshikapa en Kananga, en het aanhoudende interprovinciale en grensoverschrijdende verkeer, acht de WGO AFRO het risico op verdere geografische verspreiding reëel. Op 24 september waren 1.740 personen gevaccineerd en zijn er 2.410 extra dosissen beschikbaar in het getroffen gebied.