

Samenvatting richtlijn: Psittacose

Categorie	Informatie - Actie
Kliniek	<ul style="list-style-type: none"> > Symptoomloos tot griepachtig en septisch ziektebeeld. > Pneumonie (interstitieel of lobair) meest bekende vorm.
Diagnose	<ul style="list-style-type: none"> > In acute fase (PCR): keelwisser, sputum of BAL. > Serologie: 2 serummonsters met interval van 2 weken. > Kweek: erg specifiek maar niet sensitief.
Incubatieperiode	Meestal 5-14 dagen , kan oplopen tot 1 maand.
Besmettelijke periode	Onbekend
Reservoir	Vrijwel alle vogels. Infecties komen vooral voor bij papegaaai-achtigen, duiven en pluimvee.
Besmettingsweg	Inhalatie opgedroogde excreta van geïnfecteerde vogels. Uitzonderlijk van mens op mens.
Risicogroepen	Mensen die beroepshalve of via hobby in nauw contact komen met vogels.
Maatregelen bij een geval	
1. Bronopsporing	Contact met (uitwerpselen van) vogels
2. Contactopsporing	<ul style="list-style-type: none"> > Dierlijke besmetting: als een dier de bron is van meerdere dierlijke besmettingen, kan team IZ de blootgestelden informeren. > Humane besmetting (uitzonderlijk): team IZ bepaalt beleid voor contactonderzoek en eventuele screening van (asymptomatische) blootgestelden
3. (Chemo)profylaxe	Niet van toepassing.
4. Wering	Niet van toepassing.
Meldingsplichtig	Ja, een meldingsplichtige ziekte aangeven