
# Sistema de Conductos
## (glándulas salivales mayores)

*C. intercalado → C. estriado → C. interlobulillar → C. lobular→ C. principal*


### Conducto intercalado

- Epitelio:
  - Forma: Cúbico simple bajo.
  - Con núcleos con núcleos centrales.
  - Escaso citoplasma.
- Se pueden observar células mioepiteliales.
  - Se observan como células planas que rodean al conducto.




### Conducto estriado


- Epitelio: Cuboideo-cilíndrico simple.
  - Núcleos redondos y centrales.
  - Estriaciones basales.
    - Perpendiculares a la base de las células.
    - Se origina por invaginaciones basales contienen numerosas mitocondrias (estructuras acidófilas). Las invaginaciones son generadas por la membrana plasmática basal.




### Conducto interlobulillar


- Epitelio: Inicialmente es cuboideo o cilíndrico simple, pero al avanzar en el conducto se vuelve cilíndrico pseudoestratificado.

- Se localiza en los tabiques interlobulillares, por lo tanto, se puede ver siendo rodeado de tejido conjuntivo.



## Conducto lobular

- Epitelio: Cilíndrico estratificado.
    - Se trata de uno de los pocos lugares del cuerpo que presentan este tipo de epitelio.
- Se localiza en los tabiques interlobulillares, por lo tanto, se puede ver rodeado de estroma.







## Conducto principal:

- Conducto principal de las glándulas…
  - Parótidas: Conducto de Stenon.
  - Submandibulares: Conducto de Wharton.
  - Sublinguales: Conducto de Bartholin.
- Epitelio: Cambia de cilíndrico simple o pseudoestratificado a epitelio plano estratificado no queratinizado en su desembocadura.