

31. *Cynosurus*

Pastos de terófitos en claros de sotobosque y matorral, roquedos, cultivos, baldíos, márgenes de caminos y carreteras, bordes de ríos y arroyos, en suelos $\pm$ nitrificados, indiferente al substrato; 0-2000 m. (I)II-VI(VII). Región Mediterránea, C y SW de Asia, y Macaronesia (Madeira, Canarias); introducida y naturalizada en diferentes partes del mundo. Casi toda la Península Ibérica y Baleares. **Esp.:** A Ab Al Av B Ba C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H (Hu) J (Lo) M Ma Mu O PM Po Sa Se SS T To V (Va) Za Z. **Port.:** AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. **N.v.:** cepillos, cepillitos, grama aurea, grama dorada, rabo de cordero, raspajos, raspojos; **port.:** escovinhas, lamárquia-dourada; **cat.:** cua de gos daurada, lamárquia, raspalls.

Observaciones.—Los grupos de espiguillas en los que se desarticula la inflorescencia cuando alcanza la madurez son dispersados por el viento.

31. *Cynosurus* L.*

[*Cynosúrus*, -i m. — gr. ὁ κύων, perro; ἡ οὐρᾶ, rabo, cola. Este nombre, si bien de factura antigua y aplicado desde antiguo, en la forma *Cynosūra*, a objetos como la Osa Menor o, en la forma *Cynosúris*, a determinados personajes —uno de los hermanos de Atreo y Tiestes; cf. C. Anthon, *Classic. Dict.*: ARC (1848)—, parece no haber sido empleado para nombrar planta alguna hasta el siglo XVIII por C. von Linné, *Gen. Pl.*: 13 (1737), *Sp. Pl.* 1: 72 (1753), *Gen. Pl. ed.* 5: 33 (1754), cuando lo utilizó para denominar el género de gramíneas encabezado por la especie que es su tipo actual, *C. cristatus* L., y cuya inflorescencia recuerda, en efecto, la cola de un perro. Aunque el propio Linné no lo dijera, esta parece ser la razón del nombre por consenso antiguo —cf., v.gr., C. Milne & A. Gordon, *Indigenous Pl.*: 140 (1793); A.M.F.J. Palisot de Beauvois, *Ess. Agrostogr.*: 66 (1812); U. Quattrocchi, *CRC World Dict. Pl. Names*: 689 (1999); T. Clifford & P.D. Bostock, *Etym. Dict. Grasses*: 86 (2007). A.Q.]

Hierbas anuales, o perennes y cespitosas. Tallos erectos o ascendentes, cilíndricos, $\pm$ estriados, glabros, con entrenudos ahuecados, y 2-6 nudos, al menos 1 o 2 de ellos visibles. Hojas alternas, sésiles y envainadoras, persistentes, las basales y caulinares similares; vaina abierta casi hasta la base, herbácea, estriado-acostillada, glabra, sin aurículas; lígula membranácea, corta y truncada, o bien desarrollada y no truncada, entera o premorsa, glabra; limbo linear, plano, acostillado en haz y envés, glabro o peloso. Inflorescencia en panícula muy contraída, espiciforme y linear, dística, o bien $\pm$ ovoide u oblongo-ovoides, $\pm$ densa y unilateral, con raquis aplanado o de sección prismática, liso o escábrido, y espiguillas dimorfas, unas estériles y otras fértiles. Espiguillas comprimidas lateralmente, cortamente pedunculadas, las inferiores de cada rama o subrama estériles, con las flores reducidas a glumas y lemas similares, escariosos, rígidos y aristados —los lemas estériles superiores más cortos que los inferiores, alcanzando todos el mismo nivel—, persistentes, que alcanzan y cubren una espiguilla distal fértil, esta con 1-5(7) flores hermafroditas, casmógamas, que se desarticulan en la madurez por encima de las glumas y entre las flores. Glumas de las flores fértiles 2, subiguales, mayores que las flores, membranáceas, linear-lanceoladas, $\pm$ aquilladas, agudas o acuminadas, con 1 nervio liso o escabriúsculo. Raquilla con artejos lisos o ligeramente escábridos. Lema de las flores fértiles lanceolado, membranáceo-papiráceo, redondeado en el dorso, papiloso-escábrido o peloso en el dorso, con 3-5 nervios —los laterales a veces inconspicuos—, de ápice agudo, bidentado o cortamente bifido, con 1 arista $\pm$

* P. Cantó & J.A. Devesa

31. Cynosurus

escábrida, apical o inserta en la escotadura de los dientes cuando existen, mayor o menor que el lema; callo orbicular, glabro y brillante. Pálea subigual o menor que el lema, membranacea, binervada, biaquillada y bidentada, glabra o ciliada. Lodículas 2, membranaceas, lanceoladas, por lo general dentadas, glabras. Androceo con 3 estambres, exertos en antesis; anteras glabras. Ovario, de elipsoidal a obovoide, glabro; estilos 2; estigmas 2. Cariopsis elipsoidal u oblongo-elipsoidal, $\pm$ deprimida o surcada, pardusca, glabra, adherida a la pálea; hilo basal, linear. $x = 7$.

Observaciones.—El género, que ocupa una posición aislada dentro de la tribu (subtribu *Cynosurinae*), comprende unas 10 especies [R. Soreng & al. in J. Syst. Evol. 55: 259-290 (2017)] con representación en Europa, N y S de África, y W de Asia, algunas de ellas introducidas en diversas partes del mundo [L. Watson & M.J. Dallwitz, Grass Gen. World: 268-270 (1992)]. Las medidas de las inflorescencias, de las espiguillas y de los lemas excluyen las aristas.

Bibliografía.—R. MAIRE, Fl. Afr. Nord 3: 49-63 (1955) [taxonomía].

1. Lema de las flores fértiles con mucrón o arista de 0,5-1 mm, esta más corta que el cuerpo; inflorescencia espiciforme, linear; hierba perenne **1. C. cristatus**
- Lema de las flores fértiles con arista de (3)7-18 mm, mucho más larga que el cuerpo; inflorescencia en panícula ovoide u oblongo-ovoides, $\pm$ densa; hierba anual **2**
2. Limbo foliar con haz antrorso-escabriúscula; lígula 4-10(13) mm; lema de las flores fértiles con dorso escábrido; anteras (1,5)2-3 mm **2. C. echinatus**
- Limbo foliar con haz pubescente o velutina; lígula (1,5)3-5 mm; lema de las flores fértiles con dorso hispídulo al menos en su mitad distal; anteras 0,5-1,2 mm **3. C. effusus**

1. C. cristatus L., Sp. Pl.: 72 (1753)


[cristátus]

Phleum cristatum (L.) Scop., Fl. Carn. ed. 2, 1: 57 (1772)

Ind. loc.: “Habitat in Europae pratis” [lectotipo designado por T.A. Cope in Regnum Veg. 127: 41 (1993): LINN 91.1]

lc.: lám. 108

Hierba perenne, cespitosa. Tallos 10-95(100) cm, erectos o ascendentes, cilíndricos, estriados, glabros, con entrenudos ahuecados, y 3-4 nudos, al menos uno de ellos visible. Hojas con vaina abierta, herbácea, estriado-acostillada, verde, glabra; lígula 0,4-1 mm, truncada, membranacea, glabra; limbo de las hojas basales de 90-150(200) $\times$ 0,5-2(3) mm, linear, plano, con haz y envés acostillados—nervio medio algo más destacado por el envés—, por lo general antrorso o retrorso-escábrido en el haz—con denticulos y/o con pelos hasta de 0,1(0,2) mm— y glabro por el envés, el de las caulinares similar, pero de 40-90 mm. Panícula 2-9(12) $\times$ 0,5-0,7(1) cm, muy contraída, espiciforme, linear, recta o ligeramente curvada, dística y ligeramente unilateral, con raquis aplanado, en zigzag, y ramas muy cortas, las inferiores con 3(4) espiguillas dimorfas—2 estériles y 1(2) fértiles—, y las medias y superiores por lo general con 1-2 espiguillas fértiles superiores y 1 inferior estéril que las iguala o sobrepasa. Espiguillas estériles 4-5 mm, muy comprimidas, rígidas, con pedúnculo de 0,5-1 mm, constituidas por la raquilla y un conjunto de glumas y lemas linear-lanceolados, membranaceos, con una gruesa quilla verde y antrorso-



Lám. 108.—*Cynosurus cristatus*, a-k) Pinilla del Valle, Madrid (MAF 172917); l, m) Puerto de Somo-sierra, Madrid (MAF 172916); a) base del tallo y sistema radical; b) porción de tallo e inflorescencia; c) detalle del ápice de la vaina y ligula, en vista ventral; d) ramita de la inflorescencia con un grupo de espiguillas; e) espiguilla fértil; f) flor cerrada; g) gluma inferior, en vista dorsal; h) gluma superior, en vista dorsal; i) lema, en vista dorsal; j) pálea, en vista dorsal; k) lodícula; l) verticilos sexuales; m) cariopsis con resto de la base estilar, en vista ventral; n) cariopsis con resto de la base estilar, en vista dorsal.

31. *Cynosurus*

-escábrida, brevemente aristados, alcanzando todos ellos $\pm$ el mismo nivel; las fértiles de 3,5-4,5 mm, con pedúnculo de 0,5-0,7 mm, y (2)3-5(7) flores. Glumas de las espiguillas fértiles subiguales, membranáceas, estrechamente lanceoladas, agudas, aleznadas, con 1 nervio central ancho, verde, escabriúsculo o glabro; la inferior de 2-2,7 mm, y la superior de 2,5-3 mm. Raquilla con artejos glabros o escábridos. Lema de las flores fértiles 3-3,5 mm, papiráceo y con el margen apical membranáceo, lanceolado, agudo, con dorso densamente papiloso o antrorso-escábrido, y 3 nervios, los laterales a veces inconspicuos –el central más destacado–, verde o de un pardo claro en la madurez, con mucrón o arista apical de 0,5-1 mm, escábrida; callo 0,1-0,2 mm, orbicular, glabro, brillante. Pálea de las flores fértiles 2,5-3 mm, menor que el lema, membranácea, bidentada, con 2 quillas verdes y prominentes en el dorso, prolongadas en 2 dientes de 0,1-0,2 mm. Lodículas (0,3)0,5-0,6(1) mm, membranáceas, lanceoladas, glabras. Anteras 1,7-2(2,5) mm, amarillas o violetas. Cariopsis 1,8-2 $\times$ 0,7-0,9 mm, de elipsooidal a oblongo-elipsooidal, fuertemente adherida a la pálea; hilo 0,3-0,6 mm, linear. $2n = 14$.


Praderas y pastos mesófilos e higrófilos desarrollados en substratos húmedos ricos en nutrientes, favorecidos por el pastoreo intensivo; 0-1900(2100) m. V-VIII. Europa (incluido Córcega, Cerdeña, Sicilia y Creta), W de Asia, y Macaronesia (Azores y Madeira); introducido en el N de América y Australasia. N y C de la Península Ibérica, alcanzando Sierra Morena y Sierra Nevada. **And. Esp.:** Ab Av B Ba Bi Bu C Cc Co CR Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Na O Or P Po S Sa Sg So SS T Te To Va Vi Z Za. **Port.:** AAI BA BL DL E Mi TM. **N.v.:** cola de perro, crestilla común, crestilla de los prados; *port.:* rabo-de-cão, rabo-de-caó-empenachado, rabo-de-macaco; *cat.:* cua de gos.

2. *C. echinatus* L., Sp. Pl.: 72 (1753)

[echinátus]

Ind. loc.: "Habitat in Europa australiori" [lectótipo designado por J.F. Veldkamp in Taxon 49: 249 (2000): Herb. A. van Royen n.º. 913.62-79 (L)]
Ic.: lám. 109

Hierba anual. Tallos 12-80(100) cm, solitarios o fasciculados, erectos o geniculado-ascendentes, cilíndricos, estriados, glabros, con entrenudos ahuecados, y 4-6 nudos, uno o dos de ellos visibles. Hojas con vaina abierta, herbácea, estriado-acostillada, verde, glabra; lígula 4-10(13) mm, obtusa o truncada, entera, membranácea, glabra; limbo de las hojas basales de 40-200 $\times$ 5-10(12) mm, linear, plano, con haz y envés acostillados, glabro, $\pm$ antrorso-escabriúsculo al menos en los márgenes, el de las hojas caulinares similar, pero de 30-70(80) $\times$ 4-6,5(7) mm. Pánicula (1)2-5(5,5) $\times$ 0,7-1,5(2) cm, $\pm$ ovoide y por lo general unilateral, $\pm$ densa, con raquis de sección prismática, liso o ligeramente papiloso-escábrido, y ramas papiloso-escábridas, las inferiores con 2 espiguillas estériles basales y 1 superior fértil, y las medias y superiores por lo general con 1 o 2 espiguillas fértiles arriba, cada una de ellas con 1 espiguilla estéril inferior. Espiguillas estériles 5-9(12) mm, muy comprimidas, rígidas, sésiles o subsésiles, constituidas por la raquilla –débilmente papiloso-escabriúscula– y un conjunto de glumas y lemas linear-lanceolados en disposición dística, papiráceo-membranáceos, con nervio central prominente y antrorso-escábrido, largamente aristados, con arista apical, escábrida, alcanzando las de todos ellos $\pm$ el mismo nivel; las fértiles de (5,5)6-10 mm, con pedúnculo de 0,4-0,6 mm, liso o escabriúsculo, y 2-3 flores. Glumas de las



Lám. 109.—*Cynosurus echinatus*, a-j) entre Bolulla y Callosa de Ensarriá, Alicante (MAF 172920); k, l) Segurilla, Toledo (MAF 172919): a) hábito; b) detalle del ápice de la vaina y lígula, en vista ventral; c) espiguilla estéril; d) espiguilla fértil (delante) y espiguilla estéril (detrás); e) gluma inferior, en vista dorsal; f) gluma superior, en vista dorsal; g) lema, en vista dorsal; h) pálea, en vista dorsal; i) lodícula; j) verticilos sexuales; k) cariopsis, en vista ventral; l) cariopsis, en vista dorsal.

31. *Cynosurus*

espiquillas fértiles subiguales, membranáceas, lanceolado-acuminadas, aquilladas, con 1 nervio central ancho, escabriúsculas en el cuarto distal, tanto sobre el nervio como en los márgenes; la inferior de 6-9 mm, y la superior de 6,5-9,5(10) mm. Raquilla con artejos glabros o escábridos. Lema de las flores fértiles (3,5)5-7 mm, papiráceo, lanceolado, bidentado en el ápice, con dorso antrorso-escábrido al menos en la base y en su mitad distal, verde o pardo claro en la fructificación, con 5 nervios, aristado, con arista de (5,5)7-15(18) mm, escábrida, inserta en la escotadura de los dientes, en ocasiones teñida de púrpura; callo 0,2-0,3 mm, orbicular, glabro. Pálea de las flores fértiles 5-7 mm, membranácea, bidentada, con 2 quillas verdes y prominentes en el dorso, prolongadas en 2 dientes o arístulas de 0,1-0,2 mm. Lodículas 0,4-0,6 mm, membranáceas, $\pm$ lanceoladas, glabras. Anteras (1,5)2-3 mm, amarillas. Cariopsis (2,8)3-3,5 $\times$ (0,8)1-1,2 mm, fuertemente adherida a la pálea; hilo 0,5-1 mm, linear. $2n = 14$.

Pastos de terófitos y herbazales; 0-2000 m. IV-VIII. Región Mediterránea, C y W de Asia, y Macaronesia (Azores, Canarias y Madeira); naturalizado en el C y N de Europa. Toda la Península e Islas Baleares. **And. Esp.:** A Ab Al Av B Ba Bi Bu (C) Ca Ce Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or P PM Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. **Port.:** AAl Ag BA BAl BB BL E R TM. **N.v.:** cola de perro, cinosurus erizado, grama estrellada; **port.:** rabo-de-cão, rabo-de-caoriçado; **cat.:** cua de gos, moixets bords.

3. *C. effusus* Link in J. Bot. (Schrader): 315 (1800)

[effúsus]


Chrysurus effusus (Link) P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 123 (1812)

C. elegans auct., non Desf.

Ind. loc.: "Findet sich auf den Wiesen um Cintra und Caldas da Raynha"

lc.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 627 (1906) [var. *obliquatus*, sub *C. elegans*]; Devesa (ed.), Gram. Extremadura: 71 lám. 14 [var. *obliquatus*, sub *C. elegans*]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 298 (1987) [var. *obliquatus*, sub *C. elegans*]; lám. 110

Hierba anual. Tallos (1)4-80(95) cm, solitarios o fasciculados, erectos o geniculado-ascendentes, cilíndricos, estriados, glabros, con entrenudos ahuecados, y 2-3 nudos, uno de ellos visible y negruzco. Hojas con vaina abierta, herbácea, estriado-acostillada, verde o a veces teñida de púrpura, glabra; lígula (1,5)3-5 mm, de aguda y entera a obtusa y premorsa, membranácea, glabra; limbo de las hojas basales de 20-100(150) $\times$ 1-3(3,5) mm, linear, plano, con haz y envés acostillados, antrorso-escabriúsculo al menos en los márgenes, con haz pubescente o velutina, con pelos de 0,2-0,3 mm, y envés glabro, el de las hojas caulinares similar. Panícula 0,5-4(6) $\times$ 0,5-1,5(2) cm, ovoide, oblongo-ovoide o subcilíndrica, unilateral, $\pm$ densa, con raquis de sección prismática, liso o $\pm$ antrorso-escábrido, y ramas finamente escábridas, las inferiores con (1)2(3) espiquillas estériles basales o sin ellas y (0)1 superior fértil, las medias y superiores por lo general con 1 o varias espiquillas fértiles arriba, y (0)1 estéril inferior. Espiguillas estériles 3-5 mm, muy comprimidas, rígidas, pedunculadas –pedúnculo de 1,5-3 mm, escábrido–, constituidas por la raquilla y un conjunto de glumas y lemas linear-lanceolados en disposición dística, papiráceo-membranáceos, pelosos, largamente aristados, con arista apical, escábrida, alcanzando las de todos ellos $\pm$ el mismo nivel; las fértiles de 3,5-5 mm, con pedúnculo de 0,4-2(2,5) mm, liso o ligeramente escabriúsculo, y 1-3 flores. Glumas de las espiquillas fértiles subiguales, membranáceas, lanceo-



Lám. 110.—*Cynosurus effusus* [var. *effusus*], a-n) barranco dos Pisos, Sierra de Monchique, Algarve (SALAF 254): a) base de los tallos, hojas y sistema radical; b, c) tallos floridos; d) detalle del ápice de la vaina y lígula, en vista adaxial; e) espiguilla estéril; f) espiguilla fértil (delante) y espiguilla estéril (detrás); g) espiguilla fértil; h) gluma inferior, en vista dorsal; i) gluma superior, en vista dorsal; j) lema, en vista dorsal; k) pálea, en vista dorsal; l) verticilos sexuales; m) cariopsis, en vista ventral; n) cariopsis, en vista dorsal. *C. effusus* [var. *obliquatus*], Font Roja, Alcoy, Alicante (MAF 176365): o) detalle de inflorescencia.

32. Ammochloa

ladas, agudas, aquilladas, con 5 nervios –el central $\pm$ marcado y el resto inconspicuos–, antrorso-escabriúsculas al menos en los márgenes; la inferior de 3-5 mm, y la superior de 4-6 mm. Raquilla con artejos glabros o escábridos. Lema de las flores fértiles 2,5-4 mm, papiráceo, lanceolado, bidentado en el ápice, con dorso hispídulo-escábrido al menos en su mitad distal, verde o de un pardo claro en la fructificación, con 1 nervio central poco marcado, aristado, con arista de (3)7-15(18) mm, escabriúscula, inserta en la escotadura de los dientes; callo 0,1-0,2 mm, orbicular, glabro. Pálea 2,5-3,5(4) mm, membranácea, bidentada, ciliada en el tercio distal, con 2 quillas verdes y prominentes en el dorso, ciliado-escábridas al menos distalmente, prolongadas en 2 dientes o arístulas de 0,05-0,1 mm. Lodículas 0,4-0,6 mm, membranáceas, lanceoladas con la base ligeramente ensanchada y el extremo filiforme, glabras. Anteras 0,5-1,2 mm, amarillas. Cariopsis 2-2,5 $\times$ 0,7-1,2 mm, fuertemente adherida a la pálea; hilo 0,5-1,2 mm, linear. $2n = 14$.

Pastos esciófilos de terófitos, en barrancos, laderas erosionadas, cunetas, claros de bosque o matorral; 130-2200 m. IV-VII. SW de Europa, Región Mediterránea, SW de Asia y Macaronesia (Canarias y Madeira). Casi toda la Península Ibérica y Baleares. **Esp.:** A Ab Al Av B Ba Bi Bu Ca Cc Co CR Cs Cu (Ge) Gr Gu H J Le Lo Lu M Ma Mu Na (O) Or P PM[Mil] S Sa Se Sg SS So T Te To V Va Vi Z Za. **Port.:** AAl Ag BA BAl BB BL E R TM.

Observaciones.–La especie ha sido confundida a menudo con *C. elegans* Desf., Fl. Atlant. 1: 82, tab. 15 (1798), que se distribuye por Túnez y Argelia [cf. Dobignard & Chatelain, Index Syn. Fl. Afrique N. 1: 267-268 (2010)] y es dudosa en Marruecos [cf. Fennane & al. (eds.) Fl. Maroc 3: 554 (2014)]. Se caracteriza por tener inflorescencias más grandes (6-10 cm), lemas de las flores fértiles con arista hasta de 30 mm, y anteras más grandes, hasta de 2,5 mm [cf. R.R. Mill in P.H. Davis, Fl. Turkey 9: 514-515 (1985)].

Cynosurus effusus presenta en la Península Ibérica tres pautas predominantes de variación, consideradas aquí con categoría varietal y entre las cuales, no obstante, hay ejemplares intermedios de difícil adscripción. Por un lado, las plantas con panícula (3)5-8,5 veces más larga que ancha, $\pm$ subcilíndrica y algo laxa, nada o apenas unilateral, poco o nada inclinada, se identifican con *C. effusus* var. *effusus* [*C. polybracteatus* var. *chalybaeus* (Pérez Lara) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 24 (1893)], extendida por el W de la Región Mediterránea, S de Europa y N de África, y que en la Península Ibérica abunda sobre todo en su mitad centro-occidental [Esp.: Ba Ca Cc Lu Ma Or PM[Mil] To. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL E R TM]. Extendida por toda la Región Mediterránea y el SW de Asia, y más abundante en la Península [Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H J Le Lo M Ma Mu Na (O) Or P PM[Mil] S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: BB TM], aparece *C. effusus* var. *obliquatus* (Link) Cantó & Devesa in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 19(1): 440 (2020), comb. nov. [*C. obliquatus* Link in Linnaea 17: 406 (1843), basión.; *C. elegans* var. *obliquatus* (Link) Nyman, Syll. Fl. Eur.: 406 (1855); *C. polybracteatus* sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 1: 90 (1861), non Poir., Voy. Barbarie 2: 97 (1789)], con panícula 2-4 veces más larga que ancha, ovoide u oblongo-ovoide, $\pm$ densa, marcadamente unilateral e inclinada. Una tercera variedad, muy rara en la Península Ibérica, es *C. effusus* var. *fertilis* (Lens ex Loisel.) Cantó & Devesa in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 19(1): 440 (2020), comb. nov. [*C. fertilis* Lens ex Loisel., Fl. Gall. ed. 2, 1: 68 (1828), basión.], caracterizada por la ausencia total o casi de espiguillas estériles y conocida con seguridad de muy pocas localidades: Portugal (Coimbra), España (Málaga), Francia (Córcega) y Grecia (Kos, Dodecaneso).

32. Ammochloa Boiss.*

[Ammóchloa, -ae f. – gr. ἄμμος, arena; ἡ χλόη, brote primaveral verde y tierno, verdor primaveral (epíteto de Deméter). Nombre acuñado por P.E. Boissier, Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 13: 51 (1854) para

* F. Llamas, C. Acedo & J.A. Devesa