la con 5 dientes iguales, en la base no sacciforme, amarilla. Aquenios de flores liguladas triquetros y con 2 o 3 alas, los de los flósculos comprimidos lateralmente y con 1 o 2 alas, en ocasiones cilíndricos, ápteros y con 10 costillas, con pericarpio no mixógeno y sin sacos resiníferos. Vilano nulo o formado por una corona.

126. Heteranthemis Schott*

[Heteránthemis, -idis f. – gr. ἕτερος, -ᾱ, -ον, otro, diferente; gr. ἡ ἀνθεμίς : ἀνθέω, florecer : τὸ ἄνθος, flor; gr. -μα (sufijo nominal); gr. -ίς (sufijo nominal femenino). Nombre del género publicado por H.W. Schott in Isis (Oken) 1818: 822 (1818) para su nueva especie *H. viscidehirta* Schott, nativa del suroeste ibérico y el noroeste de África. No dio explicación alguna sobre la etimología del nombre, pero parece verosímil que con ella quisiera aludir a *Anthemis* L., género del que el suyo diferiría, sin que tampoco dijera en qué. *Heteranthemis viscidehirta* pudiera parecerse a una especie de *Anthemis* de lígulas amarillas, empero pertenece a otra subtribu distinta de la de las especies de *Anthemis,* la subtribu *Glebionidinae* Oberpr. & Vogt, y puede distinguirse con facilidad de las mismas por ser una hierba víscida de aquenio frecuentemente alado y pericarpio no mixógeno. A.Q]

Hierbas anuales, inermes, víscidas. Tallos erectos, de ordinario ± ramificados, con abundante indumento glandulífero. Hojas alternas, obovadas u oblongas, las inferiores de pinnatipartidas a pinnatisectas, las medias ± envainadoras, sésiles, crasas, glabras. Inflorescencia corimbiforme o monocéfala. Capítulos radiados y heterógamos, pedunculados. Involucro hemisférico, umbilicado, glabro; brácteas dispuestas en 3 o 4 series, imbricadas, con margen hialino-escarioso. Receptáculo convexo, no paleáceo, glabro. Flores externas liguladas, femeninas, fértiles, dispuestas en una sola serie, con corola tridentada, amarilla. Flósculos hermafroditas, fértiles; corola con limbo de 5 dientes iguales y tubo cilíndrico, en la base estrechado sobre el ápice del ovario y alrededor del estilo, no sacciforme, amarilla. Anteras sin apéndices basales. Estilo terminado en 2 ramas estilares usualmente lineares, peniciladas en la parte distal. Aquenios heteromorfos, glabros, alados, con alas prolongadas apicalmente en un apéndice espinoso, con costillas, sin canales resiníferos entre ellas, con pericarpio no mixógeno, hilo cárpico basal o subbasal; los de las flores liguladas trígonos, no comprimidos lateralmente, con 2 alas laterales y 1 en la cara adaxial; los de los flósculos comprimidos lateralmente y con un ala en la cara adaxial. Vilano nulo. $x = 9$.


Observaciones.–Género monoespecífico cuya distribución se centra en la Península Ibérica y el NW de África.

1. H. viscidehirta Schott in Isis (Oken) 1818: 822 (1818) [viscidehírta]

Chrysanthemum viscidehirtum (Schott) Thell. in Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 38: 523 (1912)
Pinardia anisocephala Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. 41: 39 (1826)
Ind. loc.: "Hab. in maritimis Algeciras"
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 66 (1987); lám. 376

* C. Benedí

6 Compositae_pp1908-2048_ferros.qxp_Vol. XVI (III).qxd 11/2/19 08:01 Página 1973



Lám. 376.–*Heteranthemis viscidehirta*, a-c, e-l) Bonanza, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz (MA 477288); d) Isla Cristina, Huelva (MA 128154); m-p) Mazagón, Huelva (MA 241375): a, b) hábito; c) indumento del tallo; d) hoja basal; e) hoja media; f) hoja superior; g) capítulo; h) bráctea involucral externa; i) bráctea involucral media; j) bráctea involucral interna; k) flor ligulada; l) flósculo; m) aquenio de una flor ligulada; n) sección transversal del aquenio de una flor ligulada; o) aquenio de un flósculo; p) sección transversal del aquenio de un flósculo.

6 Compositae_pp1908-2048_ferros.cxp Vol XVI (III).cxd 11/24 09:01 Página 1974

Hierba anual, densamente víscida. Tallos (10)35-50(65) cm, sulcados, ramificados hacia la mitad o en el tercio superior, más raramente simples, en ocasiones muy robustos, hasta de 10 mm de diámetro, con abundantes pelos glandulíferos patentes hasta de 1 mm, ± glabrescentes en la base, de color pajizo. Hojas basales y medias 30-60(70) × 18-30 mm, espatuladas u obovadas, irregularmente pinnatipartidas o pinnatisectas, las basales atenuadas hacia la base, las medias semiamplexicaules y auriculadas, con margen ± ondulado, carnosas, glabras, con segmentos de (2,5)5-9(15) × 3-5(7) mm, anchamente triangulares, dentados, con dientes rematados por un mucrón nítido, rígido, de color blanquecino; hojas superiores oblongas o lanceoladas, dentadas en la base o subenteras, amplexicaules, a veces con algún pelo glandulífero. Inflorescencia corimbiforme, con 3-5(7) capítulos, en ocasiones monocéfala. Capítulos de 25-50(60) mm de diámetro; pedúnculos 25-50(60) mm, sulcados, engrosados en la fructificación, hasta de 4 mm de diámetro bajo el capítulo, con abundante indumento glandulífero. Involucro de 16-20(30) mm de diámetro, netamente umbilicado en la fructificación; brácteas dispuestas en 3 o 4 series, glabras; las externas 5-6 × 2,3-2,5 mm, triangulares, con margen estrechamente hialino-escarioso; las internas 8,5-9,5 × 3-4 mm, obovadas, con margen anchamente hialino-escarioso hasta de 3 mm en el ápice. Receptáculo 2-2,5 × 5-5,5 mm, hemisférico, acrescente, hasta de 3,5 × 6 mm en la fructificación, sin páleas. Flores liguladas 13-16 por capítulo, femeninas, de un amarillo intenso, ± reflejas en la fructificación; limbo 15-25 × 3,5-6 mm, oblongo; tubo c. 2 mm. Flósculos 3,5-3,7 mm, amarillos, con el tubo no hinchado en la fructificación. Aquenios dimorfos, de un castaño claro; los de las flores liguladas 4,5-5,5 × 3,5-4 mm, trígonos, con 2 o 3 surcos dorsales, 2 costillas laterales –a veces poco marcadas– provistas de una excrecencia a modo de ala de 0,2-0,5 mm de anchura y una costilla alada neta en la cara adaxial de 1,5-2,5 mm de anchura, las 3 costillas prolongadas en el ápice por un apéndice hasta de 0,6 mm, espinoso, patente o erecto-patente; los de los flósculos 3,5-4 × 2-2,3 mm, comprimidos lateralmente, con 3 o 4 surcos en cada cara, provistos de una costilla alada en la cara adaxial de 0,9-1,2 mm de anchura, prolongada en su ápice por un apéndice hasta de 1 mm, espinoso, erecto-patente. $2n = 18$*; $n = 9$*.

Arenales y herbazales costeros ± nitrificados; 0-50 m. IV-VI. SW de Europa y NW de África; introducida en el W de Norteamérica y E de la Región Mediterránea, adventicia en Bélgica. Localizada en algunos puntos del litoral atlántico del SW peninsular. **Esp.:** Ca H. **Port.:** Ag. **N.v.,** *port.:* pampilho-viscoso.

127. **Glebionis** Cass.*

[Glebiónis, -ónum f. – lat. *glēba (glaeba), -ae,* gleba, terrón (de tierra cultivada); lat. *-iōnis* (sufijo en genitivo; nom. *–io).* Nombre publicado por A.H.G. de Cassini in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 41: 41-43 (1826) para clasificar *Pyrethrum indicum* Roxb. ex Sims, nombre que, a su juicio, correspondía a *Chrysanthemum indicum* L. Parece que no dio explicación alguna sobre la etimología de este nombre, por lo que solo nos queda especular con el significado literal que podamos atribuirle: la primera opción

* C. Benedí