7 Gramineae_AF_pp 1145-1236_Esp 95-106.qxp_Vol. XIX(2).qxd 26/6/21 10:36 Página 1226

Se trata de plantas con tallos más elevados y robustos –incluso trepadores sobre muros y cercados–, con hojas más anchas, y estambres más largamente exertos, que florecen en menor proporción. Muchos de ellos no llegan a producir semillas maduras en ningún caso [cf. J.J. Herrero-Borgoñón & al. in Israel J. Pl. Sci. 43: 159-162 (1995)].

Como en las especies anteriores, *C. clandestinus* ha sido incluida recientemente –bajo el nombre *Pennisetum clandestinum*– en el "Catálogo español de especies exóticas invasoras" (Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto), en el que se prohíbe su comercialización o se recomienda su sustitución progresiva por otras especies ornamentales no invasoras.

Paspaleae C. Presl*

Hierbas perennes, cespitosas o estoloníferas. Hojas con vaina de márgenes libres, sin aurículas; lígula membranácea, ciliada o no. Inflorescencia compleja, formada por racimos unilaterales digitados o repartidos en la parte apical del tallo. Espiguillas comprimidas dorsiventralmente, todas semejantes, solitarias o geminadas, con 1 flor hermafrodita apical, acompañada por otra basal estéril reducida al lema. Glumas 1-2, desiguales, la inferior reducida a una escama o ausente, la superior con 3-5 nervios. Lema de la flor basal herbáceo o papiráceo, semejante a la gluma superior y ocupando el lugar que corresponde a la gluma inferior; lema de la flor apical coriáceo o cartilaginoso en la madurez, con el dorso redondeado, con 3 nervios, sin arista. Lodículas 2, libres, a veces lobadas o dentadas. Estambres 3. Ovario glabro. Cariopsis encerrada en el lema; hilo punctiforme o elíptico. $x = 9, 10$.

Observaciones.–Gramíneas muy semejantes morfológicamente a otras de la tribu *Paniceae*, con la que comparte la estructura de sus espiguillas. Comprende 39 géneros y unas 597 especies [R.J. Soreng & al. in J. Syst. Evol. 55: 259-290 (2017)], mayoritariamente americanas. Solo dos géneros alcanzan nuestro territorio, ambos de la subtribu *Paspalinae*, la más importante de las tres reconocidas en la clasificación que seguimos aquí.

105. Paspalum L.**

[Páspalum, -i n. – gr. ὁ πάσπᾰλος, mijo. Parece que fue Galeno quien nos presentó este sinónimo del *milium* latino –cf. C.G. Kühn, Galen Op. Omn. 19: 128 (1830)–. C. von Linné, Syst. Nat. ed. 10, 2: 846, 855, 1359 (1759) lo utilizó para dar nombre a uno de sus géneros, el encabezado por *P. dimidiatum* L., nom. illeg. –*P. dissectum* L.–. A.Q.]

Hierbas generalmente perennes, rizomatosas, estoloníferas o no, a veces cespitosas. Tallos solitarios o fasciculados, erectos o ascendentes, estriado-acostillados, cilíndricos, con entrenudos ahuecados, glabros, con 2-5 nudos visibles y base cubierta por las vainas marcescentes. Hojas alternas, sésiles y envainadoras, con vaina de bordes superpuestos, no soldados, en general herbácea, nervada, sin aurículas; lígula subelíptica, triangular o ± trapezoidal, aguda u obtusa, ± irregularmente

* A. Buira & C. Aedo (eds.)
** R. Morales

dentada o lacerada, membranácea, generalmente glabra, con mechones de largos pelos a los lados o en el dorso; limbo lanceolado, plano, nervado, por lo común glabro, escábrido al menos en los márgenes. Inflorescencia paniculiforme formada por racimos espiciformes densos, con raquis recto o ± sinuoso, y espiguillas dispuestas regularmente en 2 o 4 series. Espiguillas comprimidas, brevemente pedunculadas, con 2 flores, la superior fértil, hermafrodita y la basal vestigial, generalmente sin pálea. Gluma superior del tamaño de la espiguilla, convexa, con 3-5 nervios marcados, la inferior ausente o a veces vestigial. Lema elíptico, con dorso redondeado, plano, en general con 3-5 nervios marcados. Pálea cuyo reborde se prolonga y en general deja un hueco formado por dos círculos, el superior mayor que el inferior, con un estrechamiento entre ellos. Lodículas 2, membranáceo-hialinas, con frecuencia dentadas, glabras. Androceo con 3 estambres. Ovario glabro; estilos 2; estigmas 2, plumosos. Cariopsis elipsoidal, con hilo de punctiforme a linear, glabra. $x = 10$.

Observaciones.–Género que incluye unas 350 especies distribuidas por regiones tropicales y templadas, sobre todo en América [cf. F.O. Zuloaga & O. Morrone in Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 102: 1-297 (2005)].


Bibliografía.–A. Chase in Contr. U.S. Natl. Herb. 28: 1-310 (1929); R. de Koning & M.S.M. Sosef in Blumea 30(2): 279-318 (1985); E. Paunero in Anales Inst. Bot. Cavanilles 20: 51-90 (1963); F.O. Zuloaga & O. Morrone in Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 102: 1-297 (2005).

1. Hierba estolonífera; inflorescencia con 2(3) racimos; espiguillas dispuestas en 2 series, glabras o con pelos cortos 2
– Hierba no estolonífera; inflorescencia con (2)3-18 racimos; espiguillas dispuestas en 4 series, con pelos largos 4
2. Racimos pedunculados, al menos uno de ellos; espiguillas algo pelosas, con pelos cortos ..... **1. P. distichum**
– Racimos pedunculados o sésiles; espiguillas glabras 3
3. Racimos 1,5-6,2 cm, sin prolongación estéril, con pedúnculos de 5-14 mm .... **2. P. vaginatum**
– Racimos 4,5-12,5 cm, con prolongación estéril, con pedúnculos de 0,5-0,8(3) mm .... **3. P. notatum**
4. Racimos (2)3-7; espiguillas 2,7-4 × 2-2,4 mm; gluma superior y lema de la flor estéril con 5 nervios ..... **4. P. dilatatum**
– Racimos 7-18; espiguillas 2,5-3 × 1,5-1,7 mm; gluma superior y lema de la flor estéril con 3 nervios ..... **5. P. urvillei**

1. P. distichum L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 855 (1759) [dístichum]

Digitaria paspalodes Michx., Fl. Bor.-Amer. 1: 46 (1803)
P. paspalodes (Michx.) Scribn. in Mem. Torrey Bot. Club 5: 29 (1894)
Ind. loc.: No indicada de forma expresa ["Habitat in Jamaica" sec. L., Sp. Pl. ed. 2, 1: 82 (1762); lectótipo designado por P. Jovet & M. Guédès in Taxon 25(4): 513 (1976): LINN 79.9, segundo espécimen por la izquierda]
Ic.: Anton & Zuloaga (eds.), Fl. Vasc. Argent. 3(1): 395 (2012); Paunero in Anales Inst. Bot. Cavanilles 20: 85 lám. 4 (1963); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 399 (1987); lám. 234 a-i

7 Gramineae_AF_pp 1145-1236_Esp 95-106.qxp_Vol. XIX(2).qxd 26/6/21 10:36 Página 1228



Lám. 234.–*Paspalum distichum,* a, i) salto del Porvenir, San Román de los Infantes, Zamora (MA 793208); b-h) Estación Experimental del Zaidín, Granada (MA 753849): a) hábito; b) nudo caulinar; c) detalle de la vaina, lígula y base del limbo; d) rama de la panícula con espiguillas; e) gluma superior, en vista abaxial; f) lema, en vista abaxial; g) pálea superior, en vista adaxial; h) gineceo); i) cariopsis, en vista ventral. *P. vaginatum,* entre el Brazo de la Torre y Caño Travieso, Coto de Doñana, Huelva (MA 549590): j) hábito; k) rama de la panícula con espiguillas; l) gluma superior, en vista abaxial; m) lema, en vista abaxial; n) pálea superior, vista adaxial; o) lodícula. *P. notatum,* San Vicente, campus de la Universidad de Alicante (MA 577219): p) hábito; q) rama de la panícula con espiguillas; r) gluma superior, en vista abaxial; s) lema, en vista abaxial; t) pálea superior, en vista adaxial; u) lodículas; v) androceo.

Hierba perenne, estolonífera, prostrada o ascendente. Tallos (8)17-79(88) cm, estriados; nudos 1-3 mm, glabros o pelosos, obscuros en general. Hojas con vaina de 1,8-7,5 cm, que en general no cubre el nudo siguiente, abierta casi hasta el nudo, con cilios marginales en su parte superior; lígula 1,5-2 mm, ± triangular, irregularmente dentada, lacerada, membranácea, con pelos hasta de 4 mm a los lados; limbo 3,5-19 × 0,15-0,9 cm, lanceolado, agudo, peloso hacia arriba. Inflorescencia formada por 2 racimos espiciformes, raramente 3, de 1,9-6 cm, irregularmente pedunculada, a veces con pedúnculo de 2-4,5 mm, con frecuencia un racimo pedunculado y otro sentado, a veces arqueados hacia dentro, unidos los 2 en el ápice o a lo largo de todo el eje, con pelos en la axila. Espiguillas 8-25, de 2,5-3,5 × 1,4-1,8 mm, con pedúnculo de 0,6-1 mm, imbricadas, dispuestas en 2 series sobre un eje aplanado, ensanchado, de 1-2 mm de anchura, con frecuencia algo sinuoso y de rebordes blanquecinos. Glumas desiguales en tamaño; gluma inferior a veces presente, vestigial, de 0,4-1,2 mm, de escuamiforme a largamente triangular; gluma superior del tamaño de la espiguilla, elíptica, con un mucrón de 0,2 mm, y 5 nervios longitudinales verdes, pelosa, con pelos adpresos blanquecinos, o a veces casi depilada. Lema de la flor estéril membranáceo como la gluma superior, con 5 nervios longitudinales verdes, 2 de ellos casi marginales, a veces de color violeta hacia el centro y los bordes; lema de la flor fértil de 2,2-,2 5 mm, elíptico, cerrado con la pálea, de superficie brillante. Pálea de c. 2,2 mm. Lodículas c. 0,2 mm, minúsculas. Estambres 3, con filamentos filiformes, de color blanco, exertos o con apertura dentro de las brácteas florales; anteras 1,2-1,5 mm, de color violeta obscuro. Estigmas 1,2-1,5 mm, que sobresalen entre las brácteas florales, a veces también con los estambres exertos, con frecuencia algunos racimos solamente con flores femeninas. Cariopsis 2-2,1 × 1,2-1,5 mm, elipsoidal, de color castaño. $2n = 60$.

Lugares húmedos o encharcados, orillas de lagunas, charcas, acequias, albuferas, marismas y caminos, así como en cultivos de regadío –arrozales, maizales, campos de alfalfa–, en substratos arcillosos –a veces salinos–, arenas silíceas o cascajares; 0-850 m. III-XII. Oriunda de América tropical; naturalizada en muchas partes del mundo, sobre todo en zonas templadas y tropicales. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica y Baleares. **Esp.:** [A] [Av] [B] [Ba] [Bi] [Bu] [C] [Ca] [Cc] [Co] [CR] [Cs] [Cu] [Ge] [Gr] [H] [J] [L] [Le] [Lo] [Lu] [M] [Ma] [Mu] [Na] [(O)] [Or] [PM[Mll Mn]] [Po] [S] [Sa] [SS] [T] [Te] [To] [V] [Va] [Vi] [Z] [Za]. **Port.:** [Ag] [AAl] [BA] [BAl] [(BB)] [BL] [E] [R] [TM]. **N.v.:** grama, panizo; *port.:* alcarnache, grama-de-joanópolis, graminhão; *cat.:* gram d'aigua, gram dolç, gram de torrent (Menorca).

Observaciones.–Se han observado formas cespitosas con numerosos nudos enraizantes, con racimos espiciformes cortos; y otras más erguidas, hasta de 80 cm y con racimos espiciformes más largos, hasta de 6 cm. También hay formas acuáticas con innumerables raíces en los nudos. Parece que muchas poblaciones son prácticamente estériles y se reproducen vegetativamente. Al parecer se usa como césped de jardines en el sur y en Levante.

2. P. vaginatum Sw., Prodr.: 21 (1788) [vaginátum]

Digitaria vaginata (Sw.) Philippe, Fl. Pyren. 2: 415 (1859)

Ind. loc.: "Jamaica" [lectótipo designado por R. de Koning & M.S.M. Sosef in Blumea 30(2): 310 (1985): S-R-4070]

Ic.: Anton & Zuloaga (eds.), Fl. Vasc. Argent. 3(1): 440 (2012); Paunero in Anales Inst. Bot. Cavanilles 20: 85 lám. 3 (1963); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 400 (1987); lám. 234 j-o

7 Gramineae_AF_pp 1145-1236_Esp 95-106.qxp_Vol. XIX(2).qxd 26/6/21 10:36 Página 1230

Hierba perenne, cundidora, estolonífera, no siempre enraizante en los nudos, que a veces forma céspedes. Tallos (7)18-67 cm, estriados, los vegetativos con entrenudos cortos y hojas con vaina muy ancha y abierta; nudos 1,5-2,5 mm, en general obscuros. Hojas con vaina de 3-7,5 cm; lígula 0,7-1 mm, subelíptica, trapezoidal o con salientes hacia el centro, lacerada sobre todo en las hojas vegetativas, membranácea, a veces con pelos laterales; limbo 2,5-11 × 0,1-0,2 cm, en general estrecho, estriado. Inflorescencia formada por 2(3) racimos espiciformes –el tercero nace en el centro–, de (1)1,7-6,2 cm, pedunculados, con pedúnculos de la misma longitud, de 5-14 mm, sin pelos en la axila, y con eje en general sinuoso, delgado, abiertos en ángulo agudo, opuestos o en ángulo obtuso dirigidos hacia abajo, con frecuencia con una lámina foliar que llega hasta los racimos por el centro. Espiguillas 7-14, de 2,7-3,2 × 1,1-1,2 mm, glabras, dispuestas en 2 series, en general encastradas en el eje, muy cortamente pedunculadas. Gluma superior aplanada, del mismo tamaño que la espiguilla, con 5 nervios longitudinales, levemente mucronada, membranácea; la inferior generalmente falta. Lema de la flor estéril, aplanada, transversalmente ondulada en la mitad inferior, con 3-5 nervios; lema de la flor fértil convexa, de superficie brillante y dura. Pálea de c. 2,5 mm, con los márgenes internos muy poco desarrollados. Lodículas 2, de 0,2 mm, minúsculas. Anteras 1,4-1,5 mm, de color violeta obscuro. Estigmas 1-1,2 mm, plumosos, de color violeta obscuro. Cariopsis 1,6 × 1 mm, elipsoidal, de color castaño. $2n = 20$; $n = 10$.

Zonas húmedas de marisma, pastos inundados, marjales y herbazales, a veces en arenales marítimos y pies de acantilado; 0-300 m. IV-XI. Oriunda de América tropical; naturalizada en muchas partes del mundo, sobre todo en zonas templadas y tropicales. Dispersa por la mayoría de provincias litorales de la Península Ibérica y Baleares. **Esp.:** [A] [(Ab)] [(Al)] [B] [Bi] [C] [Ca] [Cs] [Gr] [H] [(Le)] [Ma] [(Mu)] [(Na)] [(O)] [PM[Mll (Mn) Ib]] [Po] [S] [SS] [T] [V] [Za]. **Port.:** [BAl] [(BL)] [DL] [E] [Mi]. **N.v.:** grama de río, grama dulce; *cat.:* gram d'aigua.

3. P. notatum Flüggé, Gram. Monogr. Paspalum: 106 (1810) ["notatus"] [notátum]

P. notatum var. *saurae* Parodi in Revista Argent. Agron. 15: 55, fig. 1b (1948)
P. saurae (Parodi) Parodi in Darwiniana 15: 106 (1969)
Ind. loc.: "Insula St. Thomae. Exemplaria mecum communicaverunt Schrader et Ventenat" [lectótipo designado por R. de Koning & M.S.M. Sosef in Blumea 30(2): 313 (1985) y Anton & Zuloaga (eds.), Fl. Vasc. Argent. 3(1): 419 (2012), en segundo paso: BM]
Ic.: Anton & Zuloaga (eds.), Fl. Vasc. Argent. 3(1): 420 (2012); lám. 234 p-v

Hierba perenne, con rizomas estoloníferos cubiertos de las vainas de las hojas basales, glabras. Tallos 31-47(88) cm, estriados; nudos hasta de 2 mm, obscuros. Hojas con vaina de 4-12(17) cm, ± cerrada, que en general no alcanza el nudo siguiente; lígula de c. 1 mm, anular, con pelos por dentro y con frecuencia con largos pelos laterales hasta de 4 mm; limbo 7-14(25) × 0,1-0,4 cm, de linear a linear-lanceolado, con el nervio medio conspicuo. Inflorescencia formada por 2(3) racimos espiciformes, de 4,5-12,5 cm, ± pedunculados, con pedúnculos de 0,5-0,8(3) mm, con mechones de pelos hasta de 4 mm en la axila basal, a veces arqueados hacia fuera, con raquis visible zigzagueante, blanquecino, y dos rebordes

7 Gramineae_AF_pp 1145-1236_Esp 95-106.qxp_Vol. XIX(2).qxd 26/6/21 10:36 Página 1231

laterales verdes, a veces con las espiguillas superiores estériles y caducas de modo que el eje queda desnudo apicalmente. Espiguillas 22-35(50), de 2,8-3,2 × 1,5-2 mm, con pedúnculo de 0,5-0,8 mm, elípticas, aplanadas, agudas, glabras, dispuestas en 2 series, imbricadas. Gluma inferior ocasionalmente presente, sobre todo en las espiguillas inferiores, vestigial, hasta de 1,5 mm, pequeña, ovada; gluma superior en general aguda, elíptica, del tamaño de la espiguilla, convexa, con 3(5) nervios bien marcados, a veces de reborde color violáceo obscuro. Lema de la flor estéril c. 2,6 × 1,7 mm, elíptico, con el mismo aspecto que la gluma superior, con un nervio central longitudinal y dos laterales; lema de la flor fértil de 2,3-3,3 mm, levemente estriado. Pálea 2-2,1 × 1,3-1,4 mm, elíptica, lisa y brillante, de la misma consistencia que el lema, con los márgenes internos doblados –con aspecto panduriforme–. Lodículas 2, de c. 0,4 mm, a veces de color marrón. Anteras 1,5-2 mm, de color rojo obscuro. Estigmas 1-2 mm, plumosos, que sobresalen lateralmente de las brácteas florales, de color rojo obscuro. Cariopsis no vista.


Márgenes de río y bordes de carretera, en ambientes ruderales, o en céspedes de jardín; 0-100(480) m. VIII-XI. Oriunda de Centroamérica y Sudamérica; naturalizada en muchas partes del mundo, sobre todo en zonas templadas y tropicales. Localidades dispersas por el litoral, y W y C de la Península Ibérica y Baleares. **Esp.:** [A] [B] [(Ba)] [C] [(Cc)] [Ge] [(H)] [(Hu)] [(Mu)] [(Or)] [(Po)] [PM[Mn]] [(T)] [V] [Z]. **Port.:** [(DL)].

Observaciones.–Los pliegos estudiados parecen corresponder a la var. *saurae*, con hojas en general lineares, hasta de 4 mm de anchura y espiguillas hasta de 3,2 mm. En un pliego de Alicante (MA 577219) han aparecido ejemplares con la gluma inferior vestigial, pequeña.

4. P. dilatatum Poir. in Lam., Encycl. 5: 35 (1804) [dilatátum]

Digitaria dilatata (Poir.) H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 553 (1906)
Ind. loc.: "Cette plante a été recueillie à Buenos-Ayres par Commerson. (V. s. in herb. Lam.)" [holótipo: P-LA-00745858]
Ic.: Anton & Zuloaga (eds.), Fl. Vasc. Argent. 3(1): 394 (2012); Paunero in Anales Inst. Bot. Cavanilles 20: 85 lám. 2 (1963); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 399 (1987); lám. 235 a-j

Hierba perenne, no estolonífera, con rizomas hasta de 12 mm de diámetro. Tallos 21-149 cm, hasta de 0,6 cm de diámetro; nudos 2-3 mm, obscuros. Hojas con vaina de 6-25(30) cm, las de las hojas inferiores a veces con pelos muy largos; lígula 1,5-5,5 mm, subelíptica, entera o lacerada, membranácea, con largos mechones de pelos laterales de 5-8 mm; limbo 7-38(41) × 0,7-1(1,2) cm, con nervio central marcado, a veces ancho, de color amarillento, más 5-6 nervios laterales a cada lado y otros nervios menos marcados entre medias, glabro, con pelos rudimentarios en el margen. Inflorescencia formada por (2)3-7 racimos espiciformes de 2-11 cm, en disposición alterna, con raquis en general recto, con largos pelos de 6-9 mm en la base, a veces ligeramente sinuoso, con la parte central blanquecina. Espiguillas 8-32, de 2,7-4 × 2-2,4 mm, dispuestas en 4 series, en general empizarradas, a veces abiertas, elípticas, con ápice agudo, pelosas, con pelos largos en los márgenes, con pedúnculos agrupados por pares, los interiores de 0,5-0,7 mm, los exteriores más largos, de 1,5-2 mm, alternos en el raquis. Gluma superior convexa, acuminada, del mismo tamaño que la espiguilla, con nervio central marcado y otros (2)4 laterales menos marcados, que a veces no llegan hasta el ápice, con fre-



Lám. 235.–*Paspalum dilatatum,* a) Montera del Torero, Alcalá de los Gazules, Cádiz (MA 549264); b-j) Saucelle, Salamanca (MA 292064): a) hábito; b) nudo caulinar; c) detalle de la vaina, lígula y base del limbo; d) rama de la panícula con espiguillas; e) gluma superior, en vista abaxial; f) lema, en vista abaxial; g) pálea superior, en vista adaxial; h) lodículas; i) androceo; j) gineceo). *P. urvillei,* Salobreña, Granada (MA 291992): k) hábito; l) gluma superior, en vista abaxial; m) lema, en vista abaxial; n) pálea superior, en vista adaxial; o) lodículas; p) cariopsis.

cuencia todos obscuros, de reborde con frecuencia teñido de obscuro y con pelos largos ± adpresos y enmarañados, hasta de 2 mm; la inferior falta. Lema de la flor estéril plano, recubierto en los márgenes por la gluma, con 5 nervios; lema de la flor fértil brillante, glabro. Pálea 2,2-2,4 × 2 mm, coriácea, blanquecina, brillante, glabra, con los márgenes internos doblados –con aspecto panduriforme–. Lodículas 2, de 0,3 mm. Anteras de c. 1 mm. Estigmas 1-1,4 mm, plumosos, sobresalientes. Cariopsis 1,8-1,9 × 1,5-1,6 mm, elipsoidal, de color castaño claro. 2*n* = 50.

Lugares húmedos o encharcados, herbazales, campos de labor, marjales, orillas de cursos de agua, cunetas, céspedes, indiferente edáfica; 0-700 m. (III)V-XII. Oriunda de Sudamérica, naturalizada en gran parte del mundo. Provincias litorales de la Península Ibérica, más algunas localidades en el interior, y Baleares. **Esp.:** [A] [(Ab)] [Al] [Av] [B] [Ba] [Bi] [(Bu)] [C] [Ca] [Cc] [(Co)] [Cs] [Ge] [(H)] [Hu] [L] [Lu] [M] [Ma] [Mu] [Na] [O] [Or] PM[Mn] [Po] [S] [Sa] [Se] [SS] [T] [(Te)] [V] [(Va)] [Vi]. **Port.:** [Ag] [AAl] [BAl] [BL] [DL] [E] [Mi] [R]. **N.v.,** *port.:* capim-comprido, grama-de-água, milhã-gramilheira; *cat.:* gram de fulla ampla, serreig d'arròs.

5. P. urvillei Steud., Syn. Pl. Glumac. 1: 24 (1853) [Urvíllei]

Ind. loc.: "An praecedentis var? Ex Hrbo. Urville" [la especie precedente es *P. virgatum*, en donde se indica "Am. austr. Mexico"; lectótipo designado por R. de Koning & M.S.M. Sosef in Blumea 30(2): 30 (1985): P-00745933, P-00753088, en primer paso ya que los autores no especifican el ejemplar]

Ic.: Anton & Zuloaga (eds.), Fl. Vasc. Argent. 3(1): 439 (2012); lám. 235 k-p

Hierba perenne, cespitosa, sin estolones, con rizomas cubiertos de vainas basales de color marrón, muy pelosas, con pelos largos. Tallos 98-177(200) cm, c. 1 cm de diámetro, estriados; nudos c. 1,5 mm, negruzcos. Hojas con vaina cerrada, de 17-21 cm; lígula de 4-8 mm, subelíptica o a veces lacerada, con pelos largos hasta de 7 mm; limbo 23-60 × 0,9-1,3 cm, con nervios longitudinales. Inflorescencia formada por 13-18 racimos espiciformes de 2,5-10,5 cm, los superiores más cortos, a veces arqueados hacia fuera, con raquis visible blanquecino, a veces rojizo, y dos rebordes laterales verdes, con pelos axilares hasta de 5 mm. Espiguillas 20-42, de 2,5-3 × 1,5-1,7 mm, dispuestas en 4 series, elípticas, aplanadas, agudas, pelosas en el margen, con pedúnculos de 1-2 mm, agrupados en pares, uno corto y otro largo. Gluma superior convexa, con acumen de c. 0,2 mm y 3 nervios bien marcados, con pelos marginales de más de 1 mm, en general patentes; la inferior falta. Lema de la flor estéril con el mismo aspecto que la gluma superior, pero plano, con un nervio central longitudinal y dos laterales, con largos cilios en el margen; lema de la flor fértil de la misma consistencia que la pálea, a la que recubre con su margen doblado. Pálea 1,5 mm, lisa y brillante, con los márgenes recurvos –con aspecto panduriforme–, de color crema. Lodículas 2, de 0,3 mm. Anteras de c. 1,2 mm, amarillas o cobrizas. Estigmas de algo más de 1 mm, plumosos, exertos lateralmente, de color rojo obscuro. Cariopsis 1,3-1,6 × 1-1,2 mm, elipsoidal, de color castaño claro, con cicatriz de 0,7 mm. 2*n* = 20*, 40.

Lugares húmedos, prados, campos cultivados, cunetas, etc.; 0-120 m. (III)VII-X(XII). Oriunda de Sudamérica; naturalizada en algunas regiones templadas y tropicales. Naturalizada en algunos puntos de la Península Ibérica. **Esp.:** [(Al)] [Ba] [Cs] [Gr]. **Port.:** [BL]. **N.v.:** paja boba, paja mansa, pasto bobo chico.