2 Compositae_pp1451-1589(9).qxp_Vol. XVI(3).qxd 14/1/19 17:50 Página 1489

Hierba perenne, rizomatosa. Rizoma 32-230 × 3-8 mm, ± horizontal, del que nacen los vástagos fértiles por un lado y, cuando estos ya están desarrollados, las rosetas de hojas propiamente dichas –sin estructuras reproductivas– que permanecen durante la primavera y el verano. Tallos 8-43 × 0,2-0,5 cm, escaposos, erectos, simples, estriados, con hojas escuamiformes, ± cubiertos por un indumento flocoso, blanquecino y pelos glandulíferos dispersos, con la célula apical rojiza. Hojas caulinares 9-24, de 7,1-15,9 × 1,8-5,8 mm, escuamiformes, aplicadas, ovadas, obtusas o erosas, de base truncada, no abrazadora, sésiles, cubiertas hacia la base por un indumento similar al del tallo y casi glabras hacia el ápice; hojas basales en rosetas que aparecen tras la floración, con lámina de 43-108(240) × 36-115(250) mm, de contorno redondeado y margen dentado –8-33 dientes en cada lado–, con sinuosidades angulosas delimitadas por los 8-10 dientes más prominentes, en los que rematan los nervios principales, agudas, de base acorazonada, verdes, con un indumento flocoso tempranamente caedizo por el haz, blanco-tomentosas por el envés –con algunos pelos glandulíferos dispersos–; pecíolo 48-230 mm, estriado, flocoso-tomentoso. Capítulos 24-36 mm de diámetro, solitarios, erectos en la antesis, más tarde cabizbajos. Involucro 11,3-20,9 × 18,5-27,6 mm, campanulado; brácteas 16-25, de 9,2-16,8 × 1,4-3,4 mm, linear-lanceoladas, obtusas, enteras, con margen escarioso, cubiertas hacia la base por un indumento flocoso, blanquecino, con pelos glandulíferos ± dispersos, con la célula apical rojiza y un mechón de pelos en el ápice. Receptáculo de subhemisférico a ± plano, más corto que las brácteas. Flores liguladas 130-200, de 8,8-15,5 × 0,2-0,4 mm, con un nervio, obtusas, amarillas, rojizas al secarse. Flósculos 15-41, de 6,2-13 × 1,4-2,7 mm, amarillos. Anteras 1,8-2,6 mm. Estilos 3,7-8,5 mm –en las flores liguladas–. Aquenios 2,5-4,2 × 0,4-0,8 mm, glabros. Vilano 7,5-14,4 mm. $2n = 60$.

Dunas, bordes de arroyo, zonas abiertas de bosques, taludes, cunetas y escombreras; 0-2350 m. III-VI. Casi toda Europa –aunque localizado en zonas montañosas hacia el S–, NW de África, Anatolia, Cáucaso, Siberia occidental y central y W del Himalaya; naturalizada en los Estados Unidos y el Canadá. Mitad N de la Península –aunque hacia el NW se enrarece–, más localidades aisladas en la Sierra de Cazorla, Sierra Nevada y otros puntos. **And. Esp.:** A Ab B Bi Bu Cs Cu Ge (Gr) Gu Hu J L Le Lo Lu M Mu Na O (P) S So SS T Te V Va Vi Z. **Port.:** [(Mi)]. **N.v.:** espatas, fárfara, gordolobo, matacaballo (Aragón), paso de asno, pata de asno, pata de caballo, pata de mulo, pata de vaca, patabuey, pie de caballo, pie de mulo, potas, sombrerera, tusilago, uña de asno, uña de caballo; *port.:* erva-de-São-Quirino, farfugio, farfária, tussilagem, unha-de-asno, unha-de-cavalo; *cat.:* fill abans que el pare, fill que mata el pare, fàrfara, peu de cavall, peu de mula, peu d'ase, peu d'egua, pota de bou, pota de cavall, pota de mula, pota d'egua, ungla de cavall, ungla d'ase, ungla d'ase blanca; *eusk.:* ersukaia, eztul-belarra, maldarrosa, mardarrosa, murdarrosa, zaldioin, zorne belarra; *gall.:* uña de cabalo.

74. **Petasites** Mill.*

[Petasítes, -ae m. – gr. ἡ πετασῖτις (ίτης), -ιδος, "como un pétaso" : ὁ πέτασος, pétaso. Dioscórides, De Mat. Med. (ed. M. Wellmann 4, 107) nombró así una planta medicinal con largos y gruesos pecíolos de los que, cual hongos, pendían grandes hojas en forma de pétaso. Su identidad, se trata de *Tussilago petasites* L., ha estado clara desde muy antiguo y el nombre ha sido utilizado para designar esta planta y otras consideradas afines –v.gr., C. Bauhin, Pinax: 197 (1623)– y para nombrar el género homónimo de

* L. Villar

74. Petasites

J.P. de Tournefort, Élém. Bot. 1: 357-358, 3: pl. 258 (1694), Inst. Rei Herb.: 451 (1700), validado más tarde por Ph. Miller, Gard. Dict. Abr. ed. 4: [1056] (1754). A.Q.]

Hierbas perennes, rizomatosas, monoicas aunque en general funcionalmente dioicas, inermes; rizoma ± lignificado, tan grueso o más que los tallos, geniculado o al menos engrosado hacia la base del tallo. Tallo erecto, simple, folioso, cilíndrico, finamente estriado, peloso o glabrescente. Hojas alternas, indivisas; las basales ± largamente pecioladas, orbicular-cordiformes, reniformes o remotamente triangulares, con lóbulos basilares solapados, paralelos o divergentes, de nervadura pinnada con 3-5(7) pares de nervios principales que parten del nervio medio, margen dentado o sinuado-dentado, con pecíolo alado o sin alas, levemente abrazador del tallo; las caulinares escuamiformes, sésiles, semiamplexicaules –las más inferiores pueden ser rudimentarias–. Inflorescencias paniculiformes o racemiformes, en tirso. Capítulos numerosos, disciformes o radiados, heterógamos. Involucro cilíndrico o campanulado, con 1 o 2 series de brácteas herbáceas, subiguales, agudas u obtusas, ± lanceoladas, de margen entero, pelosas o glabras, con 2-4 brácteas suplementarias. Receptáculo ± plano, foveolado, sin páleas, glabro. Flores hermafroditas funcionalmente masculinas –con estambres fértiles y pistilos estériles–, regulares, de corola tubular-campanulada, quinquedentada. Flores femeninas –poseen únicamente pistilos fértiles– de corola estrechamente tubular, con la boca truncada, rematada por algunos dientes subiguales –en especies extraibéricas puede ser bilabiada, con los labios laciniados–, no sacciforme, glabra, rojiza, rosa violácea, blanquecina o –fuera del ámbito– amarilla. Anteras ± conniventes, con el conectivo provisto de un ápice cuspidado, 2 costillas longitudinales bastante salientes y base ± obtusa, sin apéndices; filamentos libres. Estilo ± claviforme, en las flores hermafroditas funcionalmente masculinas terminado en 2 ramas ± profundas, divergentes o convergentes; en las flores femeninas terminado en 2 ramas ± lineares cortas. Aquenios homomorfos, subcilíndricos o ± fusiformes, con c. 8 costillas pocos marcadas. Vilano formado por pelos escabriúsculos, de longitud 2 o más veces la del aquenio. $x = 10, 14, 16, 26, 28, 29, 30, 40$.

Observaciones.–El género *Petasites* alberga c. 20 especies distribuidas por el hemisferio norte: Europa, N de África, Asia y Norteamérica, si bien falta en Groenlandia. Siguiendo a J. Toman in Folia Geobot. Phytotax. 7: 381-406 (1972) y a W. Greuter in Greuter, Burdet & G. Long (eds.), Med-Checklist 2: 551-552 (2008), en el territorio de *Flora iberica* estarían representados el subgénero *Petasites* cuyas flores femeninas son aliguladas, con la boca del tubo corolino truncada o laciniada *(P. hybridus* y *P. paradoxus),* y el subgénero *Nardosmia* Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. ed. 2, 34: 186 (1825), cuyas flores femeninas son claramente liguladas, con limbo de 1 a 9 mm de longitud y anchura 2 o más veces la del tubo *(P. pyrenaicus)*.

Petasites albus **(**L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 406 (1791) [*Tussilago alba* L., Sp. Pl.: 866 (1753), basión.], planta europeo-caucásica con brácteas de la inflorescencia lineares, flores blanquecinas o blanco-amarillentas, con las ramas estilares profundamente divididas –casi hasta la base–, hojas basales verdes, con el limbo ± orbicular-reniforme, de contorno ± anguloso –lóbulos ± triangulares, solapados,

agudos, poblados a su vez de dientes agudos– y envés tomentoso-grisáceo, fue citada por Willkomm & Lange [cf. Prodr. Fl. Hispan. 2: 29 (1865)] de la "región montana de Cataluña", según testimonio de Cutanda. Luego, el propio H.M. Willkomm [cf. Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 74-75 (1893)] negó dicho testimonio. La especie no se ha vuelto a ver ni recolectar.

Por su valor ornamental, algunas especies extraibéricas se usan en jardinería aunque no hayamos visto testimonios en los herbarios. En el herbario BC se conserva un pliego de Sennen de principios del siglo XX etiquetado como "P. giganteus F. Schmidt" [probablemente *P. japonicus* (Siebold. & Zucc.) Maxim.] procedente de "Castromonte, Castille" [Valladolid], sin más datos posteriores, aunque la especie se considera introducida en Europa. Otras especies del género (v.gr., *P. pyrenaicus* y *P. hybridus)* han sido introducidas y se han naturalizado en la Península, así como en otras localidades europeas de donde no son originarias.

Bibliografía.–J. TOMAN in Folia Geobot. Phytotax. 7: 381-406 (1972).

Clave para ejemplares en estado vegetativo

1. Hojas coetáneas de las flores; las del tallo escuamiformes, la más inferior de ellas envainadora; limbo foliar reniforme, de margen regularmente dentado ..... **3. P. pyrenaicus**
– Hojas subsiguientes a las flores; las del tallo semiamplexicaules, pero no envainadoras; limbo foliar orbicular-cordiforme, subreniforme o cordiforme-subtriangular, de contorno sinuado-dentado o ± anguloso 2
2. Hojas ± aparasoladas, de limbo orbicular-cordiforme, con el envés finamente araneoso-grisáceo; pecíolo fistuloso, doblemente alado en su parte adaxial ..... **1. P. hybridus**
– Hojas no aparasoladas, de limbo subtriangular-reniforme, con el envés recubierto por un fieltro grueso, tomentoso-níveo; pecíolo macizo, suavemente acanalado en su parte adaxial, pero sin alas ..... **2. P. paradoxus**

Clave para ejemplares en estado reproductivo

1. Flores periféricas del capítulo cortamente liguladas; inflorescencia ± laxa, formada por no más de 10(20) capítulos; hojas caulinares 2-7, escuamiformes, la más inferior de ellas con limbo rudimentario, envainadora ..... **3. P. pyrenaicus**
– Todas las flores –periféricas y centrales– tubulares o tubular-campanuladas; inflorescencia densa, por lo general con más de 10 capítulos –hasta 100(130)–; todas las hojas del tallo escuamiformes, semiamplexicaules 2
2. Capítulos (16)25-100(130); brácteas del involucro glabras; flores rojizas o de un rosa violáceo ..... **1. P. hybridus**
– Capítulos 10-20(25); brácteas del involucro peloso-glandulosas; flores rojizas, rosadas o blanquecinas ..... **2. P. paradoxus**

1. P. hybridus (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., Oekon. Fl. Wetterau 3(1): 184 (1801) [hýbridus]

Tussilago hybrida L., Sp. Pl.: 866 (1753) [basión.]
Tussilago petasites L., Sp. Pl.: 866 (1753)
P. officinalis Moench, Methodus: 568 (1794), nom. illeg.

2 Compositae_pp1451-1589(9).qxp_Vol. XVI(3).qxd 14/1/19 17:40 Página 1492

74. Petasites

Ind. loc.: "Habitat in Germania, Hollandia" [lectótipo designado por K.H. Rechinger in Rech. fil. (ed.), Fl. Iran. 164: 43 (1989): LINN]
Ic.: H.E. Hess & al., Fl. Schweiz 3: 469 (1980); Rothm., Exkursionfl. ed. 8: 503 (1991)

Hierba perenne, rizomatosa, pubescente o peloso-glandulosa; rizoma horizontal, grueso, cundidor, de cuyos nudos engrosados nacen hojas en roseta o tallos fértiles, así como raíces fibrosas, ± carnosas. Tallos de 20-40 cm en la floración y hasta de 100 cm en la fructificación, erectos, simples, fistulosos, finamente asurcados, tomentoso-lanosos –sobre todo en la parte apical–, sin pelos glandulíferos, con 6-38 hojas caulinares –6-21 en los pies funcionalmente masculinos y 17-38 en los femeninos–, escuamiformes, semiamplexicaules, dispuestas en espiral, lanceoladas, de un rosado purpúreo, tomentoso-lanosas o glabrescentes, las medias de 4-5 × 1 cm, las inferiores progresivamente mayores y envainadoras. Hojas basales radicales subsiguientes a las flores, largamente pecioladas, ± aparasoladas, con lámina de 10-25 × 17-42 cm, orbicular-cordiforme o subreniforme, ± angulosa, con los lóbulos basilares redondeados, el seno profundo y el margen dentado –dientes de 1-3 mm–, ± verdes y glabrescentes por el haz, finamente araneoso-grisáceas por el envés; pecíolo de 10-32 cm y vaina de 4-6 cm, con pelos lanosos y pelos tectores pluricelulares de c. 1 mm, doblemente alado por el haz. Inflorescencias en tirso oblongo-ovoide, con las ramas basales de 15-50 mm. Capítulos (16)25-100(130) –16-55 en pies funcionalmente masculinos, 25-130 en los femeninos–, de 7-8 × c. 10 mm en los pies funcionalmente masculinos y de 3-4 × c. 5 mm en los femeninos. Involucro con brácteas de (3)4-8 × 2-3 mm, dispuestas en 2(3) series, lanceoladas, rojizo-purpúreas, glabras, sin glándulas. Receptáculo desnudo, alveolado. Flores flosculosas rojizas o de un rosa violáceo; las funcionalmente masculinas –con el pistilo reducido y estéril– c. 15, con corola regular de c. 10 × 2-3 mm, tubular-campanulada, con dientes de c. 2 mm; las femeninas –pistiladas– c. 50, estrechamente tubulosas, de c. 10 × 0,2 mm, con la boca irregularmente denticulada. Anteras de c. 2 mm, con las costillas del conectivo rosadas. Estilos c. 10 mm, ± exertos, con estigma de 1-1,5 × 0,5 mm, claviforme, con 2 ramas más cortas que la anchura total del propio estigma. Aquenio 2-3 × 0,2 mm, ± fusiforme, con 5-10 costillas poco marcadas. Vilano 5-6 mm, blanco-dorado. $2n = 60$*.

Orillas de arroyos, terraplenes y cunetas en terrenos relativamente húmedos; 1100 m. IV. Europa central y meridional, alcanzando Anatolia; además se ha introducido en Dinamarca, Islandia y Norteamérica. Muy rara en el cuadrante NW de la Península Ibérica. **Esp.:** P. **N.v.:** sombrerera, tusílago mayor; *cat.:* barretera, pota de caball; *eusk.:* txapel-belarra.

Observaciones.–En Armenia, Irán y sur de Rusia (Transcaucasia, Daghestán) hay poblaciones de flores amarillas o amarillentas, y aunque en algunos casos se han tratado como subespecies distintas, según W. Greuter in Greuter, Burdet & G. Long (eds.), Med-Checklist 2: 551-552 (2008) cabe dudar de su valor taxonómico.

La cita antigua de J. Cadevall, Fl. Catalunya 3: 209 (1913-1937) basada en recolecciones de Costa en Vallvidrera y Sarriá (Barcelona) no ha podido ser confirmada; de hecho, O. de Bolòs & J. Vigo [cf. Fl. Països Catalans 3: 833 (1996)] consideran que podría tratarse de una confusión. Fue citada también de forma inconcreta para los "Montes de Burgos" [cf. Willkomm & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 28-29 (1865)], aunque no ha vuelto a ser encontrada en la provincia [cf. Alejandre & al. (eds.), Atlas Fl. Burgos: 227 (2006)]. Asimismo, Coutinho la indica como dudosa del Alto Minho [cf. Fl. Portugal: 637 (1913)], si bien no se ha vuelto a citar para Portugal. Entonces, su presencia en la Península viene atestiguada por recientes hallazgos en Lores y Guardo (Palencia) [cf. B. Aru & al. in Acta Bot. Malac. 33: 311 (2008) y A. Ruiz de Gopegui & A. Ruiz in Acta Bot. Malac. 37: 192 (2012)]. Al parecer, la planta

2 Compositae_pp1451-1589(9).qxp_Vol. XVI(3).qxd 14/1/19 17:50 Página 1493


está en expansión y convendría el seguimiento de esas poblaciones con el fin de verificar o desmentir su carácter silvestre.

En todo caso, esta especie se ha cultivado fuera de su área natural tanto por su valor ornamental como por sus virtudes medicinales y homeopáticas. Contiene inulina, resinas, mucílago y taninos; fuera de nuestro ámbito se usa como astringente, diurética, emenagoga, expectorante, sudorífica y vulneraria; además, antiguamente se utilizó contra la peste [cf. Delaveau & al., Secrets Pl. Médic. ed. 2: 234 (1985)].

2. P. paradoxus (Retz.) Baumg., Enum. Stirp. Transsilv. 3: 94 (1817) [paradóxus]

Tussilago paradoxa Retz., Observ. Bot. 2: 24 (1781) [basión.]
Ind. loc.: [no indicada de forma expresa]
Ic.: Retz., Observ. Bot. 2, tab. III (1781) [sub *Tussilago paradoxa*]; Rothm., Exkursionsfl. 3: 503 (1991); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 296 (2001); lám. 274

Hierba perenne, rizomatosa, nívea, con tomento araneoso y pelos glandulíferos; rizoma horizontal de (3)10-30 × 0,5-1,5 cm, lignificado, cundidor, ± cubierto de restos foliares, nada engrosado en los nudos, del que nacen raíces fibrosas hasta de 13 cm, tallos fértiles y rosetas de hojas. Tallos hasta de 30 cm en la floración y 60 cm en la fructificación, erectos, simples, fistulosos, finamente asurcados, recubiertos de un tomento blanco araneoso, sobre todo en la parte apical –donde se suman algunos pelos glandulíferos–, rosado-violáceos, con 7-15 hojas caulinares escuamiformes, lanceoladas, semiamplexicaules, dispuestas en espiral, ± pardo-rojizas o violáceas, araneosas o glabrescentes, las medias de 4-5 × c. 1 cm, las inferiores progresivamente mayores y envainadoras. Hojas basales vegetativas –subsiguientes a las flores–, largamente pecioladas, no aparasoladas, con lámina de 10-25 × 17-42 cm, plana, con 3-5(7) pares de nervios laterales y nervadura reticulada, de contorno triangular-reniforme u ovado-cordiforme, con lóbulos basilares ± angulosos, divergentes y escotadura amplia, ribeteada por un nervio fuerte, de margen sinuado-dentado –dientes de 1-3(5) mm, con punta cartilaginosa–, ± anguloso, con el haz verde obscuro, glabrescente salvo en los nervios tomentoso-lanosos y el envés cubierto por un fieltro lanoso-níveo; pecíolo de 20-40(60) cm, con el nervio suavemente acanalado, no alado, tomentoso-níveo, y la vaina violácea de 2-4 cm. Inflorescencias de los pies funcionalmente masculinos en tirso ± ovoide, con ramas basales de c. 3 cm, araneoso-níveas; las de los pies funcionalmente femeninos en tirso oblongo-ovoide, que se alarga y se torna laxo en la fructificación, con ramas basales hasta de 5 cm, salpicadas de hojitas lineares. Capítulos 10-20(25), cilíndricos, de c. 15 × 8 mm en los pies funcionalmente masculinos y de c. 7 × 5 mm en los pies funcionalmente femeninos. Involucro con brácteas linear-oblongas, de 8 mm en los pies funcionalmente masculinos y de 5,5 mm en los pies funcionalmente femeninos, dispuestas en 2 o 3 series, desiguales, ± obtusas –las externas son acuminadas y más cortas que las internas–, rosado-rojizas con el margen escarioso, pobladas de pelos glandulíferos y ± blanco-araneosas. Flores flosculosas rojizas, rosadas o blanquecinas; las funcionalmente masculinas –de pistilo reducido y estéril–, con corola de 10-12 × 2 mm, regular, tubular-campanulada, con 5 dientes de 1,5-2 mm; las femeninas –pistiladas– c. 50(60), estrechamente tubulares, de c. 10 × 0,2 mm, con la boca provista de 5 dientes. Anteras



Lám. 274.–*Petasites paradoxus*, a, c, i-k) Bielsa, Pineta, Huesca (JACA 274593); b) ibídem (JACA 16793); d-h) ibídem (JACA 15592); l-o) ibídem (JACA 25891): a) hábito en la floración; b) hábito en estado vegetativo (postfloración); c) fragmento del tallo fistuloso; d) capítulo de flores hermafroditas; e) bráctea de un capítulo en la floración; f) detalle del indumento de las brácteas; g) flor hermafrodita funcionalmente masculina; h) parte apical de la corola abierta de una flor hermafrodita, con detalles del androceo y el estigma; i) flor femenina; j) corola de una flor femenina; k) detalle del estigma; l) capítulo en la fructificación; m) bráctea de un capítulo en la fructificación; n) aquenio con vilano; o) aquenio con la base del vilano.

2 Compositae_pp1451-1589(9).qxp_Vol. XVI(3).qxd 14/1/19 17:40 Página 1495

c. 2,5 mm, ± lineares, con las costillas del conectivo rosadas o violeta purpúreas. Estilos exertos –sobresalen 2-4 mm y desbordan el capítulo– y estigma de 2 × 0,5 mm, oblongo-lanceolado o linear, dividido hasta 2/3 de su longitud en 2 ramas paralelas o divergentes. Aquenio 3-4 × 0,5-1 mm, ± fusiforme, con 5-10 costillas poco marcadas. Vilano 5-8(9) mm, blanco. $2n = 60$*.

Terrenos pedregosos expuestos, calizos o más rara vez arcillosos, relativamente húmedos en primavera, taludes, etc.; (800)1100-2450 m. IV-VI(VI). Pirineos, Alpes y Montes Velebit (Croacia). Parte central de los Pirineos, desde el Monte Perdido hasta la Serra del Cadí, con puntos aislados al W en el Alto Roncal (Navarra) y al E en la Cerdaña (Gerona). **Esp.:** (B)? (Ge) Hu L Na.

Observaciones.–A. Ruiz de Gopegui y Y. Ruiz [cf. Acta Bot. Malac. 37: 192 (2012) citaron esta especie de Guardo (Palencia), pero revisado el pliego correspondiente (LEB 104967) podemos afirmar que se trata de *P. hybridus*.

3. P. pyrenaicus (L.) G. López [pyrenáicus]
in Anales Jard. Bot. Madrid 42: 323 (1986)

Tussilago pyrenaica L. in Loefl., Iter Hispan.: 304, 61 (1758) [basión.]
P. fragrans (Vill.) C. Presl., Fl. Sicul.: 28 (1826)
Ind. loc.: "… he adquirido un hermoso herbario de los Pireneos, que constará de cien yerbas recogidas por el Dr. Barnades…" [Traducción de Asso in Anales Ci. Nat. 5(13): 86-88 (1802)]
Ic.: H. Hess & al., Fl. Schweiz 3: 469 (1980) [sub. *P. fragrans*]

Hierba ± rizomatosa; rizoma cundidor hasta de 13 cm o más, no engrosado en la parte superior, con raíces filiformes de 3-5 cm, del que salen hojas y tallos floridos coetáneos. Tallos 10-30(40) cm, simples, erectos, con 2-7 hojas caulinares de c. 5 × 1 cm, escuamiformes, ovado-lanceoladas, acuminadas, las inferiores con el limbo rudimentario y netamente envainadoras, con vaina de 2-4 × 1,5-2 cm. Hojas basales coetáneas de las flores, con lámina de 5-20 cm de anchura, orbicular-cordiforme, con lóbulos basilares redondeados, ± coriácea, regularmente dentada –dientes de c. 1 mm, mameliformes–, con un nervio central y 3 pares de nervios laterales, verde por ambas caras, glabrescente por el haz, ± pubescente-araneosa por el envés –con pelos articulados–; pecíolo (11)22-24(30) cm, igualmente peloso. Inflorescencia racemiforme en tirso laxo. Capítulos 6-10(20), de 7-11 × 15(20) mm. Involucro con 14-18 brácteas, de c. 10 × 2 mm, dispuestas en una sola serie, subiguales, lanceolado-lineares, verdes con tintes violáceos, pubescente-glandulosas sobre todo en la base. Flores flosculosas de color violáceo no muy intenso, con olor a vainilla; las funcionalmente masculinas –de pistilo reducido y estéril– con el estigma de c. 2 mm, elongado-cilindráceo, terminado en punta y bífido –con 2 ramas de longitud menor o ± igual a la anchura–; las femeninas situadas en la periferia del capítulo, cortamente liguladas, con el limbo oval u oblongo-obovado, de 4-6 × c. 1,5 mm. Aquenios 1,5-2 × 0,5-1 mm, fusiformes, con 6-8 costillas poco marcadas. Vilano 5-8 mm, blanco. $2n = 52$*, 60.

Orillas de arroyos, terrenos húmedos y sombríos, taludes, muchas veces cerca de lugares habitados; 0-800(1400) m. (IX)XII-III. Región Mediterránea occidental (Italia, Libia, Túnez y Argelia); introducida hace varios siglos, escapada o naturalizada aquí y allá en Europa meridional, central e Islas Británicas, así como en las Azores. Dispersa por varios puntos de la Península Ibérica. **Esp.:** [Al] [B] [Ge] [L] [O] [Or] [PM[Mll]] [Po] [S] [SS] [T] [(V)] [Vi]. **Port.:** [(BB)] [BL] [E]. **N.v.:** sombrerera, uña del diablo; *port.:* sombreiro; *cat.:* barretera, pota de cavall; *gall.:* sombreiro.