

ПАКЛІТАКСЕЛ




Як працює цей препарат?

Паклітаксел блокує розмноження ракових клітин на етапі поділу однієї клітини на дві нові.

Коли застосовується?

Може використовуватися самостійно або в комбінації з іншими препаратами при таких захворюваннях:

Рак грудної залози	Рак стравоходу
Недрібноклітинний рак легені	Рак шлунка
Дрібноклітинний рак легені	Рак голови та шиї
Рак яєчників	Карцинома тимусу
Рак ендометрію	Саркоми м'яких тканин
Рак шийки матки	Меланома та інші раки шкіри
Рак анального каналу	Анапластична карцинома щитоподібної залози
Рак статевого члена	Карцинома невідомого первинного походження
Рак сечового міхура	



Спосіб введення

- Паклітаксел вводиться внутрішньовенно крапельно протягом 1 чи 3 годин.
- При щотижневому застосуванні тривалість введення становить 1 годину, а доза препарату є меншою.
- При використанні схеми лікування, що повторюється один раз на два тижні (інтенсивний режим) або один раз на три тижні (стандартний режим), доза препарату є більшою, а тривалість інфузії становить 3 години.

- Кількість курсів та режим введення залежать від діагнозу, стадії та протоколу лікування. Дотримуйтесь рекомендацій, наданих вашим лікарем!
- **Паклітаксел повинен вводитися лише через інфузійну систему із вбудованим мембранним фільтром.** Зверніть увагу: в деяких медичних закладах такі фільтри можуть не використовуватись. Обов'язково уточніть у свого лікаря або медичного персоналу, чи передбачено застосування фільтра під час інфузії — це критично важливо для безпеки лікування



Обов'язково повідомте лікаря перед початком лікування, якщо:

- у вас є алергія на паклітаксел, будь-які речовини, що входять до його складу, інші лікарські засоби, харчові продукти тощо;
- ви приймаєте інші лікарські засоби, вітаміни чи харчові добавки (за потреби лікар може змінити їхнє дозування);
- маєте супутні хронічні захворювання;
- годуєте дитину грудьми (під час лікування паклітакселом грудне вигодовування заборонене);
- ви вагітні або плануєте вагітність (паклітаксел протипоказаний під час вагітності, оскільки може зашкодити плоду);
- плануєте оперативне втручання або інвазивні стоматологічні процедури.

Чи потрібно дотримуватися спеціальної дієти під час прийому паклітакселу?

Не потрібно, продовжуйте звичне для вас харчування.

Можливі побічні ефекти лікування

нейтропенія (низький рівень нейтрофілів у загальному аналізі крові);	анемія (проявляється задишкою, блідістю шкіри);	стоматит;
підвищений ризик інфекційних захворювань (можливі симптоми: підвищення температури тіла, озноб, тремтіння, головний біль тощо);	синці, носові кровотечі, кровоточивість ясен;	випадіння волосся (як правило, волосся відростає після завершення лікування);

алергічні реакції (висип, свербіж, почервоніння обличчя, зниження артеріального тиску);	периферичні полінейропатії — відчуття оніміння або поколювання в руках і ногах (є типовим тимчасовим побічним ефектом, але іноді зберігається навіть після завершення лікування);	біль у суглобах і м'язах;
токсичне ураження печінки;	діарея;	порушення зору (сухість очей, зниження гостроти зору, поява дефектів поля зору).
втома;	нудота або блювання;	
Частота виникнення, інтенсивність та тривалість побічних ефектів є індивідуальною.		

Поради під час лікування паклітакселом:



ретельно мийте руки, уникайте контакту з людьми, що мають інфекційні хвороби;



для покращення самопочуття — займайтеся спортом або регулярно ходіть пішки;




у випадку підвищеної кровоточивості використовуйте м'яку зубну щітку, електробритву;



у випадку діареї та/або блювання вживайте велику кількість рідини та використовуйте симптоматичні протидіарейні та протинудотні засоби за призначенням лікаря;



обмежте вживання жирної та смаженої їжі, уникайте переїдання, адже це може посилити відчуття нудоти.



Коли необхідно зв'язатися з лікарем?

Повідомте свого лікаря або зверніться за невідкладною медичною допомогою, якщо у вас є будь-які з наведених нижче симптомів:

- **Ознаки алергічної реакції:** висип, почервоніння, набряк або свербіж шкіри, відчуття стиснення в грудях чи глотці, задишка, порушення ковтання, незвичайна охриплість або набряк рота, обличчя, губ, язика або глотки.
- **Ознаки інфекційного захворювання:** лихоманка (температура тіла > 38,0 C), озноб, біль у глотці, вусі чи носових пазухах, кашель, виділення значної кількості мокротиння або зміна кольору мокротиння, біль чи відчуття печіння під час сечовипускання, виразки в ротовій порожнині.

- **Ознаки кровотечі:** блювання темним вмістом з домішками яскраво-червоної крові, кашель з кров'ю, домішки крові в сечі, випорожнення чорного кольору, кровотеча з ясен, аномальна вагінальна кровотеча, поява синців на шкірі без причини.
- **Ознаки зміни артеріального тиску:** інтенсивний головний біль, запаморочення, непритомність, раптове порушення зору.
- **Ознаки пошкодження нирок:** зміна кількості виділеної сечі, поява крові у сечі, поява набряків.
- **Ознаки пошкодження печінки:** потемніння сечі, світлий або безбарвний кал, пожовтіння шкіри або очей.
- **Окрім вищезазначених,** тривожними симптомами також є поява задишки, біль у грудній клітці, занадто швидке або повільне чи аритмічне серцебиття, судоми.



Важливо

- Лікування паклітакселом може призвести до безпліддя. Якщо плануєте вагітність, поговоріть зі своїм лікарем та розгляньте можливість кріоконсервації сперми чи яйцеклітин до початку лікування.
- Паклітаксел може зашкодити внутрішньоутробному розвитку плода. Вагітність під час лікування та протягом 6 місяців після його завершення не рекомендується. Перед початком лікування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем щодо ефективних та безпечних методів контрацепції.
- Грудне вигодовування під час лікування паклітакселом протипоказане.
- Якщо вам необхідне обстеження або лікування з приводу іншого захворювання, обов'язково повідомте медичних працівників про проходження хіміотерапії. Це особливо важливо при відвідуванні стоматолога.
- Якщо плануєте вакцинацію, обговоріть це з лікарем-онкологом. Деякі вакцини можуть бути недостатньо ефективними під час активної хіміотерапії.

Список використаної літератури

-  [Paclitaxel \(with polyoxyethylated castor oil\) Injection | MedilinePlus](#)
-  [Paclitaxel | Cancer Research UK](#)
-  [Paclitaxel | National Cancer](#)
-  [Paclitaxel \(conventional\): Drug information | UpToDate](#)
-  [Фармакологічне лікування раку молочної залози | Global Medical Knowledge Alliance](#)

Ця узагальнена інформація є обмеженим викладом відомостей про лікарські засоби, їх використання та можливі побічні ефекти. Викладена інформація не включає всю інформацію про стан, ліки, побічні ефекти або ризики, які можуть стосуватися конкретного пацієнта. Не призначена як заміна консультації лікаря.