


විසිතුරු ජලජ පැළෑටි වගාව



හැඳින්වීම

විසිතුරු ජලජ පැළෑටි වල භාවිත
විසිතුරු ජලජ පැළෑටි වල වැදගත්කම





විසිතුරු ජලජ පැළෑටි වල හාපිත

- මින් මැදුරු සඳහා
- පොකුණු අලංකරණයට
- දිය ඇලි සඳහා
- අහස්නිතර ගෘහ අලංකරණයට







For Water Fountains



For Ponds



For Waterfalls

මත්ස්‍ය ටැංකියක විසිතුරු ජලජ පැළෑටි වල වැදගත්කම



- අලංකරණය සඳහා භාවිතයට
- සෙවණ සහ ආරක්ෂාව සැපයීම
- ආහාර සැපයීම
- අභිජනනය සඳහා වැදගත් වීම
- ඔක්සිජන් ප්‍රභවයක් වීම
- ප්‍රදයේ තත්වය වැඩිදියුණු කිරීම
- ස්වාභාවික පරිසරයට ආසන්න
පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම

- ලංකාවේ හිතකර දේශගුණික තත්වය වගාවට සුදුසු වේ
- ජලජ පළාතට වගාවට සීමිත පිරිසක් දැනට යොමුව ඇත
- එයින් බහුතරය ස්වාභාවික පරිසරයෙන් පැළෑටි එකතු කරන්නන්ය
- එය පරිසරයට කරන හානියක් බැවින් එසේ ලබාගන්නා පැළ අපනයනය තහනමිය

ස්වභාවික පරිසර පද්ධති වලින් ජලජ පැළෑටි
ඉවත් කිරීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කෙරුණ ද
තවත් තුල වගා කර ප්‍රචාරණයෙන් ලබා ගන්නා
ජලජ ශාක අපනයනය කිරීමට අවසර ලැබේ.

වගා කටයුතු පිළිබඳව වන සංරක්ෂණ
දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දිය යුතුය

විවිධත්වය සහ වර්ගීකරණය

1. පරිණාමික ලක්ෂණ
2. වර්ධන විලාශය
3. වර්ධනය සඳහා යෝග්‍ය ආලෝක තත්වය


පරිණාමික ලක්ෂණ අනුව

□ ඇල්ගී

□ කලල ශාක

□ මිඩිනා

□ උසස් ශාක





වර්ධන විලාශය සලකා වර්ගීකරණය

- **පාවෙමින් වැටෙන ශාක (Floating Plants)**
- **සම්පූර්ණයෙන් ගිලී වැටෙන ශාක (Submerged Plants)**
- **මතුපිට වැටෙන ශාක (Emersed Plants)**
- **උභයජීවී ශාක හෙවත් වතුර ශාක (Terrarium Plants)**

චර්චනය සඳහා යෝග්‍ය ආලෝක තත්වය සලකා



- සම්පූර්ණ සුර්යාලෝකය ඇති විට
වැඩෙන ශාක**
- මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ හිරු එළිය ඇති විට
වැඩෙන ශාක**
- අ ආලෝක තත්ව යටතේ වැඩෙන ශාක**

ශාක නාමකරණය

යම් ශාකයක් නම් කිරීමට සාමාන්‍ය නම
(Common Name) භාවිතා කළ විට එය,
හාමාව අනුව
ප්‍රදේශ අනුව
රටවල් අනුව විවිධ වේ

ශාක නාමකරණය සඳහා
ද්විපද නාමකරණයක් කාල් ලිනේයස් නැමැත්තා ඉදිරිපත්
කරන ලදී
උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමය ලෙස එහිදී
ඝණ නාමය මූලික
විශේෂ නාමය දෙවනුවත් යෙදේ

උදා- *Echinodorus amazonicus*



ඝණ නාමය විශේෂ නාමය

Echinodorus amazonicus
Echinodorus amazonicus


***Alternanthera* sp.**



***Anubias* sp.**



Aponogeton sp.



Bolbitis

Cabomba

Ceratophyllum



Ceratopteris



Cardamine



Crinum



Cryptocoryne sp.



Amazon Sward



Water Wistaria



Ketala



Lilaeopsis



Ludwigia



Microsorium



Myriophyllum



Rotala



Vallisneria



Bacopa



ජලජ ශාක ප්‍රචාරණය

ප්‍රචාරණ ක්‍රම එකිනෙකට වෙනස් වේ

ඇල්ගී - ඛණ්ඩනය මූලිකව

කලල ශාක - ඛණ්ඩනය මූලිකව

පරිණාංග ශාක - බිජානු මගින් පත්‍ර යටි පැත්තේ

ආවෘත බිජක ශාක - ලිංගික ප්‍රචාරණය - බිජ

අලිංගික ප්‍රචාරණය,

ධාවක මගින්

අතු කැබලි මගින්

රයිසෝම මගින්

පුප් වෘන්ත (Flower Stalk)

පටක රෝපණය

ලිංගික ප්‍රචාරණය

බීජ හෝ බීජාණු මගින්,

ලිංගික ප්‍රජනනයෙන් හට ගන්නා බීජ හෝ බීජාණු මගින් නව ශාක ලබාගත යුතුව ඇත. උසස් ශාක වල බීජද මීවණ වැනි පහත් ශාක වල බීජාණු ද ප්‍රචාරණය සඳහා යොදා ගැනේ.

උදා: *Alternantera* sp.

Aponogeton sp.

Marselia sp.

Ceratopteris sp.

අලිංගික ප්‍රචාරණය

ධාවක මගින් උදා- *Hydrocotyle verticillata*
Marsilea

අතු කැබැලි මගින්- ඔහුතරයක් මෙමගින් ප්‍රචාරණය
කෙරේ.

Hygrophila sp.

Bacopa sp.

Ludwigia sp.

රයිසෝම මගින් *Cryptocoryne* sp.

Lagenandra sp.

Sagittaria sp.

පුපු වෘන්ත මගින් - *Echinodorus* sp.

පුපු වෘන්ත පසට සවිවි නව පැළ සෑදේ.

පටක රෝපණය

සෑම සජීවී ශාක සෛලයකටම එම ශාකය හා සමාන පැළ බිහි කිරීමේ හැකියාව ඇත

මෙම මූල ධර්මය උපයෝගී කරගෙන පටක රෝපණ තාක්ෂණය ඇති වී තිබේ

ශාකයක කොටසක් කෘතිම මාධ්‍යයක් තුළ පාලනය කරන ලද තත්ව යටතේ, (ආලෝකය, උණුත්වය, ආර්ද්‍රතාවය) විෂ බීජ වලින් තොර පරිසරයක රෝපණය කිරීම සිදුවේ

මෙහිදී සෛලයක් උදා- පරාග

**පටකයක් උදා- පත්‍ර කොටසක්, අග්‍රස්ථ
විභාජක කොටසක්**

අවයව - ඩිජ යොදාගත හැක

**අප යොදා ගන්නා කෘත්‍රීම මාධ්‍ය තුල ශාක
වර්ධනයට අවශ්‍ය සියළු පෝෂණ සංඝටක
අඩංගු කළ යුතු වේ**



පටික රෝපණයේ අවධි

- 1. ස්ථාපනය කිරීම**
- 2. ගුණනය කිරීමේ අවධිය**
- 3. මුල් ඇද්දවීමේ අවධිය**
- 4. දැඩි කිරීමේ අවධිය**
- 5. ජලජ පැළෑටි ක්ෂේත්‍රයේ භාවිතය**



**වගාවිම් සැකසීම සහ
වගාවේදී අනුගමනය
කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග**

වගාබිම සඳහා සුදුසු ස්ථානයක් තේරීමේදී සැලකිය කරුණු

- ☐ පිහිටීම
- ☐ ඉඩමේ වටිනාකම
- ☐ දේශගුණය
- ☐ භූ විෂමතාවය
- ☐ හොඳ තත්වයේ ජල සැපයුමක් / ජල ප්‍රභවයක් පැවැතීම
- ☐ සෘජු සූර්යාලෝකය ලැබෙන හෝ අවට සෙවණ දෙන ගස් නැතිවීම
- ☐ පස් වල තත්වය
- ☐ විදුලි බලය, දුරකථන පහසුකම් හා ප්‍රවාහන පහසුකම් සහිත වීම
- ☐ වගාව සඳහා අවශ්‍ය කෘෂි රසායන ද්‍රව්‍ය, පොහොර හා අනෙකුත් දෑ පහසුවෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව පැවැතීම
- ☐ ශ්‍රමිකයින් ලබා ගැනීමේ පහසුව
- ☐ යාබදව පිහිටි ඉඩම්වල ස්වාභාවය

ජලජ පැළෑටි තවානක තිබිය යුතු **ප්‍රධාන කොටස්**

- 1. මව් ශාක එකතුව**
- 2. ප්‍රචාරණය සඳහා සූදානම් කරන ස්ථානය**
- 3. නිෂ්පාදන ඒකකය**
- 4. මුල් ඇද්දවිමේ ටැංකි**
- 5. ඇසුරුම් ඒකකය**
- 6. ශාක නිරෝධායන ඒකකය**

ජලජ පැළෑටි වගා ක්‍රම

- පිහිටි බිමෙහි වගාව
- සිමෙන්ති ටැංකි හෝ ඩක්කි තුළ වගාව
- ජල රෝපණ වගාව

වගාවේම සැකසීම

1. ක්‍රමය

පිහිටි බිමෙහි වගාව



2. ක්‍රමය

සීමෙන්හි ටැංකි හෝ ඩක්කි තුළ වගාව



3. කුමය ජල රෝපණ වගාව



බිම් සැකසුම සහ වගා මාධ්‍යය පිළියෙල කිරීම

ජලජ පැළෑටි වර්ධනය වන ආකාරයන් විවිධ වන නිසා උචිත ආකාරයට බිම් සැකසීම කළ යුතු වේ.

- 1. පාවෙමින් වැඩෙන ශාක (Floating Plants)**
- 2. සම්පූර්ණයෙන් ගිලි වැඩෙන ශාක (Submerged Plants)**
- 3. මතුපිට වැඩෙන ශාක (Emergenced Plants)**

➤ **වගා බිමෙහි පැවතිය යුතු උෂ්ණත්ව පරාසය
20-30⁰C අතර**

- මතුපිට වැවෙන පැළෑටි සඳහා බිම් පාත්ති සැකසීමේදී වතුර බැස යන පරිදි සැකසීම කළ යුතුය
- සිමෙන්ති බත්ති යොදා ගන්නා විට පස් මාධ්‍යයේ තෙතමනය රඳවා ගැනීමට හැකිවන සේ එය නිර්මාණය කළ යුතුය
- ජල සැපයුම හා ජලය බැසයාම මනා ලෙස පැවැතිය යුතුය.


➤ **බොහොමයක් ජලජ පැළෑටි සඳහා
මාධ්‍යය**

***මතුපිට පස් කොටස් 3 : වැලි කොටස් 1**

➤ **පතුළට සවිච්චි වැවෙන පැළෑටි වර්ග
සඳහා**

වැලි රහිතව කුඹුරු මඩ භාවිතා වේ

පාත්ති හෝ ඛණ්ඩ සැලැස්ම



මාධ්‍යය ජීවානුහරණය

1. රසායනික

2. භෞතික ක්‍රම මගින්

1. රසායනික ක්‍රම (ධූමකරණය – Fumigation)

**උදා-Bazamid යොදා නියමිත කාලය තිබෙන්නට හැර
රෝපණ ද්‍රව්‍ය (Planting materials) සිටුවීම කළ යුතුය**

2. භෞතික ක්‍රම

- **සූර්යාලෝකය මගින් ජීවානුහරණය**
- **පිළිස්සීම**
- **භූමාලයට භාජනය කිරීම**

1. සූර්යාලෝකය මගින් (Solarization)

මාධ්‍යයය සාදා

**60 gauge සහිත විනිවිද පෙනෙන පොලිතින්
එකකින් වසා සති 02 ක් තිබෙන්නට හරින්න**

2. පිළිස්සීම

**මාධ්‍යයය සහ පිදුරු වැනි පහසුවෙන් දැනනය
වන දෙයක් මාරුවෙන් මාරුවට යොදා
පිළිස්සීම සිදු කෙරේ**

සෙවණ තත්වය

බොහෝමයක් ජලජ පැළෑටි
මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ සූර්යාලෝකය යටතේ
හිතකර වර්ධනයක් පෙන්වයි

* 50% සෙවණ සැපයීම කළ යුතුය (කළු පාට)

මේ සඳහා,

- * කෘත්‍රීම ආවරණ දැල්

- * ලණු ගෝනි

- * පොල් අතු වැනි දෑ භාවිතා කළ හැක

කණු සඳහා - G1 බට භාවිතය දිගුකාලීන වේ

උණ බමිඬු, කොන්ක්‍රීට් කණු ආදියද භාවිතා කළ හැක.

කල් පවතින ආවරණ දැල් සහ කණු භාවිතය ක්‍රමානුකූල
වගාවක් සඳහා සුදුසුය.

ජල සම්පාදනය

- ජලජ ශාක ඉතා මෘදු නිසා ඉක්මනින් වියලී යාමට ඉඩ ඇත.
- එසේම සමහර ජලජ පැළෑටි ඉක්මනින් කුණාටී යා හැක. *එමනිසා නිතර ඒ ඒ ශාක විශේෂයට හිතකර තත්ව ලබා දීමට වග බලා ගත යුතුය.
- මතුපිට වැඩෙන ශාක සඳහා භාවිතා කරන පාත්ති වල ප්‍රමාණවත් මට්ටමක තෙතමනය පවත්වා ගත යුතුය.
- පැළ සිටුවා මුල් අවස්ථාවේදී දිනකට කීපවරක් ද පසුව අවශ්‍යතාවය අනුව ජල සම්පාදනය කළ යුතුය.
- වැඩිපුර ජලය රැඳීම නිසා අධික හිරු රශ්මිය පතිත වූ විට ජලය රත්වී පැළ තැම්බීම සිදු වේ.

පොහොර යෙදීම

- ජලජ ශාක වල මල් වලට එතරම් ඉල්ලුමක් නොමැති අතර මූලිකව පැළෑටි වලට ඉල්ලුම පවතින නිසා ශාකයේ වර්ධනය කෙරෙහි වැදගත් වන ආකාරයේ පොහොර භාවිතා කළ යුතුය
- දියර සහ කැට ආකාරයට පොහොර ලබා ගත හැකිය
- නයිට්‍රජන්, පොස්පරස් හා පොටෑසියම් අනුපාතය අනුව වෙළඳපලේ විවිධ අකාබනික පොහොර වර්ග ඇත
- කැට පොහොර ජලයේ දිය කර පසට යෙදීම කළ යුතුය

වල් මර්ධනය

- නියමිත ජලජ පැළෑටි වර්ගයට අමතරව ඇති සියළු පැළෑටි වල් පැළ ලෙස වගාවෙන් ඉවත් කළ යුතුය.
- වල් මර්ධනය සඳහා වල් නාශක යෙදීමට වඩා සාර්ථක ක්‍රමය වනුයේ අතින් ගලවා ඉවත් කිරීමයි.
- වල් නාශක භාවිතය ඉතා සැලකිලිමත්ව කළ යුතුය.

රෝග හා පළිබෝධ පාලනය

විසිතුරු ජලජ පැළෑටි වලට හානි කරන පළිබෝධකයෝ

- පැල මැක්කා
- පිටි මකුණා
- මයිටාවන්
- කියන් පණුවා
- සුදු මැස්සා
- නෙමටෝඩාවන්
- හංගොල්ලන්, ගොළුබෙල්ලා
- පළඟැටියන්
- මීයන්
- කක්කුට්ටන්







ජලජ පැළෑටි වල ප්‍රධාන රෝග කාරකයන්

- දිලීර
- බැක්ටීරියා
- වයිරස
- නෙමටෝඩා

ජලජ පැළෑටි වලට බහුලව වැළඳෙන රෝග

- පත්‍ර ලප
- ළපටි පත්‍ර පිළිස්සීම
- කඳ කුණුවීම
- පත්‍ර කහ වීම

මෙම රෝග බොහොමයකගේ රෝග කාරකයා දිලීරය.

වගාවට රෝග වැළඳුණු විට එම රෝගී ශාක වගා බිමෙන් ඉවත් කර නිරෝධායන ඒකකය තුල තබා මර්ධනය සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමෙන් රෝගය ව්‍යාප්ත වීම වලක්වා ගත හැක.



*** රෝග හා පළිබෝධ හානි වලක්වා ගැනීම
සඳහා වගා බිම පිරිසිදුව තබා ගැනීම
ඉතා වැදගත්ය.**

**අපනයනය සඳහා වගා කෙරෙන
ශාක විශේෂ**

අපනයන කළ හැකි විසිතුරු ජලජ පැළෑටි විශේෂ සහ ඒවායේ වටිනාකම

Species	Bundle 600/Box US\$ / Plant	Loose 2000-3000 / Box US\$ / Plant	Pot 200 / Box US\$ / Plant	Mother plants 50 / Box US\$ / Plant
Acorus	0.48	0.12	0.60	-
Alternanthera	0.48	0.07	0.60	-
Ammannia	0.48	0.07	0.60	-
Ammoricia	0.42	0.07	0.60	-
Anubias	-	0.85	1.85	5.50
Aponogeton	-	-	-	-
Bacopa	0.48	0.06	0.60	-
Barclaya	-	0.24	0.60	-
Blyxa	0.36	0.06	-	-
Cabomba	0.36	0.03	0.60	-
Cadamine	0.42	0.14	0.60	-
Ceratophyllum	0.42	0.04	0.60	-
Ceratopteris	0.42	0.07	0.60	-
Crinum	-	0.30	0.60	-
Cryptocoryne	0.54	0.42	0.96	-
Cyperus	0.36	0.24	0.60	-
Dracенаe	0.48	0.30	0.72	-
Echinodorus	0.36	0.14	-	1.80
Hemigraphis	0.42	0.12	0.60	-
Hottonia	0.30	0.07	0.60	-

වෙළඳපලට නිකුත් කිරීම

- හොඳින් වර්ධනය වූ පැළෑටි කපා වතුර බේසමකට යෙදීම කළ යුතුය
- පසුව මිටි ආකාරයට හෝ පෝච්චි ආකාරයට සකසා මුල් ඇද්දවීම සඳහා අදාල ටැංකි වල සති දෙකක් පමණ තැබිය යුතුය
- මුල් ඇද්දවීමෙන් පසු එක එකෙහි නියමිත හොඳ තත්වයේ පැළ හෝ අතු කැබලි සංඛ්‍යාවක් පවත්දැයි පරීක්ෂා කළ යුතුය
- පසුව පෙට්ටි වල අසුරා වෙළඳපල වෙත ප්‍රවාහණය කළ හැක
- අපනයනය කිරීමේදී $10-12^{\circ}\text{C}$ ක පමණ ශීත තත්ව යටතේ තබා යවන ස්ථානය , පෙට්ටි අංකය ගබඩා කළ යුතු තත්ව ආදී තොරතුරු සඳහන් කර ප්‍රවාහණය කෙරේ



CKL

