

## CAAP T1 2025

Nom du Porteur de projet	Titre de l'étude	Spécialité	Etablissement du porteur de projet
ANTONI Maxime	La réalisation de prélèvements peropératoires standards est-elle suffisante dans les changements de prothèses d'épaule en 1 temps pour infection chronique	Chirurgie orthopédique	Clinique de l'Orangerie Strasbourg
COGNAULT Jérémy	Comparison of isokinetic outcomes following ACLR using different types of grafts (hamstring tendon, patellar tendon, quadriceps tendon)	Chirurgien orthopédiste et traumatologue	Clinique du Parc
DEREIX Adrien	Evaluation de la capacité de dépistage, pendant et après la réalisation, d'un bilan de prévention santé	Médecine générale	Centres médicaux Elsan
GCS Elsan	RobotNIC - Revue des Opérations en chirurgie roBOTique - Niveaux d'Incidence des Complications	EDS_ROBOTIQUE	GCS ELSAN
BENOIT GUERRIER Magalie	Etude monocentrique, contrôlée et randomisée sur l'utilisation autonome d'un kit spécialisé dans la gestion des douleurs sexuelles liées à l'endométriose	Endométriose	clinique de l'Estrée
GELLEN Barnabas	intérêt du questionnaire de symptômes « EPOF » et dosage du nt-probnp chez l'adulte de >40 ans pour dépister l'insuffisance cardiaque et optimiser l'adressage en consultation de cardiologie	Cardiologie	Polyclinique de Poitiers
LA SCALA Eugenio	Does coronary computed tomography angiography (CCTA) slice count impact chronic total occlusion (CTO) percutaneous coronary intervention (PCI) outcomes: a systematic review and meta-analysis	Cardiologie interventionnelle	Les Fleurs
MBAIE Lamine	Comparaison du traitement de la capsulite rétractile de l'épaule par une technique de Radio Fréquence Pulsée (RFP) du nerf supra scapulaire associée à la physiothérapie par rapport à la physiothérapie classique chez les patients répondeurs au Bloc anesthésique test. « CapsRetract-RFP »	Anesthésiste	Jean Villar
NAUDI Stéphane	KNEEMATICS : Imagerie cinématique 3D dynamique des prothèses de genou par détection électromagnétique monitorée par intelligence artificielle. Un nouveau principe physique de l'imagerie médicale.	Chirurgien orthopédiste et traumatologue	Médipole Saint Roch
VALLOS Charles/HAMILTON Marc	Création d'un modèle statistique s'appuyant sur la base de données préop/perop/postop permettant une aide à la programmation de traitements lasers de chirurgie réfractive et visant à améliorer les résultats optiques et la satisfaction patients.	Ophthalmologie	Clinique du Parc
VAN DRIESSCHE Stéphane	Relation entre les paramètres spatio-temporels de la marche et les scores fonctionnels après arthroplastie totale du genou	Chirurgien orthopédiste et traumatologue	Polyclinique Sainte-Marguerite
VERDIER Nicolas	Does weight loss prior to total knee arthroplasty (TKA) reduce perioperative adverse events and improve postoperative functional outcomes: a systematic review and meta-analysis	Chirurgien orthopédiste et traumatologue	Polyclinique Jean Villar
WORCEL Alexandre	Traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des rotateurs par histotripsy.	Chirurgien orthopédiste et traumatologue	Isles Adam

## CAAP T4 2025

Nom du Porteur de projet	Titre de l'étude	Spécialité	Etablissement du porteur de projet
ANTONI Maxime	Revue de littérature et méta analyse, portant sur un dispositif médical (implants huméraux sans tige vs avec tige) en chirurgie prothétique de l'épaule.	Chirurgie orthopédique	Orangerie
COMBES Myriam	L'hospitalisation de journée : un angle mort de l'évaluation hospitalière; création d'un outil de mesure de la satisfaction basé sur la méthodologie E-SATIS.	Santé publique	GCS ELSAN
FIREK Blandine	Évaluation des pratiques et connaissances concernant le dépistage de l'incontinence urinaire d'effort féminine en médecine générale : étude prospective interventionnelle avec essai randomisé contrôlé (et étude ancillaire non randomisée)	IPA	Saint-Vincent (Besançon)
GIAIME Philippe	Maladie rénale chronique (Chronic Kidney Disease : CKD) : modélisation des profils de progression - CDK TWIN	Néphrologie	Bouchard
LECOQ Flore -Anne	Validation du score de Boston en français	Chirurgie orthopédique	Santé atlantique
MARCHITAN Roman	Comparer la cicatrisation à 12 mois après traitement chirurgical d'une rupture de la coiffe des rotateurs selon que la rééducation active soit débutée précocement après la chirurgie ou différée à 12 semaines post opératoire.	Chirurgie orthopédique	Centre clinique Soyaux
MEYBLUM Jean	Démontrer que le port d'une ceinture de cryothérapie compressive diminuerait la consommation d'antalgique au cours des 24 premières heures postopératoires chez des patients ayant subi une arthrolyse lombaire postérieure par rapport à la	Chirurgie orthopédique	Hôpital privé d'Eure-et-Loir
NAUDI BAUMELOU Anne	Etude SUBLIM (SUBUrethral LIGAmentoplasty) : comparaison de deux types de bandelettes sous urétrales	Chirurgie urologique	Medipole St Roch
ROUSSEAUX Julien	QUALIS - QUALity Insurance Study Corrélation entre qualité des soins et coûts de sinistralité : étude longitudinale observationnelle dans un réseau d'établissements de santé privés français	Santé publique	GCS
VERDIER Nicolas	This meta-analysis aims to investigate, summarise and compare outcomes of TKA between patients that had preoperative weight reduction versus those that did not.	Chirurgie orthopédique	Jean Villar