



<p><u>UNA SEMANA ANTES:</u></p> <p>Notifique a su médico si tiene alguna de las afecciones que se indican a continuación, ya que podría ser necesario modificar su preparación para la colonoscopia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enfermedad renal • Diabetes • Válvula cardíaca artificial <p>Transporte: Debido a la sedación que le administrarán durante su procedimiento, no podrá conducir ni abandonar la unidad de procedimientos sin un acompañante. Los taxis no son escoltas legales.</p> <p>Deje de tomar suplementos que contengan aceites, como aceite de pescado, aceite de krill, etc. durante 1 semana antes de la colonoscopia.</p>	<p><u>5 DÍAS ANTES:</u></p> <p>Medicamentos: Si toma diluyentes de sangre recetados o inhibidores de plaquetas, como <i>Coumadin (warfarin), Pradaxa, Xarelto, Eliquis o Plavix</i>, verifique con su médico las instrucciones para dejar de tomar estos medicamentos.</p> <p>La aspirina prescrita por un médico no debe suspenderse y debe tomarse según las indicaciones.</p> <p>Deje de tomar los suplementos de hierro 1 semana antes de la colonoscopia.</p> <p><u>3 DÍAS ANTES:</u></p> <p>Dieta: Por favor, intente evitar comer semillas, palomitas de maíz y nueces hasta después de su colonoscopia.</p> <p>Compre tabletas de Simeicona (Simethicone) de 125 mg sin receta. Necesitarás 4 tabletas en total.</p>	<p><u>1 DÍA ANTES:</u></p> <p>Dieta: COMIENCE UNA DIETA DE LÍQUIDOS TRANSPARENTES - NADA de alimentos sólidos, leche ni productos lácteos y nada de jugo con pulpa.</p> <p>Líquidos transparentes aceptables:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jugo transparente (de manzana, de uva blanca, de arándano blanco, etc.) • Café negro o té (sin crema) • Caldo (sin fideos) • Sodas (de cualquier tipo) • Bebidas deportivas • Gelatina • Paletas de hielo • Ensure Clear (sabor durazno) • Agua de coco <p><u>EVITE todos los líquidos de color ROJO o PÚRPURA.</u></p> <p><u>A cualquier hora entre 3-6 pm, tomar 2 cápsulas de Simeicona.</u></p> <p>SUTAB es un tratamiento de dosis fraccionada (2 días). Se requiere un total de 24 comprimidos para la preparación completa para una colonoscopia. Usted tomará los comprimidos en dos dosis de 12 comprimidos cada una. Cada dosis de SUTAB debe tomarse con agua, y debe tomarse más agua luego de cada dosis.</p> <p><i>Tome 2 tabletas cada 10 minutos hasta tomar 12 tabletas.</i></p> <p><u>Use como se indica en la hoja de instrucciones del “KIT, DE PREPARACIÓN INTESTINAL SUTAB” la cual viene en el paquete con instrucciones e información.</u></p> <p><i>Ignore las instrucciones proporcionadas por separado con la preparación SUTAB en sí o por la farmacia.</i></p>	<p><u>1 DÍA ANTES (CONTINUACIÓN):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • PASO 1 Abra un frasco de 12 tabletas SUTAB. • PASO 2 Llene el recipiente proporcionado con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado). Trague cada comprimido con un sorbo de agua y beba toda el agua durante un lapso de 15 a 20 minutos. • PASO 3 Aproximadamente una hora después de tomar el último comprimido, llene el recipiente proporcionado nuevamente con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba toda el agua en un lapso de 30 minutos. • PASO 4 Aproximadamente 30 minutos después de terminar de beber el segundo recipiente de agua, llene el recipiente proporcionado con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba toda el agua en un lapso de 30 minutos. <p>Las respuestas a la preparación varían. Los movimientos intestinales comenzarán de 30 minutos a 6 horas después de ingerir la preparación.</p> <p>La preparación puede causar efectos secundarios tales como distensión abdominal, calambres y náuseas.</p> <p><u>Además de la preparación, debe beber líquidos adicionales para no deshidratarse.</u></p>	<p><u>DÍA DEL PROCEDIMIENTO:</u></p> <p><u>No tome los medicamentos para la diabetes. No tome diuréticos como: Lasix (furosemida) y/o hidroclorotiazida (HCTZ).</u></p> <p><u>5-6 HORAS antes de salir de casa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tomar 2 cápsulas de Simeicona. • Abra el segundo frasco de 12 tabletas SUTAB. Repita el PASO 1 al PASO 4 de la dosis 1. <p><i>IMPORTANTE: Debe terminar de tomar todos los comprimidos de SUTAB y el agua requerida.</i></p> <p>Puede seguir tomando líquidos transparentes hasta 3 horas antes de la hora de llegada a su cita.</p>
--	---	--	--	---