

[DOI:10.61818/02910611](https://doi.org/10.61818/02910611)

ISSN: 2965-0291



Boletim de monitoramento climático de grandes bacias hidrográficas: Bacia Amazônica

Volume 6, Número 11

Manaus, 18 de março de 2026



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Boletim de monitoramento climático de grandes bacias hidrográficas: Bacia Amazônica

Editor Chefe Renato Cruz Senna

Meteorologista

Pesquisador - CODAM, INPA

Editoração Renato Cruz Senna

Tainá Sampaio Xavier Conchy Rocha

Adriano Nobre Arcos

Periodicidade Semanal

Revisão e Diagramação Inácio de Oliveira Lima Neto

Contato Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA


Av. André Araújo, 2.936 - Petrópolis

CEP 69067-375 - Manaus -AM, Brasil

E-mail: renato.senna@inpa.gov.br

clima.amazonia@inpa.gov.br

Telefone: (92) 3643 3154 / 3643-3170



www.instagram.com/clima.amazonia

Esta pesquisa foi apoiada como parte do Programa de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia (LBA), coordenado pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) entidade da administração direta do Governo Federal Brasileiro.




Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição - Não Comercial - Sem Derivações 4.0 Internacional.

Índice

Condições atuais	1
Bacia do Rio Branco	2
Bacia do Rio Negro	2
Bacia do Rio Marañon	2
Bacia do Rio Ucayali	3
Bacia do Rio Napo	3
Curso principal do Rio Amazonas (Peru)	3
Bacia do Rio Javari	4
Bacia do Rio Içá	4
Bacia do Rio Jutai	4
Bacia do Rio Juruá	5
Bacia do Rio Japurá	5
Bacia do Rio Tefé	5
Bacia do Rio Coari	6
Bacia do Rio Purus	6
Curso principal do Rio Solimões	6
Bacia do Rio Beni	7
Bacia do Rio Mamoré	7
Bacia do Rio Guaporé	7
Bacia do Rio Ji-Paraná	8
Bacia do Rio Aripuanã	8
Bacia do Rio Madeira	8
Bacias da margem esquerda do Rio Amazonas (Amazonas)	9
Bacia do Rio Abacaxis	9
Bacia do Rio Juruena	9
Bacia do Rio Teles Pires	10
Bacia do Rio Tapajós	10
Bacias da margem esquerda do Rio Amazonas (noroeste do Pará)	10
Bacia do Rio Curuá Una	11
Bacias da margem esquerda do Rio Amazonas (nordeste do Pará)	11
Bacia do Rio Iriri	11
Bacia do Rio Xingu	12
Curso principal do Rio Amazonas (Brasil)	12
Previsão multimodelo subsazonal	13
Valores de referência	15
Categorização das anomalias de precipitação	16
Comportamento semanal das anomalias (gráficos auxiliares)	17
Diagrama unifilar das bacias representadas	20

Condições atuais


Mapas das condições observadas de precipitação e gráficos individuais por bacias são produzidos a partir dos dados MERGE/GPM gerados pelo INPE/CPTEC, considerando como climatologia para período de 2000 a 2025. **Entre os dias 17 de fevereiro e 18 de março de 2026, chuvas abaixo da climatologia caracterizaram com déficit de precipitação o curso principal do Rio Amazonas em territórios brasileiro e peruano, bacias hidrográficas dos rios Abacaxis, Aripuanã, Beni, Branco, Coari, Içá, Japurá, Javari, Ji-Paraná, Juruá, Juruena, Jutaí, Madeira, bacias da margem esquerda do Rio Amazonas no nordeste e no noroeste do Estado do Pará, Napo, Negro, Purus, Tefé, Teles Pires, Xingu, Ucayali e o curso principal do Rio Solimões; chuvas acima da climatologia registradas sobre as bacias hidrográficas dos rios Curuá Una e Iriri; chuvas próximas da normalidade registradas sobre as bacias hidrográficas dos rios Guaporé, Mamoré, Marañon, bacias da margem esquerda do Rio Amazonas no nordeste do Estado do Amazonas, Tapajós e Ucayali.** O multimodelo indica, para o período de 18/03/2026 a 24/03/2026, **previsão de chuvas abaixo da climatologia sobre o curso principal do Rio Amazonas em territórios brasileiro e peruano, bacias dos rios Acabaxis, Coari, Curuá Una, Guaporé, Içá, Iriri, Japurá, Javari, Ji-Paraná, Juruena, Jutaí, Mamoré, Tapajós, Tefé, Teles Pires e Xingu; previsão de chuvas acima da climatologia sobre as bacias dos rios Beni, Branco, bacias da margem esquerda do Rio Amazonas no noroeste do Estado do Amazonas e Ucayali.**



1	Abacaxis	9	Guaporé	17	Jutaí	25	Negro
2	Amazonas (BR)	10	Içá	18	Madeira	26	Purus
3	Amazonas (PE)	11	Iriri	19	Mamoré	27	Solimões
4	Aripuanã	12	Japurá	20	Marañon	28	Tapajós
5	Beni	13	Javari	21	Marg Esq (AM)	29	Tefé
6	Branco	14	Ji-Paraná	22	Marg Esq (PA) NE	30	Teles Pires
7	Coari	15	Juruá	23	Marg Esq (PA) NW	31	Ucayali
8	Curuá Una	16	Juruena	24	Napo	32	Xingu


Análise individual por bacia hidrográfica

Bacia do Rio Branco




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **50 e 70 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **12 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, o cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-2.2**, classifica a bacia em condição de **muito seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **elevação** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **próximo da normalidade**.

Bacia do Rio Negro




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **205 e 232 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **92 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-2.7**, classifica a bacia em condição de **tendência a extremamente seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **elevação** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **muito seco ou tendência a extremamente seco**.

Bacia do Rio Marañon




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **178 e 198 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **175 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-0.2**, classifica a bacia em condição de **normalidade**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **próximo da normalidade**.

Bacia do Rio Ucayali




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **180 e 200 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **161 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-0.9**, classifica a bacia em condição de **tendência a seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **redução** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **próximo da normalidade ou tendência a chuvoso**.

Bacia do Rio Napo




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **256 e 288 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **211 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-1.3**, classifica a bacia em condição de **seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **seco ou tendência a seco**.

Curso principal do Rio Amazonas (Peru)




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **298 e 325 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **215 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-1.9**, classifica a bacia em condição de **tendência a muito seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **elevação** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **muito seco ou tendência a muito seco**.

Bacia do Rio Javari




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **269 e 295 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **171 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-2.4**, classifica a bacia em condição de **muito seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **muito seco ou tendência a extremamente seco**.

Bacia do Rio Içá (Putumayo)




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **268 e 296 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **191 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-2.0**, classifica a bacia em condição de **muito seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **elevação** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **muito seco ou tendência a muito seco**.

Bacia do Rio Jutai




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **275 e 303 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **146 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-2.9**, classifica a bacia em condição de **tendência a extremamente seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **muito seco ou tendência a extremamente seco**.

Bacia do Rio Juruá




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **241 e 266 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **150 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-2.4**, classifica a bacia em condição de **muito seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **muito seco ou tendência a muito seco**.

Bacia do Rio Japurá (Caquetá)




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **237 e 265 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **132 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-2.5**, classifica a bacia em condição de **tendência a extremamente seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **elevação** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **muito seco ou tendência a extremamente seco**.

Bacia do Rio Tefé




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **262 e 288 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **116 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-2.9**, classifica a bacia em condição de **tendência a extremamente seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **muito seco ou tendência a extremamente seco**.

Bacia do Rio Coari




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **267 e 290 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **122 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-3.0**, classifica a bacia em condição de **extremamente seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **extremamente seco ou tendência a extremamente seco**.

Bacia do Rio Purus




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **259 e 284 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **192 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-1.8**, classifica a bacia em condição de **tendência a muito seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **seco ou tendência a seco**.

Curso principal do Rio Solimões




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **263 e 292 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **126 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-2.7**, classifica a bacia em condição de **tendência a extremamente seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **muito seco ou tendência a extremamente seco**.

Bacia dos rios Beni e Madre de Dios




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **221 e 247 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **197 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-1.0**, classifica a bacia em condição de **seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **redução** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **próximo da normalidade**.

Bacia do Rio Mamoré




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **193 e 218 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **224 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **0.2**, classifica a bacia em condição de **normalidade**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **redução** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **chuvoso ou tendência a chuvoso**.

Bacia do Rio Guaporé (Iténez)




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **176 e 197 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **187 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **0.1**, classifica a bacia em condição de **normalidade**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **redução** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **próximo da normalidade ou tendência a chuvoso**.

Bacia do Rio Ji-Paraná




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **239 e 264 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **146 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia, o valor de **-2.0**, classifica a bacia em condição de **muito seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **seco ou tendência a muito seco**.

Bacia do Rio Aripuanã




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **238 e 266 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **174 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-1.7**, classifica a bacia em condição de **tendência a muito seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **seco ou tendência a seco**.

Bacia do Rio Madeira




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **240 e 265 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **183 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-1.5**, classifica a bacia em condição de **tendência a muito seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **seco ou tendência a seco**.

Bacias da margem esquerda do Rio Amazonas (Amazonas)




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **225 e 258 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **234 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-0.4**, classifica a bacia em condição de **normalidade**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **próximo da normalidade ou tendência a seco**.

Bacia do Rio Abacaxis




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **258 e 289 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **225 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-1.1**, classifica a bacia em condição de **seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **próximo da normalidade**.

Bacia do Rio Juruena




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **244 e 269 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **215 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-1.0**, classifica a bacia em condição de **seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **redução** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **próximo da normalidade**.

Bacia do Rio Teles Pires




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **266 e 292 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **214 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-1.1**, classifica a bacia em condição de **seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **seco ou tendência a seco**.

Bacia do Rio Tapajós




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **273 e 306 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **318 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **0.3**, classifica a bacia em condição de **normalidade**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **chuvoso ou tendência a chuvoso**.

Bacias da margem esquerda do Rio Amazonas (noroeste do Pará)




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **219 e 248 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **189 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-1.0**, classifica a bacia em condição de **seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **próximo da normalidade ou tendência a seco**.

Bacia do Rio Curuá Una




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **244 e 268 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **276 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **0.6**, classifica a bacia em condição de **tendência a chuvoso**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **próximo da normalidade ou tendência a chuvoso**.

Bacias da margem esquerda do Rio Amazonas (nordeste do PA)




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **239 e 262 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **188 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-1.5**, classifica a bacia em condição de **tendência a muito seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **seco ou tendência a seco**.

Bacia do Rio Iriri




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **270 e 299 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **325 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **0.6**, classifica a bacia em condição de **tendência a chuvoso**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **chuvoso ou tendência a chuvoso**.

Bacia do Rio Xingu



A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **242 e 268 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **207 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-1.2**, classifica a bacia em condição de **seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **seco ou tendência a seco**.

Curso principal do Rio Amazonas (Brasil)




A climatologia do período em análise indica chuvas com registros variando entre **311 e 338 mm** sendo considerados normais (referência quantis 42.5% e 57.5%). Em **18 de março de 2026**, foram observados **293 mm** de precipitação média acumulada sobre a bacia em 30 dias, no cálculo da média do índice de anomalia categorizada na área da bacia o valor de **-0.8**, classifica a bacia em condição de **tendência a seco**. Nas próximas semanas o comportamento climático indica **manutenção** dos volumes de chuva, o modelo de prognóstico subsazonal sugere um comportamento **próximo da normalidade ou tendência a seco**.

Previsão multimodelo subsazonal CPTEC/INPE-FUNCEME produzida em 17/03/2026 para os próximos 14 dias .


A previsão multimodelo subsazonal calibrada CPTEC/INPE-FUNCEME é gerada através de cooperação científica entre o CPTEC/INPE e a FUNCEME, sendo proveniente do conjunto de 4 modelos globais (um modelo brasileiro, o BAM-1.2/CPTEC, e três modelos dos EUA, CFSv2/NCEP, GEFSv12/NCEP e ESRL/NOAA, estes três últimos do projeto SubX). As anomalias de precipitação previstas são determinadas em relação ao período climatológico de 1999 a 2016. A seguir são apresentadas as saídas para o intervalo de previsão de 01 a 07 e de 08 a 14 dias detalhando o comportamento previsto sobre as bacias de interesse.

PREVISÃO SUBSAZONAL – MULTIMODELO CALIBRADO
Anomalia (mm) de Precipitação Acumulada
(07 Dias) Período: 18/03/2026 – 24/03/2026



A Figura acima, apresenta o prognóstico para o intervalo de **7 dias entre 18/03/2026 e 24/03/2026**, previsão de predomínio de déficit de precipitação (laranja) sobre o curso principal do Rio Amazonas em territórios brasileiro e peruano, bacias dos rios Abacaxis, Coari, Curuá Una, Guaporé, Içá, Iriri, Japurá, Javari, Ji-Paraná, Juruena, Jutaí, Mamoré, Tapajós, Tefé, Teles Pires e Xingu. Previsão de predomínio de anomalias positivas de precipitação (azul) sobre as bacias dos rios Beni, Branco, bacias da margem esquerda do Rio Amazonas no noroeste do Estado do Pará e Ucayali. Previsão de predomínio de chuvas próximas a climatologia (branco) sobre as demais bacias monitoradas.

PREVISÃO SUBSAZONAL – MULTIMODELO CALIBRADO
 Anomalia (mm) de Precipitação Acumulada
 (07 Dias) Período: 25/03/2026 – 31/03/2026



A Figura acima, apresenta o prognóstico para o intervalo de **7 dias entre 25/03/2026 e 31/03/2026**, previsão de predomínio de anomalias positivas de precipitação (azul) no norte e nordeste da região monitorada, sobre o curso principal do Rio Amazonas em território brasileiro, bacias hidrográficas dos rios Abacaxis, Branco, bacias da margem esquerda do Rio Amazonas no nordeste do Estado do Amazonas e no nordeste e no noroeste do Estado do Pará e Negro. Não há previsão de predomínio de déficit de precipitação (laranja) sobre bacias hidrográficas da região monitorada. Previsão de predomínio de chuvas próximas a climatologia (branco) sobre as demais bacias monitoradas.

Valores de Referência para a precipitação acumulada em 30 dias na data da análise.

A Tabela 1, mostra os valores de precipitação média acumulada (mm de chuva) por bacia, tomando como base as estimativas de precipitação por meio de imagens de satélite, produto denominado MERGE/GPM, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no período 2000 – 2025, levando-se em conta o limite geográfico das bacias hidrográficas da Amazônia, para tanto foi utilizada a técnica de quantis, por se mostrar uma ferramenta adequada e precisa para categorizar precipitação e anomalias de variáveis discretas, foram adotados os seguintes limites 5%, 12.5%, 20%, 27.5%, 35%, 42.5%, 57.5%, 65%, 72.5%, 80%, 87.5% e 95% buscando estratificar a técnica e permitir uma categorização mais detalhada das condições em cada bacia monitorada.

18/03/2026	Quantis para categorização de anomalias de precipitação											
	5.0%	12.5%	20.0%	27.5%	35.0%	42.5%	57.5%	65.0%	72.5%	80.0%	87.5%	95.0%
Abacaxis	127	162	196	220	239	258	289	311	332	357	389	442
Amazonas (BR)	190	233	257	277	295	311	338	356	375	397	425	465
Amazonas (PE)	188	220	247	267	282	298	325	344	369	397	433	499
Aripuanã	119	152	177	198	219	238	266	284	303	325	356	411
Beni	117	147	170	188	205	221	247	266	287	311	344	404
Branco	8	13	21	30	40	50	70	84	99	119	150	216
Coari	177	205	223	238	253	267	290	306	323	343	372	418
Curuá Una	132	166	193	214	228	244	268	282	298	316	342	393
Guaporé	92	116	132	148	162	176	197	213	231	252	279	321
Içá	166	194	215	233	250	268	296	317	341	367	397	442
Iriri	138	175	202	228	250	270	299	320	344	372	413	467
Japurá	132	161	181	200	219	237	265	285	308	336	372	426
Javari	169	196	216	233	251	269	295	313	334	357	387	434
Ji-Paraná	109	170	184	204	222	239	264	282	300	321	347	393
Juruá	138	151	191	209	225	241	266	284	303	325	357	406
Juruena	138	170	191	209	227	244	269	285	304	327	355	406
Jutaí	166	197	219	239	257	275	303	325	350	379	418	473
Madeira	130	159	185	204	222	240	265	283	301	323	350	390
Mamoré	101	127	147	162	177	193	218	236	257	282	317	378
Marañon	101	122	138	152	165	178	198	212	230	250	278	323
Marg Esq (AM)	100	137	161	184	204	225	258	278	301	327	366	429
Marg Esq (PA) NE	107	148	183	206	223	239	262	278	297	318	349	391
Marg Esq (PA) NW	87	125	153	179	201	219	248	269	294	323	364	422
Napo	149	178	198	216	236	256	288	310	333	359	391	444
Negro	99	131	152	170	187	205	232	252	273	299	332	384
Purus	158	184	205	223	241	259	284	302	321	344	375	434
Solimões	138	170	197	221	243	263	292	312	334	359	390	438
Tapajós	134	181	208	231	252	273	306	331	360	392	428	483
Tefé	163	192	216	234	247	262	288	306	328	350	383	427
Teles Pires	142	177	205	229	249	266	292	309	327	347	376	425
Ucayali	102	125	142	156	168	180	200	213	228	247	272	313
Xingu	140	168	190	208	226	242	268	285	305	328	358	411

Tabela 1. Quantis de precipitação acumulada (mm) em 30 dias (17 de fevereiro a 18 de março), Climatologia do período (2000 - 2025) dados MERGE/GPM – INPE/CPTEC.

Categorização das anomalias de precipitação

Utilizando os valores constantes na tabela anterior é possível categorizar a precipitação observada no ano corrente em relação aos valores observados nos registros anteriores desde o início da série disponível, assim os valores observados inferiores ao quantil de 5% caracterizam a bacia em condição de extremamente seco, entre 5 e 12.5% em condição de tendência a extremamente seco, entre 12.5 e 20% condição de muito seco, entre 20 e 27.5% tendência a muito seco, entre 27.5 e 35% condição de seco, entre 35 e 42.5 condição de tendência a seco, valores entre 42.5 e 57.5 definem a condição de normalidade, valores entre 57.5 e 65% condição de tendência a chuvoso, entre 65 e 72.5% condição de chuvoso, entre 72.5 e 80% tendência a muito chuvoso, entre 80 e 87.5 condição de muito chuvoso, entre 87.5 e 95% indicam tendência a extremamente chuvoso e finalmente valores superiores a 95% definem a bacia em condição de extremamente chuvoso, conforme legenda abaixo.

QUANTIL	5.0%	12.5%	20.0%	27.5%	35.0%	42.5%		57.5%	65.0%	72.5%	80.0%	87.5%	95.0%
INDICE	-3.0	-2.5	-2.0	-1.5	-1.0	-0.5	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
CATEGORIA	EXTREMAMENTE SECO	TENDÊNCIA A EXTREMAMENTE SECO	MUITO SECO	TENDÊNCIA A MUITO SECO	SECO	TENDÊNCIA A SECO	NORMAL	TENDÊNCIA A CHUVOSO	CHUVOSO	TENDÊNCIA A MUITO CHUVOSO	MUITO CHUVOSO	TENDÊNCIA A EXTREMAMENTE CHUVOSO	EXTREMAMENTE CHUVOSO

As tabelas a seguir apresentam (Tabela 2A) a precipitação média observada (mm) em cada bacia tomando como referência as estimativas de precipitação por satélite utilizando a técnica MERGE, acumuladas em 30 dias nas datas indicadas, disponibilizadas em <http://ftp.cptec.inpe.br/modelos/tempo/MERGE/GPM/DAILY/> os valores médios das anomalias categorizadas (Tabela 2B) foram estimados com base no valor de anomalia de cada pixel na área da bacia monitorada, calculados conforme metodologia descrita no item anterior, nas mesmas datas do monitoramento da precipitação, a escala de cores das anomalias segue a legenda descrita.

	Precipitação acumulada média na bacia (mm)				
	18/02/2026	25/02/2026	04/03/2026	11/03/2026	18/03/2026
Abacaxis	233	227	222	241	225
Amazonas (BR)	249	257	264	282	293
Amazonas (PE)	402	380	274	269	215
Aripuanã	301	270	275	228	174
Bení	265	220	187	208	197
Branco	30	25	6	7	12
Coari	236	187	147	156	122
Curuá Una	195	214	241	254	276
Guaporé	143	182	158	200	187
Içá	281	281	203	189	191
Iriri	233	203	297	333	325
Japurá	198	196	139	128	132
Javari	344	289	195	205	171
Ji-Paraná	245	213	176	180	146
Juruá	246	235	165	173	150
Juruena	271	248	263	255	215
Jutáí	245	235	165	188	146
Madeira	253	207	192	203	183
Mamoré	146	180	161	218	224
Marañon	262	240	186	195	175
Marg Esq (AM)	209	215	196	224	234
Marg Esq (PA) NE	163	167	162	173	188
Marg Esq (PA) NW	133	141	128	143	189
Napo	243	243	167	177	211
Negro	185	136	90	101	92
Purus	243	204	159	203	192
Solimões	242	206	151	137	126
Tapajós	236	237	293	337	318
Tefé	290	201	139	148	116
Teles Pires	270	256	255	235	214
Ucayali	271	228	174	176	161
Xingu	199	207	225	226	207









Tabela 2A. Precipitação acumulada em 30 dias (mm), de dados MERGE/GPM – INPE/CPTEC.











	Anomalia categorizada média na bacia				
	18/02/2026	25/02/2026	04/03/2026	11/03/2026	18/03/2026
Abacaxis	-0.8	-1.2	-1.4	-1.0	-1.1
Amazonas (BR)	-1.0	-1.2	-1.3	-1.2	-0.8
Amazonas (PE)	1.9	1.7	-0.8	-1.1	-1.9
Aripuanã	0.3	-0.6	-0.1	-0.9	-1.7
Bení	-0.2	-1.4	-2.0	-1.3	-1.0
Branco	-0.9	-1.3	-2.8	-2.7	-2.2
Coari	-0.7	-2.2	-2.8	-2.7	-3.0
Curuá Una	-0.6	-0.4	0.1	0.2	0.6
Guaporé	-1.5	-0.8	-0.9	-0.1	0.1
Içá	0.9	0.9	-1.2	-2.0	-2.0
Iriri	-1.0	-1.6	0.0	0.5	0.6
Japurá	0.1	-0.1	-1.9	-2.4	-2.5
Javari	1.2	0.2	-1.8	-1.8	-2.4
Ji-Paraná	-0.3	-1.1	-1.5	-1.4	-2.0
Juruá	-0.4	-0.7	-2.2	-2.2	-2.4
Juruena	-0.1	-0.9	-0.5	-0.5	-1.0
Jutáí	-1.5	-1.7	-2.7	-2.4	-2.9
Madeira	-0.2	-1.4	-1.6	-1.4	-1.5
Mamoré	-2.0	-1.3	-1.6	-0.5	0.2
Marañon	2.0	1.7	0.3	0.5	-0.2
Marg Esq (AM)	-0.1	-0.3	-0.9	-0.6	-0.4
Marg Esq (PA) NE	-1.3	-1.6	-1.9	-1.9	-1.5
Marg Esq (PA) NW	-1.4	-1.7	-2.2	-1.9	-1.0
Napo	0.9	0.8	-1.4	-1.7	-1.3
Negro	0.0	-1.3	-2.5	-2.5	-2.7
Purus	-1.0	-2.0	-2.7	-1.9	-1.8
Solimões	-0.5	-1.3	-2.3	-2.7	-2.7
Tapajós	-1.0	-1.2	-0.2	0.5	0.3
Tefé	0.4	-1.8	-2.9	-2.8	-2.9
Teles Pires	-0.3	-0.8	-0.8	-1.0	-1.1
Ucayali	1.7	0.8	-0.8	-0.8	-0.9
Xingu	-1.3	-1.3	-0.9	-0.7	-1.2











Tabela 2B. Anomalia Categorizada Precipitação por quantis.

Comportamento das anomalias 07 e 30 dias observado nas semanas anteriores

Os gráficos a seguir ilustram o comportamento do índice das anomalias de precipitação nas últimas semanas, linhas vermelhas mostram o comportamento de períodos de 30 dias e linhas em azul o comportamento em relação a períodos de 7 dias, atualizados semanalmente.














Diagrama unifilar das bacias representadas



Renato Cruz Senna

Pesquisador - CODAM

Meteorologista, CREA-AM 2880-D

Registro Nacional 040459935-4

Fone de contato +55 92 3643 3170

