

Mycoplasma Genitalium (MGen)

¿Qué tan común es?

Más de 1 en 100 adultos puede que tenga MGen.

¿Cómo se contrae?

La MGen se puede pasar de una persona a otra durante el sexo anal, oral, vaginal o por el agujero delantero.

¿Cómo se diagnostica?

Diagnosticamos la MGen hablando contigo sobre tus síntomas e historia sexual, haciendo un examen físico, y analizando tu orina o recolectando una muestra vaginal o del agujero delantero con hisopo. Una vez que se toma una muestra de orina o se recoge una muestra con un hisopo, se analiza en un laboratorio para ver si hay presencia de la bacteria MGen, lo que lleva unos 3 a 5 días.

¿Cómo se previene?

Puedes prevenir una infección de MGen usando condones durante el sexo.

¿Cuáles son los síntomas?

Mucha gente no tiene síntomas de una infección de MGen. Si en efecto tienes síntomas, pueden incluir ardor, escozor, o dolor al orinar o secreción del pene. Los síntomas vaginales o del agujero delantero pueden incluir dolor o sangrado durante el sexo, dolor en la zona pélvica, sangrado entre menstruaciones, y secreciones de la vagina o agujero delantero.

¿Cómo se trata?

Si tienes síntomas, te recomendamos que te hagas la prueba y te trates de gonorrea y clamidia primero. Si aún tienes síntomas después del tratamiento, haremos la prueba para ver si tienes

la MGen y comenzaremos el tratamiento el mismo día. En este momento, no recomendamos que las personas sin síntomas se hagan la prueba para ver si tienen la MGen. Como siempre, recomendamos hacerse pruebas para ver si uno tiene otras ITS (gonorrea, clamidia y sífilis) con regularidad aunque no tengas síntomas.

Hay una creciente resistencia contra muchos de los antibióticos de uso común incluyendo la azitromicina y la doxiciclina. Actualmente usamos el moxifloxacino que requiere un tratamiento de 7 a 10 días. Mientras que la prueba de resistencia para la MGen no está rutinariamente disponible, podemos usar azitromicina si sabemos que no es resistente a este antibiótico.

Si tus síntomas no desaparecen después del tratamiento, te pediremos que vuelvas para más estudios y tratamiento si corresponde.

Espera 7 días después de finalizar el tratamiento para volver a tener relaciones sexuales.

¿Se deben tratar mis parejas sexuales también?

Recomendamos que solo las personas con síntomas se hagan la prueba.

¿Consideraciones especiales con VIH?

Puede que sea más probable que las personas que viven con el VIH tengan MGen, y puede que la MGen haga más probable la transmisión del VIH (en ausencia de PrEP, I=I, u otros métodos de prevención del VIH).

Servicios de salud sexual de la San Francisco AIDS Foundation

Recibe servicios de salud sexual gratuitos incluyendo pruebas de ITS y del VIH, PrEP, PEP, servicios de salud anal, suministros para la reducción de daños, hormonas de confirmación de género, etc.

Podemos realizar pruebas y tratar la MGen en Magnet, la clínica de salud sexual en la San Francisco AIDS Foundation.

VEN A VERNOS

470 Castro Street, San Francisco
(415) 581-1600



sfaf.org