SERIE DE RECURSOS DE SALUD SEXUAL

La Sífilis

¿Qué es?

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por bacterias y que puede manifestarse a través de muchos síntomas diferentes. En etapas tempranas, la sífilis causa lesiones en la piel, ronchas, y otros problemas como dolor en las articulaciones, problemas de hígado, y fatiga. Si no se trata, la sífilis puede dañar el cerebro y el corazón, que puede causar la muerte.

¿Qué tan común es?

En 2017, San Francisco tenía la tasa más alta de sífilis en su primera etapa de cualquier condado de EUA, y las tasas han estado aumentando. El número de casos de sífilis casi se dobló entre 2010 (4,599 infecciones) y 2017 (9,094 infecciones).

¿Cómo se contrae?

Te puedes contagiar de sífilis si tienes sexo oral, anal, vaginal o por el agujero delantero con alguien que tiene sífilis. Pueden aparecer lesiones en cualquier parte del cuerpo, pero a menudo ocurren en el pene, escroto, ano, vulva o en la vagina, agujero delantero, o recto. También pueden aparecer en los labios o en la boca.

Las madres también pueden transmitir la sífilis al bebé durante el embarazo y parto.

¿Cómo se diagnostica?

Tomamos una muestra de sangre para ver si tienes sífilis.

¿Cómo se previene?

Puedes reducir el riesgo de contagiarte de sífilis mediante el uso de condones y barreras bucales de látex.

¿Cuáles son los síntomas?

Hay muchos posibles síntomas de sífilis que pueden ser difíciles de notar. La infección por sífilis pasa por varias "etapas" en las que los síntomas pueden cambiar. La mejor manera de saber si tienes sífilis es la de realizarte pruebas regularmente si estás teniendo relaciones sexuales con otras personas.

¿Cómo se trata?

La sífilis se puede curar con antibióticos. El tratamiento elimina la bacteria de la sífilis y evita más daño. El tratamiento no repara daños ya hechos así que es importante identificar y tratar una infección en etapas tempranas.

¿Se deben tratar mis parejas sexuales también?

Asegúrate de avisar a tus parejas sexuales—y de que se realicen las pruebas y se traten de sífilis. Si no, puede que te vuelvas a infectar. Tus parejas deben recibir tratamiento aunque sus análisis de sangre den negativo para la sífilis porque puede que tarde hasta 90 días en aparecer en los resultados de sus pruebas.

¿Consideraciones especiales con VIH?

Las lesiones de la sífilis facilitan la transmisión y la contracción de la infección por VIH (en la ausencia de PrEP, I=I u otros métodos para la prevención del VIH).

Servicios de salud sexual de la San Francisco AIDS Foundation

Recibe servicios de salud sexual gratuitos incluyendo pruebas de ITS y del VIH, PrEP, PEP, servicios de salud anal, suministros para la reducción de daños, hormonas de confirmación de género, etc.

Podemos realizar pruebas y tratar la sífilis en Magnet, la clínica de salud sexual en la San Francisco AIDS Foundation.

VEN A VERNOS

470 Castro Street, San Francisco
(415) 581-1600

sfaf.org