

Hová ragasszuk az FGPress PowerStrips tapaszt



- 1. A homlok,- és az orr melléküregek gyulladása** – a homlokra és az orr mellé.
- 2. Fülzúgás, sípolás a fülben (tinnitus, Meniér szindróma)** – az érintett fül mögé, valamint a felsőtől a középső nyakcsigolyáig.
- 3. Középfülfő-gyulladás és hallásvesztés**- mindkét oldalon a fül mögé, valamint a felsőtől a középső nyakcsigolyáig.
- 4. Angina** – a nyak mellső felületére és az áll alatt, nyakra az alsó állkapocs görbületénél, a fül mögé.
- 5. Nátha** – az orrcimpák mellett, az orrtőnél a szemöldökök között, a szegycsonton és a nyaki gerincen.
- 6. Meghülés-megfázás, köhögés, hörghurut gyulladás, dohányzásról történő leszokás** – a szegycsonton elöl az 1-3. borda magasságában szegycsontcsont közepig és a lapockák között háton egy ujjnyi távolságra a 2. és 3. mellkasi csigolya tapintható középcsontjától.
- 7. Fejfájás és migrén** – a nyakcsigolyára és a fájdalmas területen a halántéknál.
- 8. Magas vérnyomás** – a tapasz kisebbik részét a nyakcsigolyák területére, néhány naponta felváltva a lapockák között a 4. az 5. és a 6. mellkasi csigolya kitüremkedéseire lefelé a tapasz nagyobbik részét – keresztcsontra.
- 9. Alacsony vérnyomás** - fordítva, a tapasz nagyobbik részét a nyakcsigolyák területére, a kisebbiket a keresztcsontra, a mellkasi csigolyákra nem szabad feltapasztani.
- 10. A látás javításához** – a fej mindkét-oldalán a szemüreg mellet a halánték területén, és a 2.nyakcsigolyára.
- 11. Szívtájéki fájdalmaknál** – a tapasz felét a szegycsontra, a másik felét pedig a lapockák közé tapasztjuk.
- 12. Gyomorbántalom, emésztési problémák érzetekor, rosszulétkor, légzési nehézség esetén** – a tapasz felét a gyomortájékára, a másik felét a keresztcsontra.
- 13. Epeproblémánál, gyomorégéskor, tapintható ellenállás esetén** – ½ tapaszt a jobboldali bordák alá, ½ tapaszt – a keresztcsont alá, de a köldök alá is helyezhető.
- 14. Székrekedés, hasmenés, bélgyulladás** – ½ tapaszt a köldök alá, ½ tapaszt a keresztcsontra.
- 15. Prostatata nagyobbodás, gyulladás** – a tapaszt 4 részre kell osztani. Egyesével feltapasztjuk a bal és a jobb comb belső felére az ágyék felé, a harmadikat a gátra és környékére (latinul: perineum) a combtőre hajtvva a negyediket a keresztcsontra. Napközben a harmadik részt a hasaljra tapasztjuk.
- 16. Nőgyógyászati problémáknál** - a tapaszt 4 részre kell osztani. Az 1 részt az alhasra, 1 részt a keresztcsontra, 1-1 részt pedig a belső bokacsont fölé 1-2 ujjnyira tapasztjuk.



17. Miómák és ciszták a petefészken – ½ fél tapasz a köldök alatt, ½ tapasz a keresztcsontra elhelyezve.

18. A nagy forgók betegségei – a tapaszt 4 részre vágjuk és körberagasztjuk a forgót 4 oldalról. Amennyiben a tapasz nem rögzül megfelelően a mozgás miatt, akkor még sima leukoplasztal körberagasztjuk (felülragasztjuk).

19. Sarok (sarkantyú) – 1 részt alulról középen a sarokra tapasztunk, 2 részt pedig mindkét vádli alsó harmadára.

20. Az alsó végtagok visszerei – a sípcsontok alsó harmadára a belső oldalon.

21. Thrombophlebitis (láb trombózis) – a trombózis csomópontja fölé tapasztva, nem közvetlenül rá!!!

22. Cukorbetegség (nem veleszületett hanem szerzett) - ½ tapaszt a hasnyálmirigy területére a hasfelsőn a köldök felett. (gyomortájéék), ½ tapaszt pedig a keresztcsontra.

23. Allergiák – ½ tapaszt a keresztcsontra, egy másik tapaszt megfelelően a jobb és bal talpra ragasztva úgy, hogy a lábfejen a hüvelyk és mutató (2.) ujját összekötő bőrredőhöz érjen, ½ tapaszt pedig a máj vetületére (a máj fölé). Ehhez összesen 2 tapasz szükséges.

24. Bőrgyulladás, pikkelysömör, száraz ekcéma – ½ tapaszt a kiütés középpontjára tapasztani, ½ tapaszt pedig a máj vetületére (a máj fölé)..

25. Hosszan-tartó gyógyszerelés, enyhe mérgezés – a talpakon a májfunkcióhoz és a májvetületére (a máj fölé) és epe fölé jobboldalon a borda alatt.

26. Az agy jobb vérellátásáért, memóriajavításért, a koncentráció - és alvásjavításért a gerinc kopásos elváltozása kezelésért – ½ a nyaki gerinccsigolyák területére, ½ tapasz a keresztcsontra

27. Hypothyreózis (pajzsmirigy alulműködése) – a szegycsont felső felére és a nyakcsigolyák alsó részére.

Ismeretlen eredetű fájdalmak esetén lépjen mindig kapcsolatba az orvosával!

A tapaszokat kifejezetten arra tervezték, hogy átmenetileg enyhítsék a feszült izmokat, csillapítsák a kellemetlen érzést, csökkentsék a stresszt és segítsenek ellazulni.

** Csak külső használatra.*

** Eddig nem tapasztaltak káros mellékhatást, és nincs ismert kölcsönhatás más gyógyszerekkel.*

** Ha állandó gyógyszeres kezelés alatt áll, akkor értesítse kezelőorvosát.*

** Terhes nők először konzultáljanak az orvosukkal.*

** Használata szükség szerint, vagy folyamatosan 2 naponta cserélve*

** Zuhanyozás vagy fürdés után használja.*

** Fájdó ízületeknél, az ízület alá, vagy fölé kell ragasztani*

** Felragasztásakor az alkalmazást területet legyen haj, szőr, izzadság, ápolási termékek nélküli*

** PowerStrips-et kisebb darabokra lehet vágni.*

** PowerStrips 100 %-ig természetes anyagokból álló termék.*

** Tárolás: Ne tegye ki napsugárzásnak, eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten, legfeljebb 25 fokon.*

** Lejáratási idő kb 1 év (felbontástól).*

