

FAST ACTING  
STARTS WORKING IN  
24 HOURS



# DISEASEEX™

LAWN FUNGICIDE

BROAD SPECTRUM DISEASE  
PREVENTION AND CONTROL

**Controls Brown Patch**  
and other common lawn diseases  
*Controla la Rhizoctonia y otras enfermedades comunes del césped*



**BEFORE      AFTER**

TREATS UP TO 5,000 SQ FT  
NET WT/PESO NETO  
10.0 lb (4.54 kg)

ACTIVE INGREDIENT:  
Azoxystrobin ..... 00.31%  
OTHER INGREDIENTS: ..... 99.69%  
TOTAL ..... 100.00%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN  
CAUTION SEE BACK PANEL FOR ADDITIONAL  
PRECAUTIONARY STATEMENTS.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  
PRECAUCION CONSULTE EL PANEL POSTERIOR PARA  
CONOCER LOS RIESGOS DE PRECAUCION ADICIONALES.



DISEASEEX™  
LAWN FUNGICIDE  
BROAD SPECTRUM DISEASE  
PREVENTION AND CONTROL



DISEASEEX™  
LAWN FUNGICIDE  
BROAD SPECTRUM DISEASE  
PREVENTION AND CONTROL



# SCOTTS IS HERE FOR YOUR LAWN CARE NEEDS

Founded in 1888, we are proud of our long history and celebrate the lawn by offering best-in-class products. We start with the fundamental truth; your lawn is a living, growing thing.

Our scientists embrace this truth by developing technologies that benefit the lawn and fit your lawn care needs. If you need to feed the lawn - we are here. If you have issues with pesky diseases - we've got your back.

So if you're a die-hard lawn warrior or a novice learning how to care for your lawn - let us help.

## WHAT DOES SCOTTS® DISEASEEX™ LAWN FUNGICIDE DO?

Scotts® DiseaseEx™ Lawn Fungicide Controls Lawn Diseases

- Brown Patch | Stem & Stripe Rust | Red Thread | Powdery Mildew | Anthracnose | Pythium, Southern & Typhula Blight | Leafspot | Pink Patch | Necrotic Ring Spot | Summer Patch | Fusarium Patch | Gray Leafspot | Leaf Rust | Melting Out | Yellow Patch | Rhizoctonia Large Patch | Fairy Ring | Gray & Pink Snow Mold | Pythium Root Rot | Spring Dead Spot | Take-All Patch | Zoysia Patch



**DISEASEEX™**  
LAWN FUNGICIDE  
BROAD SPECTRUM DISEASE PREVENTION AND CONTROL



### DIRECTIONS FOR USE | MODOS DE EMPLEO

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Read entire label before using this product. Se considera una violación a la ley federal usar este producto con otros fines que los indicados en la etiqueta. Lea completamente la etiqueta antes de utilizar este producto.

#### 1 PREP | PREPARE

KNOW YOUR LAWN SIZE  
TENNIS COURT  
~ 2,800 SQ FT

**x 2**

5,000 SQ FT BAG  
COVERS 2 TENNIS COURTS

Use Scotts® MyLawn App to Calculate Your Lawn Size

FILL & SET SPREADER | Llene y ajuste el esparcidor

PREVENTATIVE RATE (2lbs per 1,000 sq.ft)	PREVENTATIVE RATE (2lbs per 1,000 sq.ft)	PREVENTATIVE RATE (2lbs per 1,000 sq.ft)
SETTING <b>2 1/4</b>	SETTING <b>4</b>	SETTING <b>3 3/4</b>
CURATIVE RATE (4lbs per 1,000 sq. ft.)	CURATIVE RATE (4lbs per 1,000 sq. ft.)	CURATIVE RATE (4lbs per 1,000 sq. ft.)
SETTING <b>3 3/4</b>	SETTING <b>5 1/2</b>	SETTING <b>4</b>
SCOTTS® BROADCAST/ROTARY SPREADER Espirador por voleo Scotts®	SCOTTS® DROP SPREADER Espirador por gravedad Scotts®	SCOTTS® WIZZ SPREADER Espirador Scotts® Wizz®

#### 2 APPLY | APLIQUE

WALK AT A STEADY PACE  
Camine a ritmo constante



Use Scotts® DiseaseEx™ Lawn Fungicide on home lawns to prevent disease (Preventative Rate) before it appears and/or to control disease (Curative Rate) at first sign of disease. Utilice la fungicida Scotts® DiseaseEx™ en los céspedes domésticos para prevenir las enfermedades (concentración preventiva), antes que aparezcan y/o para controladas (concentración curativa) al primer indicio de enfermedad.

For best results, begin applications prior to disease symptoms, when conditions are favorable for disease. Para obtener los mejores resultados, empiece a aplicar este producto antes de que aparezcan los primeros síntomas de enfermedad, cuando las condiciones sean favorables para su aparición.

Uniform coverage is necessary to provide the most effective level of control. Es necesario aplicar este producto con una cobertura uniforme para obtener el nivel de control más eficaz. Scotts® DiseaseEx™ Lawn Fungicide can be applied after seeding or at seed germination.

Se puede aplicar Scotts® DiseaseEx™ después de la siembra o al momento de la germinación de la semilla.

Product may be reapplied at 14-28 day intervals. Se puede aplicar este producto de nuevo en intervalos de 14-28 días.

Use the shorter re-treatment intervals and higher application rates when prolonged favorable disease conditions exist.

Sign the intervals of re-application más cortos y utilice concentraciones mayores cuando existan condiciones favorables para la aparición de enfermedades durante períodos prolongados.

When used as directed, this product is safe to the lawn and controls the disease listed. Consult with your local Cooperative Extension Service office or your state's land grant university for assistance with lawn disease identification and specific fungicide timing in your area to control lawn diseases.

Cuando se usa como se indica, este producto es seguro para el césped y controla las enfermedades enumeradas. Consulte con su oficina del servicio de extensión cooperativa local o con una universidad con concesión de tierras de su estado para recibir ayuda con la identificación de las enfermedades del césped y con los calendarios óptimos de aplicación de fungicidas en su área.

### RESTRICTIONS | RESTRICCIONES

People and pets may re-enter the treated area after application. Do not apply more than 37 lbs. of Scotts® DiseaseEx™ Lawn Fungicide per 1,000 sq. ft. in a single year. Las personas y las mascotas pueden entrar a las áreas tratadas después de la aplicación. No debe aplicar más de 16.78 kg de la fungicida Scotts® DiseaseEx™ por cada 92 m² por año.

### PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals  
**CAUTION**

**FIRST AID**  
Have the product container or label with you when calling poison control center or doctor, or going for treatment. For emergency information call 1-800-543-8873.

**PHYSICAL AND CHEMICAL HAZARDS:** Do not mix or allow coming in contact with oxidizing agent. Hazardous chemical reaction may occur.  
**ENVIRONMENTAL HAZARDS:** This pesticide is toxic to freshwater and estuarine/marine fish and aquatic invertebrates. Do not apply directly to water. Runoff may harm aquatic organisms. Do not contaminate water when disposing of equipment wash water or rinsate.

**STORAGE AND DISPOSAL**  
Do not contaminate water, food, or feed by storage and disposal.  
**PESTICIDE STORAGE:** Store in a cool, dry place. Do not store near seeds, fertilizers, or foodstuffs.  
**PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING:** Non-refillable container. Do not reuse or refill this container. If empty: Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

### QUESTIONS / INFORMACIÓN

Preguntas/Información  
**Questions? Call 1-800-543-8873**

EPA Reg. No. 538-330  
EPA Est. No. 538-OH-027, 9199-OH-1\*  
Superscript used is first letter of run code on end of container.



If for any reason you, the consumer, are not satisfied after using this product, you are entitled to get your money back. Simply send us evidence of purchase and we will mail you a refund check promptly. Si por alguna razón no está satisfecho después de utilizar este producto, usted, el consumidor, tiene derecho a la devolución de su dinero. Sólo envíenos el comprobante de compra y le enviaremos un cheque de reembolso por correo inmediatamente.

**SMG** Sold By  
The Scotts Company  
14111 ScottsLawn Rd.  
Marysville, OH 43041  
©2017 The Scotts Company LLC  
World rights reserved.

### AVISOS DE PRECAUCIÓN

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos  
**PRECAUCIÓN**

**PRIMEROS AUXILIOS**  
Tenga a la mano el envase del producto o la etiqueta cuando llame al centro de control de envenenamientos o al médico, o al buscar tratamiento. Para obtener información médica de emergencia llame al 1-800-543-8873.

**RIESGOS FÍSICOS Y QUÍMICOS:** No mezcle ni permita que entre en contacto con un agente oxidante. Podría producirse una reacción química peligrosa.  
**RIESGOS MEDIOAMBIENTALES:** Este pesticida es tóxico para los peces y los invertebrados acuáticos de agua dulce y de estuarios marinos. No lo aplique directamente al agua. La escorrentía puede causar daños a los organismos acuáticos. No contamine el agua al deshacerse de la que use para lavar o enjuagar los utensilios.

**ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN**  
No contamine el agua, la comida ni el pienso para animales al almacenar o eliminar el producto.  
**ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA:** Guarde este producto en un lugar fresco y seco. No lo almacene cerca de semillas, fertilizantes o alimentos.  
**ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA Y MANEJO DEL ENVASE:** Este envase no se puede rellenar. No vuelva a usar ni llenar este envase. Si está vacío: Tirelo a la basura o recíclolo, de ser posible. Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia local de desechos sólidos para obtener instrucciones sobre cómo eliminarlo. Nunca elimine el producto no utilizado en drenajes interiores o exteriores.

**NOTICE**  
To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all risks of use, storage or handling of this product not in accordance with directions.

PROOF OF PURCHASE UPC 0-32247-37610-5  
37610-1 VD-BE 805727

**AVISO**  
En la medida contemplada por las leyes correspondientes, el comprador asume todos los riesgos de uso, almacenamiento o manejo de este producto si no se siguen las instrucciones.

**UPC**

0 32247 37610 5

SCOTTS® DISEASEEX™  
LAWN FUNGICIDE 5M  
37610-1