

DENSIP

TƏRKİBİ:

Setirizin-hidrokslorid 10mq

FARMKOLOJİ Qrupu: Allergiya əleyhinə antihistamin dərman vasitəsi

FARMAKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Setirizin antiallergik, farmakoloji dozalarda zəif yuxugətirici təsirə malik güclü antihistamin maddədir. O H1-histamin reseptorların selektiv antagonistidir, digər reseptorlara isə nəzərəçarpan təsir göstərmir.

Buna görə də faktik olaraq antixolinergik və antiserotonin effekti yoxdur. Setirizin allergik reaksiyanın ilkin fazasında histamin mediatorunu inhibə edir, həmçinin onun ifrazını azaldır. 10 mq dozada setirizin qəbul etdikdən 30 – 60 dəq sonra 0.3 mq/ml həddində qanda yüksək konsentrasiyası yaranır.

Yarımparçalanma dövrü təxminən 11 saatdır. Absorbsiyası çox konsistentdir. Böyrək klirensi 40 ml/dəq və ekskresiyası təxminən 9 saatdır. Setirizin hidrokslorid plazma zülalları ilə davamlı birləşir.

GÖSTƏRİŞLƏRİ:

- Müxtəlif mənşəli allergiyalar (medikamentoz, qida, həşərat dişləmələri zamanı yaranan allergik reaksiyalar)
- Mövsümi və daimi allergik rinitlər, polinoz
- Bronxial və atopik astma
- Allergik konyuktivit
- Urtikər (övrə) və səpgilər
- Allergik, kontakt və atopik dermatitlər
- Xroniki ekzema
- Xroniki idiopatik övrə

ƏKS-GÖSTƏRİŞLƏR: preparatın tərkibində olan hər hansı bir komponentə qarşı hipersensibilizasiya. 6 yaşa qədər uşaqlar. Densip həmçinin laktasiya dövründə əks göstərişdir, belə ki, təsiredici maddə ana südünə nüfuz edir.

HAMILƏLİK VƏ LAKTASIYA DÖVRÜNDƏ İSTİFADƏSİ: ƏLAVƏ TƏSİRİ: Lakin dərman yalnız zərurət olduqda və həkimlə məsləhətləşdikdən sonra qəbul edilə bilər. Setirizin ana südünə daxil olur, odur ki əmizdirmə dövründə densip dərmanı qəbul edilməməlidir

NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİ VƏ POTENSIAL TƏHLÜKƏLİ MEXANİZMLƏRİ İDARƏETMƏ

QABİLİYYƏTİNƏ TƏSİRİ: Nəqliyyat vasitələrini və potensial təhlükəli mexanizmləri idarə edən zaman tövsiyyə olunan dozadan artıq qəbul etmək məsləhət görülmür.

ƏLAVƏ TƏSİRİ: Nadir hallarda başagrı, yuxusuzluq, yorğunluq, ürək bulanması, ağız boşluğunda quruluq müşaidə oluna bilər.

İSTİFADƏ QAYDASI:

6-12 yaş uşaqlar 5 mq (1/2 tablet) gündə iki dəfə

12 yaşdan yuxarı və böyüklər 10 mq (1 tablet) sutkada bir dəfə daxilə qəbul olunur.

Böyrək çatışmazlığı olan şəxslərdə dozanı yarıya bölmək (5mq) məsləhət görülür.

Müalicə müddəti xəstəliyin növündən, davam etmə müddətindən və xəstəliyin gedişindən asılıdır və həkim tərəfindən müəyyən edilir. 6 yaşına qədər uşaqlara Densip qəbul etməsi tövsiyyə olunmur.

BURAXILIŞ FORMASI: 30 tablet içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılıb.

MƏHSULUN VƏ ƏMTƏƏ NİŞANININ SAHİBİ: "WISE PHARMA" Böyük Britaniya

İSTEHSAL EDİLİR: " Speshial Line" İtaliya.