

Préparation infantile dès la naissance

BabySemp 1

BabySemp 1 Lemolac

BabySemp 1 SensiPro

PRÉPARATION



1 Lavez-vous toujours les mains avant de préparer le lait BabySemp 1/ BabySemp 1 Lemolac/ BabySemp 1 SensiPro.



2 Assurez-vous que la tétine, le biberon et la casserole sont propres.



3 Faites bouillir de l'eau froide. Laissez refroidir jusqu'à la température d'ingestion (env. 40°C)



4 Versez la quantité exacte de l'eau dans le biberon.



5 Ajoutez la quantité exacte de poudre. N'oubliez pas de toujours utiliser des mesures rases.



6 Refermez le biberon et agitez/ mélangez jusqu'à ce que la poudre soit dissoute.



7 Vérifiez que le mélange n'est pas trop chaud en versant quelques gouttes sur votre poignet. Goûtez la préparation avant de la donner à votre enfant. Prenez toujours votre bébé dans vos bras lorsque vous le nourrissez.



8 Servez BabySemp rapidement après préparation. S'il en reste, ne le gardez pas.

DOSAGE

Il est important que la quantité de poudre corresponde exactement à la quantité d'eau. Trop de poudre peut constiper votre enfant. Si vous ne mettez pas suffisamment de poudre, votre enfant ne recevra pas assez d'énergie et de nutriments.

Eau	Poudre	Portion obtenue
60 ml	2 mesures	65 ml
90 ml	3 mesures	100 ml
120 ml	4 mesures	135 ml
150 ml	5 mesures	165 ml
180 ml	6 mesures	200 ml
210 ml	7 mesures	235 ml
240 ml	8 mesures	265 ml



Contenance de la dosette 8 ml = 4,3 g. Utilisez toujours la dosette fournie remplie à ras.

QUELLE QUANTITÉ LUI DONNER ?

Les quantités ci-dessous sont approximatives, car la consommation varie d'un enfant à l'autre. De la même manière que pour les enfants nourris au lait maternel, il est préférable de laisser l'enfant décider de la quantité et de la fréquence des repas. Votre enfant régulera sa propre consommation en fonction de ses besoins. Ce tableau est uniquement fourni à titre indicatif.

Âge de l'enfant	Quantité par repas	Nb de repas par jour	Quantité par jour
0 à 1 mois	80-150 ml	5-6	400-700 ml
1 à 2 mois	100-160 ml	5	600-800 ml
2 à 4 mois	140-200 ml	5	700-1000 ml
4 à 6 mois	140-250 ml	4-5	700-1200 ml

À CONSOMMER DE PRÉFÉRENCE AVANT LE

La date de péremption est indiquée sur le dessus du paquet. Après ouverture, le délai d'utilisation est de 30 jours.

CONSERVATION

Conservez à température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Conservez toujours la poudre dans son emballage d'origine. Vous pouvez ranger la dosette dans l'espace prévu à cet effet dans le couvercle.

UNE QUESTION, UN COMMENTAIRE ?

N'hésitez pas à nous appeler ! Semper AB • Tél. 020-62 20 00

konsumentkontakt@semper.se
www.semperbarnmat.se

UTILISATION

Consultez toujours votre pédiatre au sujet de l'alimentation de votre enfant. Les laits BabySemp 1, BabySemp 1 Lemolac et BabySemp 1 SensiPro s'utilisent comme supplément ou comme substitut du lait maternel sur recommandation des services de protection infantile ou d'un pédiatre afin de couvrir les besoins nutritionnels de l'enfant jusqu'à six mois.

Les laits BabySemp 1 Lemolac et BabySemp 1 SensiPro ont un pH faible, ce qui permet de fractionner partiellement la protéine et de l'adoucir. Cela se voit, car les laits BabySemp 1 Lemolac et BabySemp 1 SensiPro sont légèrement grumeleux une fois préparés.

Pour garantir une qualité optimale, BabySemp 1 doit être préparé juste avant d'être servi et consommé dans l'heure qui suit.

Attention : Assurez-vous de laisser refroidir l'eau bouillie à 40 °C avant de préparer BabySemp 1 SensiPro. Les températures plus élevées réduisent l'effet de la culture bactérienne active, *Lactobacillus reuteri* Protectis®, également contenue dans les gouttes probiotiques Semper Magdroppar.

ASTUCE ! PRÉPARATION RAPIDE

- Faites bouillir de l'eau froide.
- Versez la moitié de l'eau chaude dans le biberon et ajoutez de l'eau bouillie conservée au réfrigérateur pour obtenir la bonne quantité totale. Ajoutez la quantité exacte de poudre. N'oubliez pas de toujours utiliser des mesures rases.
- Refermez bien le biberon et agitez jusqu'à ce que la poudre soit dissoute.
- Vérifiez que le mélange n'est pas trop chaud en déposant quelques gouttes sur votre poignet. Goûtez toujours la préparation avant de la donner à votre enfant.



Regardez notre vidéo pour la préparation (en suédois).



Juni 2020



Recherche et développement en concertation avec des pédiatres

Les nourrissons peuvent avoir des difficultés à produire eux-mêmes des quantités suffisantes d'acides gras polyinsaturés à longue chaîne oméga 3 (DHA) et oméga-6 (acide arachidonique AA). C'est pourquoi tous les produits BabySemp 1 en contiennent en plus des nucléotides et GOS (galacto-oligosaccharides/fibre).