

6个月以上婴幼儿后续配方奶粉

BabySemp 2 段

BabySemp Lemolac 2 段

BabySemp SensiPro 2 段


冲调



1 使用微波炉：在奶瓶中量取适量的冷水，然后使用平勺加入规定量的奶粉。



2 盖紧奶瓶，摇晃奶瓶/混合直至奶粉完全溶解。



3 不加盖高火加热约40秒。



4 将少量液奶滴在手腕内侧，确保奶温不会太烫。喂宝宝喝奶之前，您一定要亲自先尝一下温度。



5 喂宝宝喝刚刚冲调好的液奶。不要保存任何剩下的液奶。



使用奶锅：在奶锅中加入适量的奶粉和冷水后搅拌均匀，加热至进食温度。

用量

在规定水量中加入正确的奶粉用量十分重要。奶粉过多会导致便秘。奶粉太少则会让您的宝宝能量和营养不足。

水	奶粉	液奶量
60毫升	2勺	65毫升
90毫升	3勺	100毫升
120毫升	4勺	135毫升
150毫升	5勺	165毫升
180毫升	6勺	200毫升
210毫升	7勺	235毫升
240毫升	8勺	265毫升



奶勺大小8.6毫升 = 4.7克。务必使用随附的奶勺，按平勺量取。

喝奶量应是多少？

下表中的奶量是近似值，因为不同的宝宝喝奶量不同。您的宝宝将根据自己的需要和日常饮食的摄入情况调节喝奶量。因此，下方表格仅作参考用途。

婴幼儿年龄	每日喝奶次数	水	奶粉	液奶量
6-8个月	1-3	210毫升	7勺	235毫升
	1-4	180毫升	6勺	200毫升
> 8个月	1-3	210毫升	7勺	235毫升
	1-3	180毫升	6勺	200毫升

最佳食用期限

最佳食用期限已标注在包装顶部。开封后需在一个月内吃完。

储存

请在避光干燥处常温下储存。务必将奶粉放在原包装内保存。盖子上有一个方便的奶勺存储位置。

有问题或意见？

致电我们！ Semper AB • Tel. +46 (0)20-62 20 00
 konsumentkontakt@semper.se
 www.semperbarnmat.se



观看我们的冲调视频（瑞典语）。



June 2020



经咨询儿科医生后研发

BabySemp 2段/BabySemp Lemolac 2段/BabySemp SensiPro 2段含有精选的乳脂和植物油的混合物。婴幼儿可能自己难以形成足够数量的长链脂肪酸omega-3 (DHA) 和omega-6 (ARA)。因此，它们及核苷酸和GOS (低聚半乳糖/纤维) 被添加到所有BabySemp 2段奶粉中。铁有助于婴幼儿的正常认知发展和理解。维生素D对于骨骼结构的生长和正常发育必不可少，而碘有助于正常生长。因此，BabySemp 2段/BabySemp Lemolac 2段/BabySemp SensiPro 2段特别添加丰富的铁、维生素D和碘。