



说明

BabySemp 1段、BabySemp SensiSoft Lemolac 1段和 BabySemp SensiPro+ 1段

冲调

- 1 先洗手，并清洗所有待使用的物品（奶嘴、奶瓶和奶锅）。
- 2 将冷水烧开。冷却至进食温度（约40°C）
- 3 将适量的水倒入婴儿奶瓶中，再加入准确份量（平勺）的奶粉。
- 4 把奶瓶盖好，摇晃奶瓶直至奶粉完全溶解。
- 5 将少量液奶滴在手腕内侧，确保奶温不会太烫。喂宝宝喝奶之前，您一定要亲自先尝一下温度。
- 6 喂宝宝喝刚刚冲调好的液奶。剩余的液奶不宜保存。喂奶时请始终把宝宝抱在怀中。

扫描二维码观看奶粉冲调视频！



使用方法

根据儿童保健中心或儿科医生的建议，BabySemp 1段婴儿配方奶粉可作为母乳的补充或替代品，以满足6个月以下婴儿的营养需求。

为了获得最佳食用质量，婴儿配方奶粉应新鲜冲调后在1小时内食用。请联系当地儿童保健中心，获取有关宝宝饮食方面的专业建议和支持。

BabySemp SensiSoft Lemolac 1段和BabySemp SensiPro+ 1段的pH值较低，可在冲调过程中软化蛋白成分。这就是冲调好的BabySemp SensiSoft Lemolac 1段和BabySemp SensiPro+ 1段配方奶看起来略有颗粒感的原因。

关于使用BabySemp SensiPro+ 1段的重要说明：

在冲调BabySemp SensiPro+ 1段时，请确保水已冷却至40摄氏度后再加入奶粉混合。高温会降低活性细菌培养物罗伊氏乳杆菌®的效果。

快速冲调小贴士

1. 将冷水烧开。
2. 先将适量的热水倒入婴儿奶瓶中，不要超过所需兑水量的一半，然后用冷开水加满至正确的成奶量。再将准确份量（平勺）的奶粉加入到奶瓶中。
3. 把奶瓶盖好，摇晃奶瓶直至奶粉完全溶解。
4. 将少量液奶滴在手腕内侧，确保奶温不会太烫。喂宝宝喝奶之前，您一定要亲自先尝一下温度。

最佳食用期限

最佳食用期限已标注在包装顶部。开封后需在1个月内吃完。为减少浪费、确保口味和品质始终如一，BabySemp产品特别采用双袋包装并在其中填充了保护性气体。

用量

掌握好奶粉和冲调水量的比例非常重要。奶粉过多会导致便秘，而奶粉太少则会让您的宝宝无法获得足够的能量和营养。



务必使用随附的量勺！

水	奶粉量	液奶量
60毫升	2平勺	约65毫升
90毫升	3平勺	约100毫升
120毫升	4平勺	约135毫升
150毫升	5平勺	约165毫升
180毫升	6平勺	约200毫升

奶量表：

不同宝宝的喝奶量不同，因此下表中的奶量是近似值，仅作参考用途。就像母乳喂养一样，用配方奶喂养的父母应该让宝宝控制自己的喝奶量和喝奶频率。您的宝宝将根据自己的需要调节喝奶量。

婴幼儿年龄	每顿奶量	每日喝奶次数
1-2周	65-100毫升	6-8次
2-4周	80-150毫升	5-7次
1-2个月	100-160毫升	5-6次
2-4个月	140-200毫升	5-6次
4-6个月	140-250毫升	4-5次

开封与贮存

沿着包装侧面的打孔线撕开，将奶粉盒打开。奶粉勺巧妙地收纳在奶粉盒盖内侧。务必将奶粉放在原包装内保存，并贮藏在干燥、避光的环境中，温度不应超过常规室温。

开封说明

- 1 由此撕开
- 2 实用奶盒盖
- 3 奶粉勺卡槽

回收利用

外层纸盒可作为纸质包装材料回收利用。内袋和勺子可作为塑料包装材料回收利用。



SEMPER婴幼儿食品，依托80多年的营养研究

Semper于1939年在瑞典成立，公司依托其开创性的研究，专注于为婴幼儿提供优质的食品。多年来，公司始终与儿童医学和营养学领域的顶尖研究人员密切合作，不断优化和改进产品的配方。

有问题或意见？

Semper AB • 电话020-62 20 00
konsumentkontakt@semper.se • www.sempers.se/barnmat