

リポビタミンDキッズ

効能・効果

幼小児の発育期・偏食児・病中病後・発熱性消耗性疾患・食欲不振・栄養障害等の場合の栄養補給
滋養強壯
虚弱体質

用法・用量

5～14才1日1回1本（50mL）を服用してください。
5歳未満、服用しないこと
定められた用法・用量を厳守してください。
（他のビタミン等を含む製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください）
小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分及び分量

1本（50mL）中
アミノエチルスルホン酸(タウリン) 800mg
チアミン塩化物 3mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム 3mg
ピリドキシン塩酸塩 6mg
グルコン酸カルシウム水和物 450mg
ニコチン酸アミド 20mg
カルニチン塩化物 50mg

添加物

白糖、ブドウ糖、スクラロース、クエン酸、クエン酸Na、pH調節剤、没食子酸プロピル、カラメル、安息香酸、香料、グリセリン、パニリン

成分及び分量に関連する注意

本剤の服用により、尿が黄色になることがあります。これは本剤中のビタミンB₂によるもので、ご心配ありません

使用上の注意

相談すること

次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください
服用後、次の症状があらわれた場合
皮膚：
発疹
消化器：
胃部不快感
しばらく服用しても症状がよくなる場合
次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
下痢

保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない涼しい所に保管してください
小児の手のとどかない所に保管してください。
使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

21

【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。