

女性保健薬

女性の更年期障害などのホルモンバランス・自律神経の不調による諸症状に

女性保健薬 命の母A



第2類医薬品

ホルモンバランス・
自律神経の不調による諸症状に
和漢生薬+ビタミン類の複合薬
販売名: 女性保健薬 命の母A



服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また、必要ときに読めるように大切に保管してください
使用期限(パッケージ底面および容器ラベルに記載)
を過ぎた製品は服用しないこと



- 製品特徴
- デリケートな女性の身体の仕組みを考慮して作られた女性保健薬*1です。
 - 13種類の生薬とビタミン類、カルシウムなどを配合*2。穏やかに効いていきます。
 - 血行を促し体を温めることで、女性ホルモンと自律神経のアンバランスから起こるさまざまな身体の不調を改善し、女性の前向きな生活をサポートします。
 - 小さくて飲みやすい糖衣錠です。
- ※1 女性保健薬とは、女性に現れる特有な諸症状の緩和と健康増進の目的のお薬の意
※2 ホルモン剤ではありません

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 授乳中の方は本剤を服用しないが、本剤を服用する場合は授乳を避けること

🗨️ 相談すること

- 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦または妊娠していると思われる人
 - 本人または家族がアレルギー体質の人
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師または薬剤師に相談すること
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、食欲不振、悪心・嘔吐、激しい腹痛を伴う下痢、腹痛

「悪心」とは、胸がムカムカして、はきけをもよおすことです。

- しばらく服用しても症状がよくならない場合
- 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、医師または薬剤師に相談すること
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること
便秘、下痢

効能・効果 更年期障害、更年期神経症、血の道症^{注)}、のぼせ、生理不順、生理異常、生理痛、肩こり、冷え症、肌荒れ、めまい、耳鳴り、動悸、貧血、にきび、便秘、ヒステリー、帯下、産前産後、下腹腰痛、血圧異常、頭痛、頭重^{注)}
注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである

用法・用量

右の量を毎食後服用する

<用法・用量に関連する注意>

- 定められた用法・用量を厳守すること

年齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15才以上)	4錠	3回
15才未満	服用しないこと	














成分・分量 1日量(12錠)中

ダイオウ末……………175mg	コウカ……………50mg
カノコソウ末……………207mg	チアミン塩化物硫酸塩(ビタミンB1) …… 5mg
ケイヒ末……………170mg	リボフラビン(ビタミンB2)…………… 1mg
センキュウ末……………100mg	ピリドキシン硫酸塩(ビタミンB6)……………0.5mg
ソウジュツ末……………100mg	シアノコバラミン(ビタミンB12)…………… 1μg
ジャクヤク末……………300mg	パントテン酸カルシウム…………… 5mg
フクリョウ末……………175mg	葉酸……………0.5mg
トウキ末……………300mg	タウリン……………90mg
コウブシ末…………… 50mg	dl-α-トコフェロールコハク酸エステル(ビタミンE) 5mg
ゴシュウ…………… 40mg	リン酸水素カルシウム水和物……………10mg
ハンゲ…………… 75mg	ピオチン…………… 1μg
ニンジン…………… 40mg	精製大豆レシチン……………10mg

添加物として、ケイ酸Al、ステアリン酸Mg、セラック、タルク、炭酸Ca、酸化チタン、バレイショデンブ、ゼラチン、白糖、エリスロシン、ニューコクシン、サンセットイエローFCF、ミツロウ、カルナウバロウを含有する


保管および取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること
- 小児の手の届かないところに保管すること
- 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- 容器内の乾燥剤は服用しないこと

<h3>ホルモンバランス・自律神経の不調による諸症状に 13種類の和漢生薬+ビタミン類の複合薬</h3>			
			<p>ダイオウ 大黃</p>  <p>東南アジア原産のタデ科の大形多年草であるダイオウ類の根茎。</p>
<p>カノコソウ 吉草根</p>  <p>オミナエシ科の多年草であるカノコソウの根及び根茎。</p>	<p>ケイヒ 桂皮</p>  <p>おもに中国南部、ベトナム、タイなどに産するものでクスノキ科のニッケイ類の樹皮。</p>	<p>センキュウ 川芎</p>  <p>中国のほか、北海道、東北地方に産し、セリ科のセンキュウの根茎。トウキとともに婦人薬に古くから使用されている。</p>	<p>ソウジュツ 蒼朮</p>  <p>中国大陸に分布するキク科の多年草であるホソバオケラの根茎。精油を含み特有のにおいがある。</p>
<p>シャクヤク 芍薬</p>  <p>ポタン科の多年草であるシャクヤクの根。婦人薬に広く使用されている。</p>	<p>ブクリョウ 茯苓</p>  <p>サルノコシカケ科のマツホドである。</p>	<p>トウキ 当帰</p>  <p>昔から婦人病の要薬として用いられている。セリ科に属する。</p>	<p>コウブシ 香附子</p>  <p>中国の各省、韓国や日本でも産する。カヤツリグサ科の多年草であるハマスゲの根茎。</p>
<p>ゴシュユ 呉茱萸</p>  <p>ミカン科のゴシュユおよびホンゴシュユの未熟果実。精油を含み特異的な香りがある。中国のほかわが国でも生産される。</p>	<p>ハンゲ 半夏</p>  <p>サトイモ科のカラシビシヤクの球茎。日本、中国などで産する。</p>	<p>ニンジン 人参</p>  <p>中国や韓国の原産でウコギ科の多年草、オタネニンジンの根。成分のサポニン配糖体は、最近世界各国でその薬効が再認識され、科学的な裏づけがなされつつある。</p>	<p>コウカ 紅花</p>  <p>キク科の多年草ベニバナの管状花。エジプト原産で中国、チベット、インド、南フランス、日本などで栽培される。</p>

※生薬のイラストはイメージです。

更年期ステージ別、血液中女性ホルモン(エストロゲン)濃度の変化と基礎体温の関係



発売元
小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問い合わせ先
お客様相談室 ☎ 06 (6203) 3625
受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)
ホームページアドレス <http://pr.kobayashi.co.jp>

製造販売元 **小林製薬株式会社**
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3
MADE IN JAPAN

10095885