

ビタミンB₂主薬製剤

チョコラBB[®]プラス[®]

第3類医薬品

チョコラBBプラスは、肌あれ、にきび・吹き出物、口内炎の緩和と、
疲れた時に効果的なビタミン剤です。

吸収にすぐれた活性型ビタミンB₂が、細胞の新陳代謝を助けて皮膚・
粘膜の症状を改善します。また、バランスよく配合した5種類の
ビタミンB群が、食事から摂取した栄養素を効率よくエネルギーに
変換して毎日の疲れをケアします。

肌あれと疲れた時には小型でのみやすい錠剤のチョコラBBプラスが
よく効きます。



使用上の注意



相談すること

- ①服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹
消 化 器	胃部不快感

- ②服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
- ③1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

次の諸症状の緩和：

肌あれ、にきび・吹き出物*、口内炎、口角炎(唇の両端の腫れ・ひび割れ)*、
口唇炎(唇の腫れ・ひび割れ)*、皮膚炎、湿疹、かぶれ、ただれ、舌の炎症、
赤ら顔に伴う顔のほてり*、目の充血、目のかゆみ
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない
場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

次の場合のビタミンB₂の補給：

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

次の量を朝夕食後に水またはお湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	1錠 	1日2回
小児(15歳未満)	× 服用しないこと	

[用法・用量に関連する注意]

なめていると成分が溶けだして苦味を感じることがあります。早めのみこんでください。

成分と働き

成人1日量2錠中に次の成分を含みます。

成分	含量	働き
リボフラビンリン酸エステルナトリウム (ビタミンB ₂ リン酸エステル)	38mg	・皮膚や粘膜の健康維持に働きます。 ・脂肪の代謝を助けエネルギーに変えます。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	50mg	・皮膚や粘膜の健康維持に働きます。 ・タンパク質の代謝を助けエネルギーに変えます。
チアミン硝化物 (ビタミンB ₁ 硝酸塩)	20mg	・糖質(炭水化物)の代謝を助けエネルギーに変えます。
ニコチン酸アミド	40mg	・皮膚や粘膜の健康維持に働きます。
パントテン酸カルシウム	20mg	

[添加物]

タルク、炭酸Ca、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、D-マンニトール、アラビアゴム、カルナウバロウ、酸化チタン、三酸化鉄、ステアリン酸、ステアリン酸Mg、セラック、セルロース、二酸化ケイ素、白糖、ビタミンB₂、ヒプロメロース、プルラン、ポビドン、マクロゴール、リン酸水素Ca

[成分に関連する注意]

本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれているビタミンB₂が吸収され、その一部が尿中に排泄されるためで心配はありません。

保管及び取扱い上の注意

- ①直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。ただし、冷蔵庫には入れないでください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。また、本容器内に他の薬剤等を入れないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④本剤は落下などの衝撃で錠剤がカケることがありますので、取扱いには注意してください。
- ⑤水分が錠剤に付くと表面の一部が溶け、変色したり斑点を生じたりすることがありますので、ぬれた手で触れないでください。また、ぬれた錠剤を元の容器に戻しますと、他の錠剤に影響を与えますので注意してください。
- ⑥使用期限をすぎた製品は使用しないでください。
- ⑦使用期限内であっても一度容器のキャップを開けた後は、品質保持の点から6ヵ月以内を目安に使用してください。箱の内ブタの「開封年月日」欄に、開封日を記入してください。
- ⑧キャップの上ブタを開める時は、カチッと音がするまで押し込んでください。

本品についてのお問い合わせ先

●お買い求めのお店

●エーザイ[hhcホットライン] **フリーダイヤル 0120-161-454**

受付時間/平日9:00~18:00(土・日・祝日9:00~17:00) 携帯電話やPHSからもお問い合わせできます。



製品内容はホームページでも紹介しています。

eisai.jp

製造販売元



エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10