

ضعف المناعة الأولي عند الطفل Déficits Immunitaires Primitifs de l'Enfant

10 علامات للتنبيه 10 signes d'alerte

1 Plus de 8 otites par an



1 التهاب الأذن أكثر من 8 مرات في السنة

2 Plus de 2 sinusites par an.



2 التهاب جيب الوجه أكثر من مرتين في السنة

3 Des traitements par antibiotiques de plus de 2 mois.



3 استعمال المضادات أكثر من شهرين في السنة

4 Deux pneumonies ou plus par mois



4 الإصابة بتعفن الرئة أكثر من مرة في السنة

5 Ralentissement de la croissance.



5 تأخر النمو

6 Des épisodes de forte fièvre.



6 إصابات متعددة بحمى مرتفعة

7 Infection par champignon persistante de la bouche ou de la peau après l'âge d'un an



7 إصابات مزمنة بفطريات في الجلد او الفم

8 La nécessité d'un traitement antibiotique par voie intraveineuse.



8 الاضطرار لحقن المضادات الحيوية داخل الوريد

9 Plus de deux infections sévères.



9 أكثر من حالتين تعفن في السنة

10 Cas connus d'immunodéficience dans la famille.

10 وجود ضعف المناعة داخل الأسرة

في المغرب توجد تقريبا 5000 حالة من ضعف المناعة الأولي. هذا المرض الذي يضعف جهاز مناعة الإنسان يسبب له إصابات متعددة وخطيرة. هذه العلامات التي قد يوجد بعضها في أمراض عادية تستوجب استشارة طبية.

Au Maroc près de 5000 personnes sont atteintes de déficit immunitaire primitif (DIP), maladie qui fragilise le système immunitaire et entraîne des infections très fréquentes et souvent très graves. Malheureusement, cette maladie est encore largement méconnue au Maroc. Ces 10 signes sont évocateurs de ces DIP mais peuvent être dus à d'autres maladies. Un avis médical est nécessaire.